







Une partie de nos champs d'essais.
Een gedeelte van onze proefvelden.



Nos serres et une partie des châssis.
Onze broeikassen en een gedeelte der ramen.



Notre chef de cultures, M. Fernand Barballe.
Onze cultuuroverste, M. Fernand Barballe.



Sulfatage d'un champ d'oignons.
Besproeiing van een ajuinveld met sulfaten




Récolte des oignons de Mulhouse.
Inoogsten van ajuinen van Mulhouse.



Récolte des graines de carottes.
Inoogsten van wortelzaden.



Machine-ensacheuse électrique.
Electrische opzakkingsmachine.



Ensacheuse des pois et haricots.
Opzakkings van erwten en boonen.



Exécution des commandes.

Uitvoering der bestellingen.

CATALOGUE GÉNÉRAL DE CH. GONTHIER FILS

MAISON J. & A. DONY. FONDÉE EN 1846

GRAINES ET PLANTES SÉLECTIONNÉES

BUREAUX, MAGASINS ET CULTURES

WANZE (HUY)
BELGIQUE

R. C. HUY 1.
TÉLÉPHONE : HUY 142.
TÉLÉGRAMMES : GONTHIER HUY.
GARE : STATTE.
COMPTE CHÈQUES POSTAUX : N° 137.



BUREAU POUR LA FRANCE

ST-QUENTIN (AISNE)
FRANCE

R. C. AISNE 8875
TÉLÉPHONE : ST-QUENTIN 2896
TÉLÉGR. : GONTHIER ST-QUENTIN
GARE : ST-QUENTIN
COMPTE POSTAL : PARIS 276.40

SOMMAIRE

Graines potagères:	PAGES	Arbres, Rosiers et Arbustes:	PAGES
Calendrier de semis	2	Arbres fruitiers	45
Conservés de légumes	3	Rosiers	50
Nomenclature	4	Arbustes d'ornement, etc.	54
Assortiments	26		
Graines de fleurs:		Plantes potagères:	
Page du Petit amateur	27	Plantes bisannuelles	56
Calendrier de semis	28	Plantes vivaces	56
Nomenclature	30		
Pois de senteur en variétés	39	Plantes de fleurs	
Collections	40	Plantes bisannuelles	56
Assortiments	40	Plantes vivaces	57
Articles divers et Engrais	41	Plantes potagères, livrables en mars:	
Graines fourragères	42	Asperges	61
Oignons à fleurs	44	Fraisiers	61
		Plantes livrables en mai	62
		Conditions générales de vente	64

PRINTEMPS 1932

NOTRE COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE.

La couverture de notre catalogue représente un coin d'intérieur fleuri de lis tigrinum, ainsi qu'une branche isolée de ce même lis, merveilleuse fleur orange feu, de culture facile et de très bel effet. (Voir le chapitre: oignons à fleurs, page 44).

NOTRE GRAVURE SUR ARGENT.

Cette année, nous joignons à notre catalogue une photographie en couleurs de roses sur fond argent.

Ce fond, si lisse et si chatoyant, n'est autre qu'une feuille d'aluminium extraordinairement mince collée sur du carton. Nous espérons que ce spécimen d'un nouveau procédé vous plaira et que vous l'emploierez à orner un coin de votre intérieur.

Il représente quelques belles fleurs de rosiers hautes tiges dont nous possédons une splendide collection (voir page 51). Ces grands arbustes très décoratifs n'occupent pour ainsi dire pas de place, et sont très précieux pour les petits jardins, où ils bordent les carrés de légumes et mettent de jolies touffes fleuries sans gêner la culture potagère.

NOTRE PRIME POUR COMMANDES GROUPÉES.

Nous demandons à nos clients d'employer notre second bordereau de commande pour nous remettre, avec le leur, l'ordre d'un client nouveau.

A tous ceux qui nous feront le plaisir de réunir ainsi deux ou même plusieurs ordres, nous offrons une prime pour chaque commande jointe, à la condition expresse que celle-ci porte l'adresse complète du nouveau client. Evidemment, ce dernier n'aura pas, lui-même, droit à la prime.

Cette prime sera, au choix: soit un bel abat-jour moderne, facile à monter, en papier parchemin épais et résistant; soit 2 paquets de graines potagères ou de fleurs à désigner.

Les personnes ayant droit à l'une ou l'autre de ces primes auront soin d'inscrire ce qu'elles ont choisi au bas de la 2^e page de leur bordereau personnel.

Nous réunissons toujours en un seul envoi les commandes qui nous parviennent ainsi groupées, à moins que le client ne nous demande formellement le contraire.

CALENDRIER DES SEMIS DE GRAINES POTAGÈRES.

Nous avons divisé les travaux à effectuer en plusieurs catégories:

1. — Les semis que l'on doit faire en place, dans tous les jardins.
2. — Les semis que l'on peut faire en pépinière, mais que beaucoup d'amateurs ne font pas, soit qu'ils manquent du matériel nécessaire, soit encore qu'ils trouvent plus pratique d'acheter les plantes à repiquer.
3. — Les plantes que l'on doit repiquer. Les amateurs qui ne les auront pas semées trouveront à la page 63 du catalogue la liste des plantes à repiquer que nous pouvons fournir. Il leur suffira de les retenir et elles leur seront envoyées en temps utile.

4. — Les semis et plantations que l'on peut faire, si l'on possède un grand jardin ou si l'on désire étendre son choix de légumes au delà des variétés courantes. Chacun pourra donc choisir, dans cette dernière catégorie, les légumes qu'il préfère ou encore les variétés dont il désire faire l'essai.

Sur tous nos paquets de graines, nous indiquons, avec la culture, les époques de semis. Mais les dates que nous donnons n'ont rien d'absolu. Elles sont exactes, en année normale, pour nos cultures de la vallée de la Meuse. Dans les sols sablonneux et chauds, il est possible que l'on puisse semer quelques jours plus tôt. Mais dans les sols plus argileux, plus froids, plus lourds, dans les situations exposées aux gelées, il faudra retarder les semis jusqu'au moment où le terrain sera parfaitement réchauffé et ne pas se fier, comme trop de personnes le font, aux premiers rayons du soleil de février.

Nous ne reprenons pas à notre calendrier les espèces suivantes, qui peuvent se semer fréquemment pour sérier la production.

Semer tous les mois: de mai en juillet: arroche; de mars en août: cresson, cerfeuil, épinard. Planter tous les mois: de mars en août: laitues; de juin en août: endives et scaroles. Planter toute l'année: champignons.

En janvier

on peut semer à chaud, pour forçage: céleris à côtes, laitues gotte et à couper, concombres, oignon de Madère.

Début février

on peut semer à chaud, pour forçage: poireaux hâtifs, pois, fève de marais naine hâtive.

Fin février/début mars

on sème à chaud: laitues printanières et d'été, poireaux, tabacs.

on sème sous abri ou en pleine terre: carotte courte ou demi-longue pour primeur, radis hâtifs, laitues à couper, choux blancs et rouges.

on plante: choux hivernés, ail.

on peut encore semer à chaud: courges, tétragone, cresson de fontaine.

on peut encore semer à froid: choux de Milan, choux-raves, chicorées sauvages.

on sème en place: radis hâtifs, cerfeuil, épinard, cresson alenois, laitues à couper, fèves de marais, pois hâtifs, oignons.

on sème en pépinière: céleris à jets, laitues printanières et d'été, poireaux, choux, choux-fleurs d'été.

on sème à chaud: tomates, céleris à côtes et raves.

on plante: échalotes, oignon de Mulhouse, choux-fleurs printaniers.

on peut encore semer: chicorées sauvages, panais.

on sème: carottes demi-longues, persil, oseille.

on sème en pépinière: choux de Bruxelles, chou Coo.

on sème à chaud: melons.

on plante: pommes de terre hâtives, fraisiers.

on peut encore semer: choux de Milan (de Savole), oignons, poireaux.

on sème: oignons à confire, pois hâtifs et de moyenne saison, haricot nain noir de Belgique.

on plante: pommes de terre tardives, laitues d'été.

on peut encore semer: concombre, poirée ordinaire, cresson de fontaine et vivace, endive frisée toujours blanche, choux-fleurs d'été, radis hâtifs.

on sème: carottes longues, scorsonère noire, salsifis.

on sème en pépinière: choux de Milan tardifs.

on peut encore semer: carottes demi-longues, pissenlit, betteraves potagères, arroche, poirées à cardes, cardon, poireaux, choux-raves, pois de moyenne-saison.

on sème: chicorée Witloof, radis d'été, cornichon, pourpier, pois de moyenne-saison et tardifs, haricots nains (10 mai) et à rames (15-20 mai).

on sème en pépinière: choux de Bruxelles, choux-fleurs tardifs.

on plante: tomates, céleris à côtes, à jets et raves, poireaux, choux de Bruxelles, choux de mai, choux-fleurs d'été, melons, tabacs.

on peut encore semer: chicorée barbe de capucin, chicorée à café, ficoïde glaciale, céleris à côtes et à jets.

on sème: carottes demi-longues, laitues d'été (en pépinière).

on plante: poireau, chou Coo.

on peut encore semer: endives, scaroles, chou Coo, chou Brocolis.

on peut encore planter: choux de Milan.

on sème: radis long d'hiver, endives et scaroles (en pépinière).

on plante: céleris à jets et à côtes, choux de Milan tardifs, choux de Bruxelles.

on peut encore semer: panais, radis d'été, arroche, poirée commune, haricots à rames, céleris à côtes.

on peut encore planter: choux-fleurs d'été.

on sème en pépinière: choux-raves.

on plante: choux-fleurs tardifs.

on sème: carotte courte de Hollande, radis rond d'hiver, persil, mâches.

on peut encore semer: claytone, oseille Belleville, pois hâtifs, haricot noir, laitues d'été (en pépinière).

on peut encore planter: choux de Bruxelles, chou Coo, choux Brocolis.

on sème: navets potagers, endives et scaroles (en pépinière).

on plante: choux-raves.

on peut encore semer: radis rose de Chine, claytone, épinards, laitues d'été.

on sème: oignon blanc hâtif, cerfeuil, épinard, oseille patience, mâches.

on sème en pépinière: choux rouges, blancs, de Savole et de Milan hâtifs.

on sème en pépinière: laitues d'hiver, choux-fleurs hâtifs.

on peut encore semer: cerfeuil.

on plante: fraisiers.

on plante: laitues d'hiver, choux d'hiver.

PLANTES VIVACES ET PLANTES CONDIMENTAIRES.

En février

on sème à chaud: artichaut, chou marin.

Vers le 15 mars

on sème à chaud: piment, rhubarbe.

on sème: aubergine, basilic, pimprenelle.

on plante: angélique, chou marin, estragon, fenouil, hysope, lavande, marjolaine, menthe, rhubarbe, romarin, sarriette, sauge, thym, ciboulette, oseille.

En avril

on sème: absinthe, anis, asperge, basilic, bourrache, fenouil, hysope, lavande, marjolaine, mélisse, romarin, rue, sarriette, sauge et thym.

En mai

on plante: asperges.

on plante: carvi.



LES CONSERVES DE LEGUMES

Avez-vous déjà songé à cette ressource supplémentaire que vous pouvez tirer de votre jardin: les conserves de légumes. Elles vous permettront de prolonger la récolte toute l'année et vous épargneront, l'hiver, des achats souvent coûteux.

Il faut les prévoir dès janvier, car vous devrez semer une quantité un peu plus forte des légumes dont vous désirez faire des conserves et choisir des variétés qui se prêtent particulièrement à cet usage.

Voici donc quelques indications.

PURÉES.

Conservez de cette façon, soit séparément, soit en mélange: oseille, épinard, cerfeuil et pourpier. Le mélange permet d'obtenir en quelques minutes un excellent potage vert. Il sera bien meilleur encore et plus velouté si vous avez ajouté un peu de petits pois à la purée, lors de sa confection. Préparez aussi de la purée de tomates, indispensable pour tant de sauces, et de potages savoureux.

Faites bouillir longuement vos légumes à l'eau salée, puis écrasez-les au moyen d'un tamis et faites encore mijoter la purée à feu doux jusqu'à ce qu'elle soit bien consistante: Puis laissez-la tiédir et tassez-la dans des bocal ordinaires que vous fermerez, dès qu'ils seront refroidis, par une couche de graisse fondue. Ces bocaux seront ensuite rangés dans un endroit sec.

C'est surtout le semis printanier qui fournit les légumes de conserve. Au début de mars, ensemencez donc une bonne surface de cerfeuil frisé, épinard monstrueux de Viroflay, oseille à large feuille de Belleville, et semez en caissettes un peu de tomate Perdrigeon pour avoir très vite des plantes à repiquer. Semez ensuite, à bonne exposition, le pois nain l'Unique, fin mars, et le pourpier doré au début de mai. Ainsi, vous obtiendrez des récoltes très hâtives.

SÉCHAGE.

Les haricots à écosser et les pois à grain rond, mûris sur pied, donnent d'excellents grains secs dont on fait de nombreux usages. Semez donc à cette fin quelques bonnes variétés pour obtenir une abondante récolte.

En outre, pour conserver très facilement des grains verts et tendres, semez au 15 mai le haricot nain flageolet Chevrier et le pois à rames Sénateur. Cueillez les gousses déjà pleines mais encore vertes, ébouillantez-les pendant trois minutes à l'eau salée, puis faites-les sécher à l'ombre sur des claies, pour les conserver ensuite dans un endroit sec. Au moment de l'emploi, vous écossez les grains et vous les ferez tremper quelque temps dans l'eau froide pour les ramollir. Ils seront ainsi tendres et savoureux.

Pour avoir toute l'année un choix d'exquises et précieuses plantes aromatiques, prévoyez un petit semis, dans un coin du jardin, de fenouil, marjolaine, sarriette, sauge, thym (voyez page 26). Non seulement, vous en récolterez tout l'été mais vous en ferez sécher une partie à l'ombre, le plus rapidement possible, et vous les conserverez dans des sachets pour l'hiver. Séchez de la même façon un peu de persil et de céleri à jets grâce auxquels vous assaisonneriez délicieusement vos potages d'hiver.

CONSERVES AU SEL.

Vous conserverez surtout par ce procédé les jeunes gousses de fèves de marais, haricots et pois mangetout, laissées entières, les raves de céleris découpées en tranches de 3 cm. d'épaisseur et le chou cabus blanc haché, qui fera une excellente choucroute.

Remplissez des pots de chacun de ces légumes crus en les rangeant par couches de 3 cm., séparées entre elles par une couche de sel. Terminez par une couche de sel et pressez le tout sous une assiette recouverte d'une grosse pierre propre. Après huit jours, videz le pot de toute la saumure qui s'y est formée et remplacez-le de saumure fraîche (mélange d'eau et de sel: la saumure est à point quand un œuf cru y flotte). Remplacez ensuite l'assiette et la pierre sur le tout.

Les tomates se conservent entières et nageant simplement dans un pot rempli à pleins bords de saumure qu'on doit, de toute nécessité, renouveler une fois après les huit premiers jours. Quant au cerfeuil, il suffit de le rouler dans du sel et de le tasser fortement dans un pot, sous une assiette et une pierre.

Au moment de l'emploi, le seul moyen de dessaler ces légumes est de les laisser tremper quelques heures dans de l'eau froide souvent renouvelée ou, mieux encore, de les placer quelque temps sous un jet d'eau froide. Surtout ne les faites pas bouillir tout de suite, car la cuisson y fixerait le sel que l'eau froide eût éliminé.

Songez donc à semer en caissettes, dès le 15 février, de la fève de marais grosse ordinaire qui, ainsi hâtée, ne sera pas attaquée par les pucerons. Au début de mars, semez le céleri rave géant de Prague en caissettes et le chou cabus blanc Quintal en pleine terre, à bonne exposition, pour les repiquer fin mai. Semez aussi une assez grande quantité de haricot à rames Princesse et de pois mangetout, et prévoyez un semis suffisant de cerfeuil et de tomates.

STÉRILISATION.

Enfin, le moyen le plus parfait et le plus pratique est la conservation en bocaux hermétiques V.S.L. qu'on stérilise pendant un certain temps à l'eau bouillante. Ces bocaux V.S.L., fabriqués par les célèbres Cristalleries du Val-Saint-Lambert et vendus chez les négociants en verreries et chez les quincailliers, offrent le maximum de solidité et de résistance à la chaleur. Ils vous permettront de conserver facilement les légumes en leur gardant toute leur saveur, au point qu'on ne pourra les distinguer des légumes frais. La contenance des bocaux, qui va de 1/4 de litre à cinq litres, en permet l'emploi aussi bien par les petits ménages que par les grosses communautés, tout comme leur prix très modéré les met à la portée de toutes les bourses.

Profitez-en pour conserver les légumes très fins dont la saison paraît toujours trop courte: asperges, jeunes carottes, côtes de céleris, champignons, choux-fleurs, petits pois, jeunes gousses de haricots, de fèves de marais et de pois mangetout, tomates, etc., dont vous prolongerez ainsi la consommation toute l'année.

Les Cristalleries du Val-Saint-Lambert ont bien voulu nous remettre une provision de leurs brochures contenant les renseignements nécessaires pour la conservation de tous les aliments. Si vous en désirez une, veuillez nous le signaler: nous nous empresserons de vous l'envoyer gracieusement.

Quant à la chaudière que vous devez employer pour y faire bouillir vos bocaux, elle peut parfaitement être une simple marmite large et haute, au fond de laquelle vous placez un lit de foin pour que le fond des bocaux ne soit pas en contact direct avec la forte chaleur. Un petit thermomètre de verre vous permettra de vérifier de temps en temps la température de l'eau. Il existe évidemment dans le commerce des chaudières spéciales, qui même pourraient être achetées en commun par plusieurs ménages, mais, comme nous venons de l'expliquer, elles ne sont pas indispensables.

A vous de voir maintenant la quantité de chaque légume que vous devez semer pour assurer cette récolte supplémentaire. Les variétés à préférer sont la carotte demi-longue de Huy, le céleri plein doré Chemin, le chou-fleur Lenormand, la fève de marais grosse ordinaire, le haricot à rames Princesse sans fils, le pois à rames Sénateur et la tomate Perdrigeon. Ce sont les plus savoureuses et les plus productives.

Et maintenant, quel plaisir ce sera pour vous de pouvoir, au cœur de l'hiver, varier abondamment vos menus, assurer à votre famille une alimentation saine et peu coûteuse, et quels que soient la température, l'heure ou le nombre des convives, préparer en quelques instants un délicieux repas.



GRAINES POTAGÈRES

COMMENT IL FAUT SEMER.

Nous croyons utile de résumer, pour les personnes peu habituées aux travaux horticoles, les règles essentielles de l'ensemencement des jardins. L'attention que nous accordons à la bonne qualité, à la haute germination des graines, et le soin que nous donnons à la sélection des variétés sont tels qu'il serait réellement regrettable que, faute d'expérience, nos clients s'exposent à de mauvais résultats.

Après avoir lu ces quelques indications, nos clients voudront bien consulter également la notice de la page 62 qui leur donnera de précieux renseignements sur les semis de légumes à repiquer.

SEMIS A CHAUD (SUR COUCHE CHAUDE).

Etendez sur le sol une couche de fumier frais de cheval, mélangé d'un tiers de feuilles sèches, sur une épaisseur de 80 cm. en janvier, de 60 cm. en février-mars, et de 40 cm. en avril. Sur cette couche, posez un cadre en planches de 30 cm. de haut, en laissant déborder la couche tout autour de 30 cm. Recouvrez le cadre d'une vitre. Quand, après 8 jours, la couche a donné son « coup de feu », remplissez ce châssis de terre légère, bien affermie, jusqu'à 8 cm. du bord, et, quand celle-ci est réchauffée, semez clair, en ayant soin de ne pas trop enterrer les graines. Recouvrez la vitre d'un paillason. De janvier à mars, entourez le coffre d'une bande de fumier de 30 cm. d'épaisseur, que vous remuez et renouvelez de temps en temps. Quand les premières pousses apparaissent, enlevez le paillason le jour, mais remettez-le la nuit tant qu'il fait froid. Aérez autant que possible.

SEMIS SOUS ABRI.

Choisissez un endroit bien abrité des vents du nord. Mélangez la terre de feuilles, mauvaises herbes, débris de toutes sortes, crottins de chevaux, fumier de lapins, etc. Arrosez abondamment, si possible avec du purin, puis tassez fortement. Sur la partie ainsi améliorée, posez un châssis vitré comme celui que nécessite la couche chaude. Remplissez-le de terreau (humus résultant de la décomposition de débris végétaux, mélangés à de la terre, du fumier et de la chaux ou des cendrées), puis semez et cultivez comme sur couche chaude.

SEMIS EN PLEINE TERRE.

Ne semez pas trop tôt. — Mieux vaut ne pas semer que semer dans une terre humide et non réchauffée. D'une façon générale, la réussite de l'opération dépend de l'état du sol.

Préparez bien le sol. — Travaillez et émiettez la terre. Laissez-la ressuyer. Dans les terres consistantes, on brise les mottes par un ou plusieurs ballages suivis d'énergiques ratissages. Tracez les lignes et ne les recouvrez, la graine semée, que quand elles sont bien ressuyées. Ne baliez jamais le terrain après les semis de première saison. Evitez surtout de travailler une terre encore humide.

N'enterrez pas trop les graines. — Recouvrez-les d'une épaisseur de terre proportionnée à leur grosseur. Les graines fines, le pourpier par exemple, seront à peine recouvertes. Les graines moyennes (oignons, carottes, etc.) seront recouvertes de 1 ou 2 cm. de terre ou de terreau. Les graines charnues (pois, haricots), de 3 à 4 cm. de fines cendrées tamisées (éviter le terreau). Plus le terrain est lourd et froid, moins on doit enterrer les graines et vice-versa.

Nos clients nous feront plaisir en employant notre bordereau de commande. Etabli dans l'ordre du catalogue, il empêche toute erreur ou confusion.

Tous nos paquets étant préparés d'avance, il nous est impossible de les diviser.

2 Ail blanc ou commun (bulbes) K.: 10 00; 500 g.: 5 40; 250 g.: 3 00
Chaque bulbe contient une dizaine de gousses. On plante l'ail en terre riche, en janvier et même à partir d'octobre.

9 Arroche ou Belle Dame, blonde
Remplace l'épinard en été. Semez toutes les 3 semaines, de mai à fin juillet. Récolte 1 mois après le semis.

11 Artichaut vert de Laon
Rustique. Pomme énorme. Semez en février, en petits pots placés sous abri. On sème même en pleine terre après le 15 avril.

14 Asperge grosse hâtive d'Argenteuil
Variété d'élite. Asperge énorme, exquise. A semer en mars. On plante aussi des griffes en avril (voir griffes d'asperges, page 61).

25 Aubergine violette longue
Les aubergines sont des fruits appréciés comme légume, surtout dans les régions chaudes. On sème en février à chaud, on repique sur couche et on peut planter en plein air fin mai.

30 Betterave potagère rouge-noir, plate d'Egypte

31 — potagère rouge-noir, demi-longue « Nec plus ultra »

39 — potagère rouge-noir, grosse longue
On consomme ces betteraves confites au vinaigre, cuites au four, ou cuites et découpées dans les salades. Semer en mai: récolte en septembre. Conserver l'hiver comme les carottes.

60 Cardon plein inermé (sans épines)
Précieux légume d'automne et d'hiver, trop peu cultivé. On sème en place, début mai, à 1 m. en tous sens. Jusqu'au 15 août, on peut cultiver d'autres légumes entre les cardons.

Paquet	15gr.	30gr.	100gr.
—	—	—	1 80
1 00	1 40	1 90	4 60
4 00	15 00	—	—
1 00	1 80	3 00	7 50
2 50	9 50	—	—
1 00	1 60	2 80	6 50
1 00	1 60	2 50	6 00
1 00	1 60	2 50	6 00
2 00	4 60	8 00	—

CAROTTES.



N° 71. — Carotte demi-longue de Huy.

Si vous voulez avoir de bonnes carottes toute l'année, vous devez faire trois espèces de semis.

1. — En février-mars. — Semez des carottes courtes à bonne exposition et recouvrez de terre légère. Vous récolterez fin mai. Vous pouvez aussi remplacer ce semis par un semis de carottes demi-longues en mars, qui produira fin juin-juillet.

2. — En avril et fin mai. — Faites deux semis successifs de carottes demi-longues ou longues pour la provision d'hiver. En octobre-novembre, arrachez les plantes; enlevez les feuilles avec le collet et laissez ressuyer les racines. Rentrez-les alors dans une cave aérée ou dans un local où il ne gèle pas; vous les y conserverez pour la consommation d'hiver en les mélangeant d'un terreau sableux. Vous pourrez aussi les mettre en silos où elles se conserveront parfaitement.

3. — Du 15 au 31 juillet. — Semez encore des carottes demi-longues. Mais, cette fois, vous ne les arrachez pas avant l'hiver. Quand les gelées arriveront, vous recouvrirez les plantes de feuilles mortes, de paille, de paillasons, etc., et vous les laisserez en terre. Dès mars-avril, au moment où les carottes de cave et de silos commencent à se ratatiner, vous aurez le plaisir de récolter d'excellentes carottes fraîches.

QUELQUES REMARQUES.

Pour avoir de belles carottes lisses et droites, prenez la précaution de bien travailler et d'émietter la terre avant de semer. Il est bon de faire des semis assez serrés. On éclaircit en récoltant à mesure que les plantes atteignent la grosseur du petit doigt. Les carottes demi-longues doivent être éclaircies à 5 cm., et les longues à 6/8 cm., pour atteindre tout leur développement.

Il arrive peut-être que vos semis de carottes, après avoir très bien levé, sont tout à coup détruits par places et ne forment plus que des fragments de lignes coupés de grands vides. C'est l'œuvre d'une araignée microscopique, le « thérion », qui s'attaque aux jeunes semis. Il suffit de fort peu de chose pour prévenir ses ravages: dès que les premières pousses apparaissent, piétinez vos lignes sur toute leur longueur, ou arrosez-les avec une solution d'eau et de suie.

1. CAROTTES POTAGÈRES.

		Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
65	Carotte rouge, très courte, extra-hâtive, à châssis Racine en forme de petite boule. Convient pour les cultures forcées. A consommer très jeune, par éclaircissage	1 90	4 30	7 50	—
68	— rouge courte, hâtive, de Hollande, ou Bellot Racine en forme de toupe. Pour cultures hâtées et premiers semis en pleine terre.	1 80	3 70	6 50	16 00
69	— rouge demi-courte obtuse de Guérande. Un peu plus longue et beaucoup plus large. Peut atteindre 10 cm. de diamètre. Chair très tendre, rouge; centre plus pâle.	1 20	2 50	4 30	11 00
70	— rouge demi-longue, Nantaise. Kil.: 64 00; 250 gr.: 18 00 Volumineuse, sans cœur, excellente. Une des bonnes carottes pour petits jardins. Recommandable pour provisions d'hiver.	1 00	2 00	3 50	8 00
71	— rouge, demi-longue, Nantaise, sans cœur, améliorée de Huy. Kil.: 96 00; 250 gr.: 26 00 Notable sélection de la Nantaise. Tout à fait sans cœur, longue, savoureuse et très productive, c'est la meilleure carotte de jardin. Semer en mars-avril, pour récolter fin juin; ou début mai pour récolte d'automne. La finesse de son goût la fait souvent préférer aux carottes longues pour les provisions d'hiver.	1 40	3 00	5 00	12 00
72	— rouge, demi-longue, sans cœur, améliorée, de Carentan. Cylindrique, lisse, très rouge, de grosseur moyenne mais de forme parfaite. Carotte de luxe, fine et très savoureuse.	1 60	3 50	5 40	14 00
73	— rouge demi-longue, de Chantenay K.: 80 00; 250 g. 23 00 Très large, obtuse, c'est une carotte de Guérande allongée. Chair très rouge à centre un peu plus pâle.	1 20	2 50	4 30	11 00
75	— rouge longue, obtuse, sans cœur Longue, cylindrique, sans cœur; chair rouge et de bon goût. Rendement excellent. La meilleure pour provisions d'hiver. Semer au début de mai pour récolter en octobre-novembre.	1 60	3 50	5 40	14 00
77	— rouge longue, de Saint-Valéry. K.: 64 00; 250 gr.: 18 00 Très rustique et de rendement considérable. Elle joint les mérites des carottes de jardin à ceux des races de grande culture.	1 00	2 00	3 50	8 00

2. CAROTTES FOURRAGÈRES.

Les carottes fourragères sont excellentes pour les lapins et le bétail.

78	Carotte rouge longue, à collet vert	250 gr.	16 00	1 00	1 80	3 00	7 50
79	— jaune obtuse du Doubs	250 gr.	16 00	1 00	1 80	3 00	7 50
81	— blanche, à collet vert, améliorée K.	46 00; 250 gr.	14 00	1 00	1 60	2 80	6 50

CÉLERIS.



N° 91. — Céleri plein blanc doré.

Céleris raves. — Semez en mars et repiquez en mai. Les plantes seront bonnes à consommer à partir de septembre. En octobre-novembre, arrachez les raves restantes et hivernez-les comme les carottes.

Très vorace et avide d'eau, le céleri demande une terre fraîche et très riche, surtout en potasse. Les arrosements avec notre engrais concentré (voir p. 41) lui seront prodigués.

Avant de les repiquer, trempez les jeunes plants de céleris dans une solution de bouillie bordelaise (voir page 41) pour les préserver de la rouille.

Céleris à jets. — Semez en mars et repiquez en mai. A partir de juin-juillet, vous commencerez à récolter les feuilles. Coupez-les au-dessus du collet et arrosez aussitôt pour provoquer une nouvelle végétation. Les céleris à jets supportent assez bien le froid. Vous pouvez aussi en empoter quelques-uns en octobre et les conserver à l'intérieur où ils produiront tout l'hiver.

Céleris à côtes. — Voici le moyen d'en avoir toute l'année. Préparez une couche chaude comme indiqué page 4. Semez-y des céleris à côtes en janvier et, si possible, repiquez-les une première fois sur couche; mettez-les en pleine terre fin mars. Vous récolterez en mai-juin. Trois semaines avant la récolte, liez les feuilles et entourez-les d'un peu de paille ou, mieux, de papier gris, pour les faire blanchir. C'est indispensable.

Fin mars, faites un deuxième semis, le plus important. Les plantes, repiquées fin mai, se récolteront à partir d'août et serviront aussi pour la provision d'hiver. Les plantes à hiverner ne sont pas blanchies sur place. En octobre, arrachez-les avec un peu de terre, replantez-les côte à côte au fond d'une tranchée profonde de 30 cm., et recouvrez-les aux deux tiers de terre sèche. Mettez un paillasson quand la gelée est à craindre, mais enlevez-le quand c'est possible. La récolte commence après trois semaines.

Dernier semis en juin. Repiquez en août et couvrez de châssis en hiver. Vous aurez des céleris frais en mars-avril.

1. CÉLERIS A JETS.

87 Céleri à jets fins, ordinaire

Feuillage aromatique. Délicieux assaisonnement des potages.

Paquet	10 gr.	15gr.	30gr.
1 00	1 60	2 20	4 40

2. CÉLERIS A COTES.

90 Céleri plein blanc, court, hâtif, à grosse côte

Sans drageons. Côtes épaisses, blanchissant par étiolement.

1 40	2 80	3 70	7 40
------	------	------	------

91 — plein blanc doré Chemin, amélioré

Côtes d'un beau blanc doré naturel. La meilleure variété d'automne et pour conserves. N'exige pas l'étiolement quoique celui-ci ajoute beaucoup à la finesse de son goût.

3 50	12 00	16 00	32 00
------	-------	-------	-------

92 — plein blanc d'Amérique

Côtes larges, blanches, devenant très tendres par l'étiolement.

2 00	5 00	7 00	14 00
------	------	------	-------

93 — plein doré à côtes roses

Côtes rose pâle. Un des meilleurs pour la culture d'automne.

2 50	6 50	9 00	18 00
------	------	------	-------

94 — plein violet de Tours

Rustique et vigoureux. Résiste bien au froid et à l'humidité.

1 40	2 80	3 70	7 40
------	------	------	------

3. CÉLERIS RAVES.

95 Céleri rave d'Erfurt

Très hâtif. Pomme très nette, ronde, à collet fin, pas très volumineuse mais de la meilleure qualité. Pour première saison.

1 50	4 00	5 40	10 80
------	------	------	-------

96 — rave géant de Prague

Pomme ronde, énorme, très peu racineuse, de bonne qualité.

1 40	3 50	4 60	9 20
------	------	------	------

99 Cerfeuil commun

250 gr.: 7 50
Rustique. Feuilles larges et découpées, de goût très aromatique. Il peut se confondre assez facilement avec la petite ciguë.

Paquet	15gr.	30gr.	100gr.
1 00	1 30	1 60	3 70

100 — frisé

250 gr.: 9 50
Ne peut se confondre avec la petite ciguë. Aussi facile à cultiver que le commun. Semer à l'ombre toutes les 3 semaines à partir de mars. Récolte à partir de mai. Au début de septembre, en faire un bon semis qui produira jusqu'au printemps.

1 00	1 40	1 90	4 60
------	------	------	------

105 Champignon (Blanc de)

3 briques: 9 00; 6 briques: 17 00
On peut faire une couche de champignons en toute saison, dans un local ni trop sec, ni trop humide (cave). Six briques suffisent pour larder plus d'un mètre de surface de meule. Une notice détaillée accompagne d'ailleurs chaque livraison.

—	—	—	—
---	---	---	---

CHICORÉES.



N° 125. — Chicorée-scarole verte.

Les chicorées sont d'excellents légumes. Elles donnent des salades délicieuses. Cuites, elles ont une agréable saveur amère et sont bien-faisantes pour l'estomac.

Chicorées-endives et scaroles. — Semez l'endive toujours blanche, la plus hâtive, en place vers le 15 avril. Récolte par fauchages successifs en juin, juillet et août.

Semez les autres endives et même les scaroles fin mai-juin, pour repiquer en juillet. Quand les plantes ont atteint leur développement, rassemblez et ficelez les feuilles pour que le cœur blanchisse. Quinze jours après, commencez la récolte que vous prolongerez en recouvrant vos plantes de sacs quand les gelées sont à craindre.

Les chicorées-endives et surtout les scaroles se conservent très bien l'hiver. Faites un bon semis vers le 15 juillet et repiquez fin août. En octobre, un jour sec, arrachez les plantes, liez-les et replantez-les dans une tranchée de 30 cm. de profondeur, que vous laissez ouverte à l'air libre mais que vous fermez avec des sacs quand la gelée menace. Vous récolterez tout l'hiver.

Chicorées sauvages. — La Barbe de Capucin, la chicorée améliorée, la chicorée à café et la Witloof se sèment au début de mai. Elles ont chacune leur culture spéciale bien détaillée sur nos sachets de graines. A partir de fin août, vous procurerez à vos lapins une excellente nourriture en cueillant quelques feuilles à chaque plante de Witloof.

1. CHICORÉES-ENDIVES.

	Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
103. Chicorée-endive frisée, toujours blanche	1 60	3 50	5 40	—
Feuillage finement frisé, naturellement blanc. Semée en place, elle donne plusieurs récoltes comme la laitue à couper.				
110 — endive frisée fine d'été ou d'Italie	1 40	3 00	5 00	—
Rosette serrée, cœur bien plein. Feuillage finement découpé, côtes rosées. Pour la culture forcée et les premiers semis.				
115 — endive frisée Impériale ou du Bengale	1 60	3 50	5 40	—
Rosette haute, bien fournie, d'un vert blond. Feuilles larges et frisées jusqu'à la base. Excellente variété d'été.				
116 — endive frisée de Louviers	1 40	3 00	5 00	—
Rosette ramassée en boule, extrêmement serrée. Cœur très large et bien plein. Occupe peu de place. Pour l'été et l'automne.				
117 — endive frisée de Meaux	1 40	3 00	5 00	—
Rosette étalée, à feuilles larges. Rustique. Résiste à la chaleur et à la sécheresse. Convient bien pour l'automne.				
118 — endive frisée, grosse pancalière	1 40	3 00	5 00	13 00
A développement rapide. Résiste bien à la chaleur. Feuilles larges, serrées, dressées, blanchissant presque naturellement.				
120 — endive frisée de Rouen (corne de cerf)	1 40	3 00	5 00	—
Rosette large et très pleine. Feuillage vert gris, peu frisé. Rustique. Convient pour les terrains humides et pour l'automne.				
222 — endive frisée de Ruffec	1 20	2 50	4 30	11 00
Très large, touffue, bien pleine. Feuilles très frisées, à côtes larges et tendres. Convient à la fois pour l'été et l'automne et résiste admirablement au froid. Tout à fait hors ligne.				

2. CHICORÉES-SCAROLES.

125. Chicorée-scarole verte, ronde, à cœur plein	1 20	2 50	4 30	11 00
Rosette très grosse. Feuilles larges à côtes blanches et épaisses, formant au centre une sorte de cœur blanchi.				
126 — scarole large, dorée, à cœur plein	1 40	3 00	5 00	—
De même forme que la précédente, mais à feuillage plus découpé et d'un beau blond très appétissant.				

3. CHICORÉES SAUVAGES.

130. Chicorée sauvage ordinaire ou amère, Barbe de Capucin	1 00	1 60	2 80	6 50
Donne, par étiolement, une excellente salade en hiver.				
131 — sauvage améliorée blonde	1 20	2 50	4 00	10 00
Rosette de larges feuilles blondes pommant naturellement.				
132 — à grosse racine à café	1 20	2 50	4 00	10 00
Racine assez grosse, très longue et effilée. Cent kilos de racines donnent, grillés et pulvérisés, une vingtaine de kilos de chicorée.				
134 — de Bruxelles ou Witloof . . . Kil.: 114 00; 250 gr.: 32 00	1 80	3 50	6 00	15 00
Connue en France sous le nom d'endive. Précieux et excellent légume d'hiver. La culture et la récolte en cave des chicorées Witloof sont détaillées sur chaque paquet de graines.				

CHOUX.

Choux pommés blancs et rouges. — Faites-en deux semis: un vers le 15 août qui produira en juin-juillet si la variété est hâtive, en août-septembre si elle est tardive; un second de mars en juin, que vous récolterez en septembre-octobre et qui vous servira à faire la provision d'hiver.

Choux de Milan. — Semez une variété hâtive et une mi-hâtive, vers le 15 août. Vous récolterez à partir de fin mai. Semez ensuite, en mars, une variété mi-hâtive qui produira en août-septembre, puis une variété tardive en avril. Les plantes seront repiquées entre les pommes de terre et viendront continuer la production.

Choux de Bruxelles. — Encore un bon légume d'hiver. Semez-le en mars et en avril pour récolter d'octobre jusqu'en mars suivant. Cueillez toujours les pommes de bas en haut.

Choux non pommés. — Les choux verts n'ont tout leur goût que quand ils ont été gelés. Ils donnent tout l'hiver un légume excellent, surtout le chou Céo, beaucoup trop peu connu. On les sème en mars et en avril et on récolte depuis les gelées jusque bien tard au printemps. Le chou fourrager cavalier fournit en hiver une bonne nourriture pour les lapins.

Choux-fleurs. — Semez: 1. une variété hâtive en septembre; récolte en mai-juin; 2. en février-mars, une variété tardive qui produira en été; 3. fin avril, une mi-hâtive pour récolte d'automne et conservation d'hiver; 4. en juin, une variété de Brocoli qui produira fin avril.

Choux-raves. — Semez-en au printemps pour la consommation d'été; puis, en juin, pour récolter avant l'hiver et hiverner en cave.

Choux-navets. — Semez fin avril-mai et rentrez en octobre pour conserver l'hiver.



N° 146. — Chou pommé de Brunswick ou de Boston.

1. CHOUX POMMÉS CABUS BLANCS.

Les choux blancs hâtifs 137, 143 et 145, à tête pointue, se consomment en été. Ils sont de goût bien plus fin que les choux à tête ronde (tardifs) et moins exigeants qu'eux. Ils sont beaucoup trop peu connus.

137 Chou blanc express

Extra-hâtif, pommant dès la sixième feuille. Grosseur moyenne.

143 — blanc pain de sucre.

Hâtif. Pomme haute, très allongée, de goût exquis. Le meilleur.

145 — cœur de bœuf gros

Hâtif et rustique. Pomme assez large, haute, conique, vert grisâtre, restant longtemps sans se déformer.

146 — blanc de Brunswick ou de Boston

Pied court. Pomme grosse, aplatie, vert vif. Excellente race. Rendement important. Pour l'automne et le début de l'hiver.

148 — blanc de Hollande, tardif.

Tardif, extrêmement rustique. Pomme pleine et très ferme.

149 — Quintal, gros d'Alsace ou de Strasbourg

Très tardif et rustique. Enorme pomme vert pâle, aplatie, très dure, convenant bien pour la choucroute. De grande culture.

2. CHOUX POMMÉS CABUS ROUGES.

152 Chou rouge, tête de nègre

A pied court. Vigoureux et très précoce. Bonne petite pomme rouge foncé, bien ronde et très serrée. Extra pour salades.

156 — rouge Exportation

Un peu plus tardif, mais de rendement considérable. Pied élevé, pomme grosse, rouge foncé, se formant assez vite.

157 — rouge polonais.

Pied presque nul. Pomme plate très serrée, très dure, rouge foncé. Variété d'automne et d'hiver. Cultivée depuis longtemps chez nous, elle y est devenue aussi rustique que la suivante.

158 — rouge foncé gros, tardif amélioré

Au prix de longues sélections, nous avons fait de ce chou une variété purement d'hiver, donc à semer en août pour être mis en place avant ou après l'hiver. Pied très court, pomme très grosse, très ferme. Absolument rustique. Les jeunes plants résistent à tous les froids. Extra pour grandes cultures.

Paquet	15gr.	30gr.	100gr.
2 20	5 00	8 50	—
2 20	5 00	8 50	—
1 90	4 30	7 50	—
1 90	4 30	7 50	19 00
2 20	5 00	8 50	21 00
1 90	4 30	7 50	19 00
3 00	7 00	11 00	—
3 00	7 00	11 00	—
2 20	5 00	8 50	—
2 20	5 00	8 50	21 00

3. CHOUX DE MILAN, POMMÉS, FRISÉS.

		Paquet	15gr.	30gr.	100gr.
162	Chou de Milan, hâtif de Savoie (Saint Sacrement) Sélectionné par nos soins, très rustique. Le plus hâtif. De goût exquis. Semé en août, il pousse en mai. Après que la pomme a été coupée, il en repousse deux ou trois petites.	2 20	5 00	8 50	21 00
163	de Milan, hâtif de la Saint-Jean Très hâtif. Pied très court, pomme conique, renflée, se formant vite; peu de feuilles extérieures. A semer au printemps.	2 20	5 00	8 50	—
166	de Milan, mi-hâtif d'Aubervilliers Sélection du « Gros des Vertus », moins résistant, mais plus précoce. Le plus hâtif des choux de Milan à grosse pomme.	1 90	4 30	7 50	—
167	de Milan, mi-hâtif gros des Vertus Pied haut. Pomme énorme et très serrée. Résiste aux premiers froids. Excellente variété d'automne et du début de l'hiver.	1 90	4 30	7 50	19 00
168	de Milan, de Pontoise Variété d'hiver. Grosse pomme très ferme et serrée, résistant admirablement aux froïds. Le plus cultivé autour de Paris.	2 20	5 00	8 50	—
170	de Milan, tardif, de Norvège Pomme ronde assez petite. Le plus tardif et le plus rustique.	1 90	4 30	7 50	—

4. CHOUX DE BRUXELLES.

174	Chou de Bruxelles ordinaire Tige d'environ 1 m. Pommes allongées, espacées. Rustique.	1 90	4 30	7 50	—
175	de Bruxelles, demi-nain de la Halle Tige de 0 m. 50 à 0 m. 70. Nombreuses pommes moyennes, bien rondes et serrées sur la tige. Très rustique. Le meilleur.	2 20	5 00	8 50	21 00

5. CHOUX NON-POMMÉS.

178	Chou d'hiver, frisé vert, à pied court Feuilles finement frisées, ornementales. Les gelées le rendent tendre et de bon goût. Très précieux pour les contrées froides.	1 20	2 50	4 00	—
179	d'hiver, frisé vert, grand, du Nord Mêmes caractéristiques. Mais les feuilles sont étagées sur la moitié supérieure d'une tige de 1 m. à 1 m. 50 de haut.	1 00	2 00	3 50	—
184	d'hiver, vert Cœo ordinaire, à jets Développe des jets feuillus et tendres aux aisselles des feuilles. On récolte jets et feuilles vers la fin de l'hiver. Précieux légume d'hiver, de goût très fin, surtout cultivé en Wallonie où on l'appelle « Broccoli ».	2 00	—	—	—
188	fouurrager cavalier rouge, Caulet des Flandres Vigoureux, atteignant 1 m. 25. Grandes feuilles violacées. Très résistant au froid. Le seul recommandable en grande culture.	1 40	2 50	4 00	10 00



N° 187. — Chou de Milan gros des Vertus.

6. CHOUX-FLEURS.


		Paquet	10 gr.	15 gr.	30 gr.
193	Chou-fleur blanc hâtif de Malines ou de Louvain Extrêmement hâtif, autant que le chou-fleur d'Erfurt, mais plus gros et de meilleure conservation. Bien blanc, de grain très fin.	5 40	21 00	30 00	—
196	— nain, hâtif de six semaines Le plus parfait des choux-fleurs nains hâtifs. Pied très court, feuilles enveloppantes. Pomme bien blanche, très dure, de grain fin, de goût exquis, se conservant vraiment bien. Très rustique.	5 40	21 00	30 00	—
197	— Lenormand, à pied court Pied très court, pomme énorme, très ferme, très blanche, à développement rapide. Précoce, productif, rustique, occupant peu de place, il a tous les mérites. Le plus recommandable.	4 60	17 00	25 00	—
199	— tardif gros, dur de Hollande Demi-tardif. Grande variété rustique à pied haut. Pomme moyenne, très dure et serrée. Pour grandes cultures.	2 50	7 00	9 50	—
201	— tardif géant d'automne Pied élevé. Pomme très grosse, ferme et blanche. Excellente variété tardive. Semer en février-mars. Récolte jusqu'en novembre.	2 80	9 00	12 00	—
205	— d'hiver, Brocoli d'Angers ou de Saint-Laud, tardif, extra Hâtif et rustique. Grosse pomme régulière, ferme, blanche et d'un grain très fin. Se récolte en avril-mai.	4 60	17 00	25 00	—
206	— d'hiver, Brocoli d'Angers ou de Saint-Laud, tardif, extra Pomme ferme, très blanche et d'un grain très fin, bien abritée par le feuillage. Récolte en mai.	6 00	25 00	38 00	—

7. CHOUX-RAVES, A TIGE RENFLÉE.

		Paquet	15gr.	30gr.	100gr.
210	Chou-rave blanc, hâtif de Vienne Récolte deux mois et demi après le semis. Petite pomme blanche, ronde, à chair tendre et très fine. Très jolie variété.	1 90	4 30	7 50	—
212	— violet Goliath Très tardif. Pomme volumineuse, vert pâle, à chair fine, restant très ferme même à un état de développement avancé.	1 80	3 70	6 50	—

8. CHOUX-NAVETS.

217	Chou-navet rutabaga, gros jaune, à collet rouge, Champion de Sutton . Kg. 42 00; 500 gr.: 23 00; 250 gr.: 12 00 Grosse racine presque ronde, à chair jaune. Variété fourragère la plus estimée et la plus recommandable pour grandes cultures.	1 00	1 40	2 20	6 00
219	Chou de Chine (Pé Tsaï) amélioré	1 00	2 00	3 50	—
221	Chou-marin (crambé maritime)	1 50	4 60	8 00	—
223	Ciboule blanche hâtive. Feuilles longues et fines ayant un goût d'oignon très prononcé.	1 90	4 00	7 00	—
224	Claytone perfoliée, pourpier d'hiver, claytone de Cuba Feuilles en cornet, épaisses et charnues. Remplace le pourpier en automne et en hiver. Se sème fin juillet-août.	3 00	—	—	—



N° 210. — Chou-rave blanc.

N° 193. — Chou-fleur de Malines.

CONCOMBRES.

	Paquet	15gr.	30gr.	100gr.
226 Concombre blanc, très gros, de Bonneuil Fruits blancs, ovoïdes, atteignant 2 kgs. Pour pleine terre.	1 20	3 70	6 50	—
227 — vert très long Fruits allongés, à consommer jeunes, avant leur jaunissement.	1 40	4 00	7 00	—
228 — Rollisson's Telegraph Fruits longs, superbes, exquis. Cultivé sur couche et en serre.	6 00	—	—	—

CORNICHON.

235 Cornichon vert, petit de Paris Vigoureux, très productif, le meilleur. Semez début mai.	1 00	2 50	4 30	—
--	------	------	------	---

COURGES.

237 Courge à la moelle, courge coureuse. A cueillir lorsqu'elle atteint 15 cm. Goût de chou-fleur.	1 40	3 00	5 00	—
243 — citrouille de Touraine Fruits gigantesques, généralement utilisés pour le bétail.	1 00	1 40	1 80	—
244 — potiron, gros jaune de Paris Peut peser 50 kgs. Chair excellente, se conservant longtemps.	1 00	1 80	3 00	—

CRESSON.

259 Cresson alénois commun	1 00	1 40	1 90	4 60
260 — alénois frisé Assaisonne délicieusement les salades. Semer de mars en août.	1 00	1 40	1 90	4 60
263 — de jardin ou vivace. Moins tendre et plus piquant, il ne monte à graines que la 2 ^e année. Se sème à partir de mars et se récolte surtout l'hiver.	1 00	2 00	3 50	—
264 — de fontaine On peut en obtenir à mi-ombre en arrosant beaucoup.	2 50	—	—	—

ÉCHALOTE.

	15gr.	30gr.	100gr.	250gr.	500gr.	Kilogr.
265 Echalote ordinaire (bulbes) Plantez dès février pour récolter en juillet-août.	—	—	1 50	2 50	4 00	7 00

ÉPINARD.

Semer: 1. Fin février: récolte en mai; 2. Au 15-20 août: récolte en automne; 3. Début septembre: récolte en hiver et au printemps.

En été, l'épinard monte à graines. Remplacez-le par l'arroche (n° 9), la ficoïde (n° 286), la poirée blonde (n° 478), la tétragone (n° 589).

268 Epinard de Hollande	1 00	1 40	3 00	6 00	11 00	19 00
269 — monstrueux de Viroflay Vigoureux, rustique. Feuille énorme. Très cultivé.	1 00	1 40	3 00	6 00	11 00	19 00
270 — lent à monter	1 00	1 40	3 50	7 00	12 00	21 00
272 — Triomphe. Grandes feuilles vert foncé, cloquées, charnues.	1 00	1 40	3 50	7 00	12 00	21 00
274 — d'Angleterre, à graine piquante Lent à monter. A semer au printemps.	1 00	1 40	3 50	7 00	12 00	21 00
— perpétuel voir n° 432	—	—	—	—	—	—

FÈVES DE MARAIS.

Semez du 1^{er} février à fin mars, mais pas plus tard, car vos fèves risqueraient d'être envahies par le puceron noir qui apparaît vers le 15 mai. On le combat par le Réol, le tabac en poudre (voir p. 41) ou la chaux.

282 Fève de marais, naine, hâtive ou à châssis Précoce, productive, excellente. Petite plante pour châssis.	2 20	4 30	8 00	15 00
283 — de Séville Hâtive, demi-haute. Très belles cosses, de bonne qualité.	1 90	3 50	6 00	10 00
284 — grosse ordinaire hâtive Haute: 0 m. 80 à 1 m. Très rustique et productive. Nombreuses cosses larges à gros grains; excellentes. La plus cultivée.	1 80	3 00	5 00	9 00
285 — de Windsor, verte, large Haute. Productive. Tardive: parfois attaquée par les pucerons.	2 20	4 30	8 00	15 00

	Paquet	15gr.	30gr.	100gr.
286 Ficoïde glaciale, Mesembrianthemum crystallinum Rosette de larges feuilles semblant couvertes de petits cristaux: semer début juin. Remplace parfaitement l'épinard tout l'été.	2 00	8 00	14 00	—

HARICOTS.



N° 295. — Haricot à rames Princesse sans fils.

Le haricot est un précieux légume, extrêmement nourrissant.

Les haricots à écosser ont les cosses vite fibreuses et sont surtout cultivés pour la production de grains secs. Pour cela, cueillez les gousses quand elles sont bien pleines et laissez-les sécher dans un grenier. Si vous voulez des grains spécialement tendres et délicats, cultivez la variété flageolet Chevrier à grain vert (n° 304). Vous cueillerez les gousses avant qu'elles aient atteint leur complet développement, mais quand elles peuvent déjà s'ouvrir facilement, et vous les ferez sécher lentement à l'ombre, après les avoir plongées trois minutes dans l'eau bouillante. Le grain restera bien vert et frais dans sa gousse.

Les haricots mangetout, comme leur nom l'indique, se consomment avec leur gousse. Mais, une fois arrivés à maturité, ils peuvent aussi être séchés pour la provision de grains. Les mangetout sont un délicieux légume vert dont on fait de nombreux usages. On les conserve salés ou stérilisés en bocaux.

Les haricots mangetout ou à écosser se divisent, en outre, en haricots nains et à rames. Les haricots nains sont plus précoces que ceux à rames. Mais les haricots à rames atteignant un plus grand développement sont naturellement plus productifs. Vous ferez donc bien d'en semer des deux sortes: les haricots nains donneront les premières récoltes et ceux à rames viendront continuer la production, qui durera tout l'été si vous avez fait quelques semis successifs. Vous pourrez même semer, vers le 10 juillet, des haricots nains noirs, de Belgique (n° 300) qui, moyennant un abri à partir de fin septembre, vous donneront encore de bons mangetout verts en novembre.

Le haricot demande une situation largement éclairée et ensoleillée, bien aérée, mais protégée contre les grands vents, une terre légère, riche, saine, perméable et, de préférence, fumée l'automne précédent, car un fumier bien décomposé et bien incorporé au sol lui est indispensable. Il redoute l'excès de calcaire et la surabondance d'azote. Au contraire, les engrais phosphatés et potassiques lui sont absolument nécessaires.

Il craint l'humidité, qui fait pourrir les grains semés ou tache les grains adultes.

D'une manière générale, aussi bien en grande culture qu'en culture potagère, les terrains trop compacts, trop humides ou trop calcaires ne peuvent convenir au haricot.

Il est, de plus, extrêmement sensible au froid et demande, pour bien se développer, une température assez élevée. Il ne supporte même pas une gelée de 1 ou 2 degrés. Aussi ne faut-il pas semer les haricots nains avant les premiers jours de mai, ni les haricots à rames avant le 10 mai.

Certaines années, ou lorsqu'on a semé trop serré, on voit parfois des haricots nains filer et s'allonger. Nous tenons à en prévenir nos clients pour qu'ils ne croient pas à une erreur de fourniture.

1. HARICOTS A RAMES, A ÉCOSSER.

288 Haricot à rames, Sabre, à très grande cosse, à hacher.

Variété très vigoureuse et productive. Cosses droites, remarquablement longues et pleines que l'on consomme, jeunes ou presque adultes, découpées en fines tranches. Convient également bien pour conserves. Grain excellent, frais ou sec.

289 — à rames de Soissons, blanc.

De bon rapport. Cosses larges assez recourbées, vertes, mais devenant jaunâtres en mûrissant. Cultivé pour son grain blanc très estimé.

100gr.	250gr.	500gr.	Kilogr.
2 20	4 00	7 50	14 00
2 20	4 00	7 50	14 00

2. HARICOTS A RAMES, MANGETOUT.

	100gr.	250gr.	500gr.	Kilogr.
295 Haricot à rames, Princesse, sans fils, cosse verte	2 50	5 00	9 00	17 00
La meilleure variété de mangetout, assez précoce, très rustique et extrêmement productive. Cosses vertes, droites, assez longues et extraordinairement nombreuses. De goût très fin. Grain blanc, ovoïde. Très cultivé en Belgique.				
296 — à rames, beurre blanc d'Alger, cosse jaune	2 20	4 30	8 00	15 00
Cosses longues et minces, tendres, délicieuses. Très apprécié comme mangetout et cultivé aussi pour son grain sec, bien blanc et appétissant.				
297 — à rames, beurre noir d'Alger, cosse jaune	2 00	3 70	7 00	13 00
Cosses un peu moins longues mais plus larges. De moyenne saison. Egalement un excellent mangetout. Reste tendre jusqu'à sa maturité.				
298 à rames, Le Géant de Vancelst, cosse verte (manque).	—	—	—	—
C'est aussi un des bons mangetout. Superbes cosses, très longues, très nombreuses. De rapport extraordinaire.				
299 — à rames, Phénomène, cosse verte	2 20	4 30	8 00	15 00
Très vigoureux et rustique. Le plus productif. Grappes de longues cosses. Mangetout et grain sec excellents.				

3. HARICOTS NAINS A ÉCOSSE.

300 Haricot nain, noir de Belgique	1 80	3 00	5 00	9 00
Variété très naine, rustique et très précoce, convenant parfaitement pour la culture forcée sous châssis. Cosses droites, bien vertes, à consommer jeunes. Convient également pour culture d'automne.				
301 — nain, du Perreux	1 90	3 50	6 50	12 00
Hâtif. Très nombreuses cosses droites, atteignant 20 cm. Cosses jeunes, excellentes. Grain chamois clair. Production abondante et prolongée.				
302 — nain, flageolet blanc	1 80	3 00	5 40	10 00
Type du haricot à écosser. Grain frais délicieux. Donne, avec le Suisse, la plus abondante provision de grains secs. Variété de grande culture.				
303 — nain, l'Inépuisable blanc	1 90	3 50	6 00	11 00
Très caractéristique. Nombreuses cosses vertes et droites qui se renouvellent constamment si on les cueille régulièrement.				
304 — nain, flageolet Chevrier, à grain toujours vert	1 90	3 50	6 50	12 00
Grain délicieux. Queillir les gousses encore vertes et les faire sécher lentement: le grain reste bien vert et tendre dans sa gousse.				
307 — nain, Saint-Esprit ou à la Religieuse	2 00	3 70	7 00	13 00
Productif. Cosses longues. Grain blanc à ombilic tacheté.				
310 — nain, Suisse, blanc ou « Lingot »	1 90	3 50	6 00	11 00
Un peu tardif. Variété vigoureuse, rustique et très productive. Pour la provision de grains secs. Haricot de grande culture.				

4. HARICOTS NAINS, MANGETOUT.

311 Haricot nain, extra-hâtif, cosse verte	2 20	4 00	7 50	14 00
Très nain. Dépasse en précocité tous les autres mangetout. Pour cultures forcées, Grain sec d'un beau blanc, très estimé.				
313 — nain, Princesse, sans fils, cosse verte	3 20	6 50	12 00	23 00
Très bon mangetout à cosses vertes, tendres, de goût très fin. Donne également une bonne provision d'excellents grains secs. Variété très demandée. Une des plus cultivées en Belgique.				
314 — nain, Princesse, sans fils, de Volgers	3 70	7 50	14 00	27 00
Cosses tendres et délicieuses. Convient par excellence pour les conserves de jeunes gousses. Peu cultivé pour son grain.				
316 — nain, beurre, Merveille du Marché	2 00	3 70	7 00	13 00
Superbes cosses jaunes, droites, très longues, tout à fait sans parchemin. Grain noir. Production très abondante.				
317 — nain, beurre du Mont d'Or, cosse jaune	2 20	4 00	7 50	14 00
Très précoce et productif. Cosses jaunes, charnues, bien pleines, extra-nombreuses. C'est le meilleur, le plus durable et le plus résistant des mangetout nains. Grain roux foncé.				
318 — nain, Roi des beurres, cosse jaune	2 50	4 60	8 50	16 00
Un peu plus délicat. Egalement un des bons mangetout. Cosses épaisses, recourbées et d'une couleur jaune vif très typique. Production abondante et soutenue. Grain sec très tendre.				

LAITUES.

Il y a des laitues de toutes les saisons. Il faut donc en semer successivement de toutes les époques pour avoir toujours de la salade fraîche. La laitue exige une terre substantielle et le plein soleil.

Les laitues à couper sont les plus précoces. Elles ne pomment pas mais se fauchent quand elles ont 4/5 cm. Semez-les en place dès les premiers beaux jours. La variété frisée d'Amérique repousse bien après fauchage quand on n'a pas coupé l'œil des plantes. Elle vous donnera ainsi plusieurs récoltes.

Les laitues pommées printanières, plus hâtives que celles d'été, conviennent pour les premiers repiquages seulement, car, en été, elles montent trop vite à graines. Semez-les de mars à fin avril et repiquez-les quand elles ont 6/7 cm. Elles pommeront en mai-juin.

Les laitues pommées d'été et d'automne donnent des pommes volumineuses et supportent les chaleurs sans monter vite à graines. Semez-en toutes les 3 semaines du 15 avril au 1^{er} août. Vous récolterez de belles et bonnes laitues, de fin juin jusqu'aux gelées.



N° 325. — Laitue gotte jaune d'or.

Les laitues d'hiver peuvent, moyennant un léger abri, passer l'hiver sous nos climats. Semez-les au début de septembre, repiquez en rigoles et couvrez de feuilles ou de sacs en hiver. Vous récolterez dès le premier printemps.

La laitue romaine, appelée aussi chicou, a les feuilles étroites et longues, dressées en forme de cône obtus. On la consomme surtout étuvée, mais on peut aussi en faire une salade délicieusement rafraîchissante. Semez-la comme les laitues d'été et repiquez à 40 cm. La pomme, qui peut atteindre 3 kilos, se formera deux mois après le repiquage. Rassemblez les feuilles extérieures en pain de sucre et liez-les avec un raphia, quand la plante aura presque atteint son complet développement.

1. LAITUES A COUPER.

	Paquet	15gr.	30gr.	100gr.
321 Laitue blonde ronde à couper, graine blanche	1 00	2 50	4 00	10 00
Souvent cultivée sous châssis. Croissance rapide. A faucher très jeune.				
322 — frisée, à couper, graine noire	1 20	2 80	4 60	12 00
Rustique et productive. Grandes touffes de feuilles frisées. Pour pleine terre.				
324 — frisée d'Amérique, graine blanche	1 40	3 50	5 40	—
Touffes de feuilles frisées fortement teintées de rouge cuivré sur les bords. Cette laitue repousse bien après fauchage, ce qui permet d'obtenir plusieurs récoltes successives.				

2. LAITUES POMMÉES PRINTANIÈRES.

	1 20	2 80	4 60	12 00
325 Laitue gotte jaune d'or, graine blanche	1 20	2 80	4 60	12 00
Bonne variété de printemps remarquablement précoce. Petite pomme aplatie, peu serrée, à feuilles cloquées et chiffonnées, d'un beau vert blond presque jaune. Quoique montant un peu plus vite à graines que la variété suivante, elle est généralement préférée des amateurs, à cause de sa belle couleur dorée très appétissante.				
326 — gotte ou gau, graine blanche	1 40	3 50	5 40	—
De croissance rapide. Feuilles vert blond très cloquées. Petite pomme assez ferme et résistant longtemps. Plante trapue, ramassée, pouvant être plantée à 17-18 cm. en tous sens et de ce fait réellement productive.				
327 — à bord rouge ou cordon rouge petit, graine blanche. .	1 40	3 50	5 40	—
Une des plus productives des laitues de printemps. Pomme très pleine, très serrée, tordue, à feuilles blond pâle marquées de rouge sur les bords. Très tendre et ferme. Une des meilleures variétés.				
328 — Reine de Mai, graine blanche	1 20	2 80	4 60	12 00
Presque aussi précoce que les variétés précédentes, elle donne une belle pomme vert clair, légèrement rougeâtre au sommet, de grosseur comparable à celle des laitues d'été. Très résistante au froid et à l'humidité, elle convient aussi bien pour la culture forcée que pour la culture d'été. Tient longtemps sa pomme.				

3. LAITUES POMMÉES D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE.

	Paquet	15gr.	30gr.	100gr.
332 Laitue palatine ou rousse, graine noire La plus hâtive des laitues d'été. Pomme assez grosse, très pleine, d'un vert sombre taché de brun. Très bonne variété rustique, très estimée des maraîchers des environs de Paris.	1 40	3 50	5 40	—
334 — du Trocadéro, Lorthoïs ou gros cordon rouge, gr. blanche Très hâtive. Feuilles vert pâle, teintées de rouge violacé, formant une pomme compacte, aplatie d'aspect caractéristique. Excellente pour le début de l'été. Réussit partout.	1 20	2 80	4 60	12 00
335 — Lilloise, graine noire Identique à la variété « sans rivale » mais à graine noire. Développe en 6 semaines une belle pomme blonde, volumineuse, ferme, excellente et résistant bien à la chaleur. On peut la semer toute la saison, de façon à obtenir une production continue.	1 40	3 50	5 40	—
336 — blonde du Cazard, graine noire Grosse pomme ronde, très serrée, blanche et tendre à l'intérieur, et restant bien fermée. Résiste à la chaleur.	1 20	2 80	4 60	—
337 — grosse blonde paresseuse, graine blanche Très grosse pomme haute à sommet aplati, vert blond extrêmement pâle. C'est une des bonnes variétés de laitues d'été, bien productive, réussissant toujours. Supporte les grandes chaleurs sans monter vite à graines.	1 20	2 80	4 60	12 00
338 — grosse brune tête ou St-Jean-l'Agneau, graine blanche. Belle plante à feuilles larges, à grosse pomme bien pleine, d'un vert vif taché de brun. Résiste également bien aux chaleurs. Son nom lui vient de la longue durée de sa pomme. C'est, avec la précédente, la plus demandée des laitues d'été.	1 20	2 80	4 60	12 00
340 — merveille des quatre saisons ou Besson rouge, gr. noire. Rapide et à développement rapide. Belle grosse pomme arrondie, à feuilles très cloquées, vert pâle, abondamment colorées de rouge vif. Réussit également bien au printemps, en été et en automne.	1 40	3 50	5 40	14 00
341 — géante d'été ou laitue de Montluçon à graine jaune. Très semblable à la variété « Emilia ». Grosse pomme très haute, ferme, d'un vert blond légèrement teinté de rose, au sommet. Monte peu à graines. Production très abondante.	1 40	3 50	5 40	—
343 — Batavia blanche frisée ou de Pierre-Bénite, gr. blanche. Grosse pomme arrondie, aplatie, ayant l'aspect de la variété « chou de Naples », mais d'un blond beaucoup plus pâle et à feuilles plus frisées. Vigoureuse, résistante et de culture facile.	1 50	4 30	7 50	—
344 — Batavia de Paris ou blonde géante, graine blanche. Pomme volumineuse, blond doré, un peu aplatie, pleine, très résistante. Feuilles croquantes, savoureuses, rafraîchissantes pendant les chaleurs. Très estimée aux environs de Paris.	1 50	4 30	7 50	—

4. LAITUES POMMÉES D'HIVER.

345 Laitue Passion blonde d'hiver, graine blanche Pomme ronde, assez grosse, vert pâle, lavée de rouge. Rustique.	1 20	2 80	4 60	12 00
346 — brune d'hiver, graine blanche. Très rustique. Feuilles cloquées, fortement tachées de brun. Pomme arrondie, assez pleine, d'excellente qualité. Occupe peu de place.	1 40	3 50	5 40	—
348 — d'hiver Bourguignonne, graine blanche Hâtive et d'une rusticité remarquable. Plante vigoureuse à larges feuilles très cloquées et frisées. Grosse pomme ronde, vert blond, plissée, bien pleine. Variété très productive et des plus recommandables.	1 40	3 50	5 40	—

5. LAITUES ROMAINES.

355 Laitue romaine, blonde maraîchère, graine blanche A étuver. Belle pomme ronde, très haute, allongée, arrondie au sommet, pouvant atteindre 3 kg. deux mois après repiquage. Se recommande surtout pour l'été. C'est la variété la plus cultivée.	1 50	4 30	7 50	—
356 — romaine, Ballon ou de Bougival, graine noire Variété vigoureuse et remarquablement rustique. Pomme plus large, très volumineuse, de bon rapport. Convient excessivement bien pour l'automne.	1 50	4 30	7 50	—



N° 334. — Laitue du Trocadéro.

N° 337. — Laitue grosse blonde paresseuse.

CULTURE DU MELON CHEZ L'AMATEUR.

C'est bien à tort qu'on croit la culture du melon impossible à réussir par le petit amateur. Suivez les conseils ci-dessous et, dans votre jardin, vous récolterez de délicieux melons.

Semez en pots, en terre riche, début mars. Repiquez vers le 20 mai, sur une couche de fumier épaisse de 0 m. 40 et recouverte de 0 m. 20 de terre. Recouvrez d'une vitre appuyée sur 4 briques.

Le melon émet des tiges qui se bifurquent. Les trois premières bifurcations donnent les fleurs mâles; la quatrième, les fleurs femelles. On doit tailler pour hâter les bifurcations et obtenir rapidement des fleurs femelles, aptes à donner le fruit. Voici comment vous procéderez.

1. Taillez sur les 2 premiers yeux au-dessus du pied. — 2. Pincez, à 3 ou 4 feuilles, les deux branches issues de cette tige. — 3. Pincez, à 4 ou 5 feuilles, les branches de la troisième génération. — 4. Pincez à 4 ou 5 feuilles les branches de la quatrième génération. C'est sur celles-ci qu'apparaissent les fleurs femelles. Conservez de deux à cinq melons par plante et pincez enfin à 4 feuilles au-dessus du melon. Laissez le reste du feuillage se développer librement.

Les tailles doivent se faire avec un canif bien tranchant. Saupoudrez les plaies de chaux éteinte pour les cicatriser. Arrosez tous les huit jours avec notre engrais concentré (voir page 41), mais évitez de mouiller le feuillage et surtout le pied de la plante, qu'attaquerait rapidement le chancre. Entre temps, arrosez à l'eau claire. Récolte en août-septembre.

LE NAVET.

Le navet est un bon légume d'hiver, très facile à cultiver et pouvant se semer entre d'autres plantes.

Faites un premier semis en place en mars, pour récolter à partir de juin.

Semez ensuite en mai, à l'ombre. Vous récolterez en août.

Faites le plus gros semis, au 15 juillet, entre des laitues et des choux repiqués. Ce semis produira en octobre et assurera la provision d'hiver. En novembre, par temps sec, arrachez les racines et débarrassez-les de leur terre, sans les laver. Coupez les feuilles à la base du collet. Rentrez ensuite en cave où les navets se conserveront jusqu'au printemps.

Pour être bon et ne pas monter à graines, le navet doit pousser très vite et être récolté avant son complet développement. L'altise (picot) s'attaque aux navets et dévore les jeunes semis. Pour prévenir ses ravages, aspergez de temps en temps à la nicotine dosée (voir page 41) et saupoudrez de chaux et de suie.



N° 366. — Mâche verte à cœur plein.



N° 382. — Melon Canteloup noir des Carmes.

MACHE. (Doucette ou salade de blé).

Semez des mâches à la volée dans votre carré d'oignons, au début de juillet, pour récolter, à partir de septembre-octobre une salade de goût très fin. En faisant un second semis fin septembre, vous assurerez une production continue jusqu'en mars-avril. Ce légume est une précieuse ressource en hiver.

	Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
362 Mâche verte, ronde, améliorée Courtes et larges feuilles arrondies, dressées. Excellente.	1 00	2 00	3 50	8 00
365 — de Hollande, à grosse graine Larges touffes de grosses feuilles allongées, molles et tendres.	1 60	2 80	4 60	12 00
366 — verte à cœur plein ou verte de Louviers Feuilles courtes, arrondies, se ramassant au centre en une sorte de petite pomme bien pleine et très tendre. Variété extra. très productive, résistant au froid et supportant bien le transport.	1 40	2 50	4 00	10 00
368 — à cœur jaune ou dorée (panachée) Spécialement cultivée chez nous. Très curieuse et jolie. Au printemps, elle se ramasse en rosette et se couvre de larges panachures jaune d'or. Salade très appétissante.	2 80	5 00	8 50	21 00
369 — d'Italie à feuille de laitue Plante vigoureuse à grosses feuilles très larges, ondulées, jaune doré. Assez résistante au froid. Production abondante.	2 00	3 70	6 50	16 00

MELON.

On divise les melons en deux classes: les cantaloup, à fruit presque lisse et côtelé, et les brodés, à fruit fortement ridé et peu côtelé. De multiples essais nous ont permis d'éliminer toutes les variétés qui ne donnaient pas la première qualité de chair et notamment les variétés brodées, à fruits monstrueux.

380 Melon cantaloup Prescott hâtif à châssis Fruit moyen, vert pâle marbré de vert foncé. Chair jaune orangé, très bonne. C'est, avec le suivant, le meilleur melon à forcer sous châssis.	2 80	—	—	—
382 — cantaloup noir des Carmes Fruit moyen, à écorce lisse, vert foncé, presque noir. Chair ferme, savoureuse, sucrée, parfumée, exquise. Variété rustique, convenant aussi bien pour la culture forcée que pour la culture à froid. Le plus estimé.	3 50	16 00	—	—
383 — cantaloup de Bellegarde ou de Montauban Fruit un peu allongé, vert pâle. Chair rouge orange vif, épaisse, sucrée, parfumée, excellente. Réussit en pleine terre.	2 50	—	—	—
385 — cantaloup Prescott, fond blanc, de Paris Fruit gros, côtelé, bosselé, aplati, pouvant peser 4 kg. Chair rouge orange, fondante, juteuse, sucrée. Un des plus cultivés.	2 20	9 00	—	—
386 — cantaloup d'Alger Fruit légèrement allongé, blanc argenté marbré de vert sombre. Chair parfumée, très sucrée, d'excellente qualité. Vigoureux et des plus rustiques.	2 00	8 00	—	—
388 — brodé, sucrin de Tours Fruit moyen, vert foncé, à broderies blanchâtres. Chair rouge pâle, épaisse, bonne. Facile à cultiver en pleine terre.	2 20	—	—	—

NAVETS.**1. NAVETS POTAGERS.**

389 Navet rond de Milan, rouge extra-hâtif Racine plate, blanche, à collet rouge violacé. Excellente variété, très hâtive, convenant bien pour la culture forcée.	2 00	3 70	6 50	16 00
390 — rond rouge plat hâtif, à feuille entière Très précoce. Racine bien plate, très nette, blanche à collet rouge. Chair tendre, savoureuse. Assez lent à monter à graines.	1 00	2 00	3 50	9 00
393 — demi-long des Vertus, race Marteau Formation rapide. Chair blanche, très tendre, sucrée, excellente. Très estimé, à récolter quand il atteint 8 ou 10 cm.	1 40	2 50	4 30	11 00
395 — rond jaune, Boule d'or Mi-hâtif. Belle racine très lisse presque sphérique, d'un beau jaune vif. Chair jaune, molle, de goût fin, légèrement amer.	1 40	2 50	4 30	11 00

2. NAVETS FOURRAGERS.

397 Navet rond blanc à collet rouge de Norfolk K. 46 00; 250 gr.: 14 00 Gros, sphérique. A semer tôt. Bonne variété fourragère.	1 00	1 60	2 80	6 50
398 — long gros à collet vert d'Alsace. Kil. 56 00; 250 gr.: 16 00 Racine pointue, très longue; chair blanche. Grand rendement.	1 00	1 80	3 00	7 50
399 — long blanc collet rouge du Palatinat K. 56 00; 250 g.: 16 00	1 00	1 80	3 00	7 50

OIGNONS.



N° 420. — Oignon à la Reine.

Pour avoir des oignons toute l'année. — 1. Semez des oignons blancs hâtifs vers le 15 août; couvrez-les de feuilles mortes en hiver: vous aurez de beaux oignons en mai-juin. 2. Plantez des oignons de Mulhouse en février-mars pour récolter en juin-juillet. 3. Faites un bon semis d'oignons de garde que vous récolterez en août et que vous conserverez au grenier pour l'hiver.

Pour obtenir de beaux oignons de garde. — Labourez bien le sol. Répandez ensuite, pour les enfouir très superficiellement, des engrais riches et bien décomposés, tels que fiente de poules ou de pigeons, terreau, etc. Ajoutez par mètre carré: 60 gr. de nitrate de soude, 80 gr. de superphosphate de chaux et 30 gr. de sulfate de potasse. Semez en mars-avril, en lignes distantes de 0 m. 25. Lorsque les jeunes plantes ont 0 m. 10 de haut, éclaircissez-les à 0 m. 10 de distance dans la ligne. En cas de sécheresse, terreutez la surface et arrosez largement à l'eau claire le long des lignes. Couchez les tiges au début d'août. Récoltez quand elles sont fanées. Rentrez la récolte et étendez-la au grenier où elle achèvera de mûrir. Evitez de remuer les bulbes pendant les gelées.

Pour obtenir des oignons monstrueux d'exposition. — Choisissez des variétés pouvant atteindre un grand développement: oignons de Madère plat et rond, géant de Zittau, et même les jaunes paille des Vertus et rouge pâle de Huy. Semez sur couche chaude en janvier. Repiquez sur couche en mars, plantez en avril avec motte, dans un sol préparé comme ci-dessus, en lignes distantes de 40 cm. et à 20 cm. dans la ligne. Couchez les tiges au début d'août. Vous obtiendrez ainsi des oignons de 20, 30 et même 40 cm. de circonférence.

1. OIGNONS HATIFS.

	Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
402 Oignon blanc hâtif de Paris	2 20	4 30	7 50	—
Bulbe moyen, blanc argenté, aplati. Résistant parfaitement au froid et d'excellente conservation. Le meilleur oignon hâtif. A semer en août.				
403 — blanc gros	1 40	2 50	4 30	—
Gros bulbe à chair légèrement molle et à saveur douce. De conservation un peu plus difficile mais de grand rapport.				

2. OIGNONS DE GARDE.

405 Oignon rouge pâle de Huy Kil.: 86 00; 250 gr.: 25 00	1 40	2 80	4 60	12 00
Sélectionné depuis de longues années dans nos cultures, cet oignon s'est admirablement adapté à notre climat et il y réussit mieux que tout autre. Enorme bulbe, rouge vineux pâle, à croissance rapide et de toute première qualité. Se conserve admirablement.				
408 — rouge foncé, de bonne garde. Kil.: 106 00; 250 gr.: 30 00	1 60	3 50	5 40	14 00
Bulbe moyen très aplati, d'un rouge foncé violacé, à chair rouge vif. C'est également une excellente variété bien productive, très rustique, facile à cultiver et se conservant extraordinairement bien.				
410 — jaune paille des Vertus Kil.: 80 00; 250 gr.: 23 00	1 20	2 50	4 30	11 00
Enorme bulbe, jaune cuivre, très plat. A développement un peu lent, il se conserve admirablement, peut-être même mieux que les oignons rouges qui le dépassent en saveur. Excellente variété, très employée pour la culture en grand, notamment aux environs de Paris.				
411 — jaune géant de Zittau	1 60	3 50	5 40	—
Très bonne variété. Gros oignon, très ferme, très dur et d'une belle couleur jaune. Bien productif et d'excellente garde.				

3. OIGNONS A CONFIRE.

420 Oignon blanc très hâtif à la Reine	2 20	4 30	7 50	19 00
Extrêmement précoce. Forme en deux mois de jolis petits bulbes blancs argenté, extra pour confire. A préférer à la variété de Nocéra qui a tendance à grossir et à dégénérer.				

4. OIGNONS DE MADÈRE.

424 Oignon de Madère, rond, très gros	1 90	4 00	7 00	—
Enorme bulbe, à saveur douce, atteignant 20 cm. de diamètre. Surtout cultivé pour l'étalage et les expositions.				

5. OIGNONS DE MULHOUSE.

427 Oignon de Mulhouse, bulbes . K.: 19 00; 500 g.: 10 00; 250 g.: 5 40	—	—	—	2 80
Bulbe moyen, arrondi, jaune cuivré. On repique les oignons de Mulhouse en février-mars. Ils se développent rapidement.				

OSEILLE.



L'oseille relève délicieusement le goût des potages et sert à accommoder quantité de mets. Elle entre dans la composition des purées de conserve qui viennent très bien à point en hiver.

Semez-la en mars pour récolter tout l'été, l'automne et même l'hiver. Bien qu'elle soit vivace, il est bon de renouveler les semis chaque année pour obtenir une abondante production.

Cueillez toujours l'oseille, comme aussi les épinards, feuille par feuille, en laissant se développer les petites feuilles du centre qui continueront la production.

Ci-contre: n° 430. Oseille de Belleville.

430 Oseille à large feuille de Belleville.

Belles feuilles larges, cloquées, vert franc. Très productive. De loin la plus répandue, surtout pour la culture en grand.

432 — patience ou épinard perpétuel.

Très résistante aux gelées, cette oseille est surtout précieuse à la fin de l'hiver. Ses feuilles sont de goût intermédiaire entre l'oseille et l'épinard, qu'elles remplacent quand celui-ci fait défaut.

PANAI.

Semez les panais seulement à la mi-juin pour récolter à partir d'octobre. De cette façon, ils ne se développent pas trop et restent tendres et délicats. Il suffit d'arracher les racines qui atteignent 5 à 6 cm. de large. Elles constituent un bon légume que l'on consomme à la façon des navets. Les panais sont très précieux pour les régions froides, car ils passent l'hiver en terre sans abri.

434 Panais rond hâtif.

Racine blanche, en forme de toupie. La seule variété qui convienne pour la culture potagère.

435 — long.

Très longue racine effilée. Plutôt fourrager et surtout employé pour la nourriture des chevaux. Il vient bien à point en hiver pour les lapins.


436 Pastèque (Melon d'eau).

Espèce de melon très aqueux, cultivé dans les pays chauds.

Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
1 40	2 50	4 30	—
1 60	3 50	5 40	—
1 00	1 50	2 20	5 40
1 00	1 50	2 20	5 40
3 00	5 40	9 50	—



N° 405. — Oignon rouge pâle de Huy.



N° 476. — Poireau de Huy.

CULTURE DU PISSENLIT.

Le pissenlit, surtout la variété à cœur plein, donne, de janvier à mars, une exquisite salade. On peut en obtenir très facilement.

Semez-en donc, de mars à mai, soit en pépinière pour repiquer les plantes à 7 cm. de distance en rigoles espacées de 25 cm., soit directement en place. Il vous suffit alors d'éclaircir de façon à obtenir le même espacement.

A partir de novembre, commencez à faire blanchir quelques pieds. Pour cela, supprimez toutes les grandes feuilles du pourtour, puis recouvrez les plantes d'un pot à fleur renversé ou de 20 cm. de terre meuble ou de sable. Quand elles sont devenues blanches, vous pouvez récolter. Si vous employez des pots à fleurs, il vous sera bien facile de faire blanchir progressivement tout votre parc en replaçant chaque fois sur de nouvelles plantes les pots que vous venez d'enlever.

LES SEMIS DE POIREAUX.

Pour avoir toujours des poireaux, semez, en janvier, des poireaux hâtifs en pépinière sur couche chaude, ou, fin février, en pleine terre, à bonne exposition. Quand les plantes ont acquis la grosseur d'un crayon, repiquez-les, après avoir raccourci les racines et les feuilles, en rigoles profondes de 10 centimètres, dans des trous de 10 centimètres environ. Repiquez au plantoir à une distance de 8 à 12 centimètres suivant la grosseur des variétés et distancez les lignes de 30 centimètres. Vous récolterez déjà en juin-juillet.

Faites ensuite un semis de poireaux tardifs en pleine terre, en mars, pour repiquer en mai et récolter à partir de septembre.


Enfin, pour obtenir une production qui se prolongera jusqu'au mois de mai suivant, semez encore des poireaux de Huy ou de Liège fin avril-mai. Vous les repiquerez en août et vous vous assurerez ainsi, pendant tout l'hiver et le printemps, une récolte continue de gros poireaux dont vous ferez d'excellents potages et des plats très agréables.

CULTIVEZ DES POIRÉES.

Légume précieux et beaucoup trop peu connu, la poirée, ou bette, est une espèce de betterave dans laquelle les feuilles se sont développées au détriment des racines. Elle produit de grandes feuilles ondulées que l'on consomme jeunes, en été, à la façon des épinards. La poirée à cardé a, en outre, la nervure médiane et le pétiole des feuilles très développés, épais et charnus: c'est la cardé que l'on prépare séparément, comme les côtes de céleris. Le goût en est particulier et très agréable.

Semez donc des poirées en mars-avril, en lignes distantes de 40 centimètres, et éclaircissez-les à 40 centimètres dans la ligne. Vous commencerez à récolter deux mois après le semis. Cueillez successivement les feuilles à mesure qu'elles atteignent 10 centimètres de long.

En faisant un second semis en juillet, vous pourrez arriver, moyennant un abri en temps de gelées, à en récolter tout l'hiver et au printemps suivant.



N° 462. — Pissenlit amélioré.

PERSIL.

Semez le persil en mars-avril. Pour en avoir tout l'hiver, semez-en au début de juillet, en pots de 12/15 cm. Enterrez ces pots au jardin, puis rentrez-les en octobre dans une pièce non chauffée où ils produiront pendant plusieurs mois.

	Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
438 Persil commun Feuillage découpé, de goût très aromatique, mais ressemblant beaucoup à la petite ciguë.	1 00	1 40	1 90	4 60
439 — frisé ou double Feuillage très finement frisé, ne pouvant se confondre avec celui de la petite ciguë. Il est donc prudent d'employer ce persil de préférence au persil commun.	1 00	1 40	2 20	5 40
441 — frisé Nec plus ultra Touffes naines, étalées en larges rosettes très frisées. Le plus décoratif et le plus employé pour garniture de plats.	1 00	1 80	3 00	—
459 Pimprenelle petite pour salades Vivace, très rustique. Touffes de jolies feuilles à consommer jeunes dans les salades. Couper souvent les feuilles pour en avoir toujours de fraîches. Semez en place, en avril, ou en août. Récolte deux mois après le semis.	1 00	1 60	2 50	—
461 Pissenlit ordinaire A saveur amère agréable. Donne une précieuse salade en hiver.	1 40	3 00	5 00	—
462 — amélioré à cœur plein Superbe touffe feuillue, blanchissant presque naturellement.	2 80	12 00	21 00	—

POIREAUX.**1. POIREAUX HATIFS.**

465 Poireau gros court d'été ou gros du Midi Le plus hâtif. Pied assez gros, plutôt demi-long, excellent. Assez sensible au froid. A consommer en automne.	1 00	1 80	3 00	—
467 — très gros, jaune, du Poitou Précoce, grossissant rapidement. Pied assez court mais large. Egalement sensible au froid. Pour récolte d'automne.	1 60	3 50	6 00	—

2. POIREAUX TARDIFS.

471 Poireau monstrueux de Carentan. Kil.: 76 00; 250 gr.: 21 00 Superbe amélioration du poireau très gros de Rouen. Demi-long, mais énorme. Peut atteindre 6 à 8 cm. de large. Rustique, résistant aux froids, vraiment recommandable.	1 20	2 50	4 00	10 00
472 — gros vert d'hiver de Brabant Encore un bon poireau. Pied plutôt court, trapu, à base renflée. Parfaitement rustique, il supporte aisément les froids.	1 40	2 80	4 60	—
473 — long vert d'hiver de Paris Pied mince, extraordinairement allongé. Peut atteindre 30 cm. Des plus rustiques, il résiste à tous les froids. Variété très cultivée par les maraîchers des environs de Paris.	1 40	2 80	4 60	—
476 — gros vert d'hiver de Huy . . . Kil.: 76 00; 250 gr.: 21 00 Magnifique variété locale. Sélectionné dans nos cultures depuis un demi-siècle, il est devenu le plus parfait des poireaux d'hiver. Planté tôt, il développe un pied très long, très gros, résistant à tous les froids. Planté plus tard, il hiverne aisément et continue à grossir jusqu'en mai sans monter à graines. Cette variété et la suivante peuvent être considérées comme les meilleures.	1 20	2 50	4 00	10 00
477 — gros vert d'hiver de Liège Egalement une superbe variété de notre région, sans cesse améliorée par des maraîchers de mérite. Elle atteint des dimensions extraordinaires tout en conservant une parfaite résistance aux froids les plus vifs. Pied long, épais, énorme et, comme le précédent, d'excellente qualité. Ces deux variétés sont très cultivées dans tout le sud de la Belgique.	1 90	4 00	7 00	—
478 Poirée (Bette) blonde commune Nombreuses feuilles larges, ondulées, d'un beau vert blond. On étuve les jeunes feuilles, en été, à la manière des épinards.	1 00	1 40	2 20	5 40
479 — à cardé blanche Larges pétioles énormes, longs, charnus, savoureux, de goût fin. C'est la plus productive et la meilleure des poirées à cardé.	1 00	1 60	2 80	6 50
480 — à cardé rouge du Chili Pétiole et cardé très larges, d'un beau ton cramoisi. Feuilles vert foncé. De goût peu délicat, mais très ornementale.	1 20	2 00	3 50	—

POIS.



N° 496. — Pois à rames Sénateur.

Nous avons rangé les pois par ordre de précocité dans les groupes, cette classification nous paraissant la plus pratique.

Les hauteurs indiquées s'entendent pour pieds isolés. En année humide ou lorsqu'on a semé trop serré, on voit parfois des pois nains filer et s'allonger. Nous tenons à en prévenir nos clients pour qu'ils ne croient pas à une erreur de fourniture. Même, les pois Merveille d'Amérique doivent souvent être soutenus par un treillis de 0 m. 50. Les treillis, qui resservent indéfiniment, doivent être préférés aux rames.

Le pois aime un sol riche, profond, assez léger et fumé l'automne précédent. L'air et la lumière surtout lui sont indispensables.

Si vous voulez récolter des pois très tôt, vous pouvez risquer, fin février, un semis de pois nains n° 481 ou n° 482, dans une bande de terrain de 80 cm. à 1 m., le long d'un mur exposé au midi ou même à l'ouest ou à l'est, mais pas au nord. Cette bande de terrain s'appelle une « coteira ». Elle concentre la chaleur du soleil renvoyée par le mur et permet des récoltes très hâtives. Ainsi vous commencerez à cueillir des petits pois en juin. Vous pourriez même arriver à en récolter au début de mai, en recouvrant vos semis de châssis que vous enlevez quand la température s'est établie vers 15°. Un autre moyen d'avancer la récolte est de pincer les tiges au-dessus de quatre à cinq groupes de fleurs.

Pour avoir des pois tout l'été, il faut semer: 1. en mars-avril, une variété de primeur; 2. en avril, une variété hâtive et une de moyenne saison; 3. en mai, une de moyenne saison et une tardive; 4. en juin, une tardive. Vous pouvez encore semer, dans la première quinzaine de juillet, une variété de primeur qui produira en septembre-octobre si le temps est favorable.

Les pois de moyenne saison souffrent des chaleurs: ils se dessèchent et sont atteints du blanc. Arrosez-les fréquemment ou, mieux, mettez-leur un paillis de fumier presque décomposé. Prévenez le blanc en saupoudrant le feuillage de soufre nicotiné (voir page 41).

Les pois à grain ridé n'ont aucune valeur comme grain sec. Mais ils sont plus sucrés et restent tendres pendant leur croissance, beaucoup plus que les variétés à grain rond. En outre, ils résistent mieux aux chaleurs et sont plus productifs.

Cueillez les pois dès qu'ils sont bons à consommer, sans les laisser mûrir; sinon il ne se formera plus de nouvelles gousses. Les pois mangetout, pour être tendres, doivent être cueillis alors qu'ils ne sont que peu développés.

1. POIS A ÉCOSSER NAINS.

	100gr.	250gr.	500gr.	Kilogr.
481 Pois très hâtif à châssis d'Annonay, grain rond blanc . 0 m. 25 De primeur. Cosses droites, épaisses, Productif. Très nain, il convient particulièrement pour la culture sous châssis. Réussit aussi en plein air.	2 00	3 70	7 00	13 00
482 — l'Unique, grain rond, blanc et vert 0 m. 25 Belles cosses droites, bien vertes, Bonne variété productive et rustique. Convient aussi bien pour cultures sous châssis que pour pleine terre.	1 90	3 50	6 50	12 00
483 — Merveille d'Amérique, grain ridé vert 0 m. 25 Assez précoce. Feuillage vert foncé. Cosses vertes, droites, très nombreuses, assez petites mais renflées et très pleines. Excellente variété, remarquablement productive malgré sa petite taille, et de très bonne qualité.	1 90	3 50	6 50	12 00
484 — serpette nain vert, grain ridé vert 0 m. 35 Longues cosses recourbées, Excellente variété rustique et productive.	1 90	3 50	6 50	12 00

2. POIS A ÉCOSSER A RAMES.**De primeur.**

		100 gr.	250 gr.	500 gr.	Kilogr.
485	Pois Prince Albert, grain rond blanc. 0 m. 70 Cosses moyennes, droites, très épaisses. Excellente variété, productive. Le plus précoce des pois à rames.	1 80	3 00	5 40	10 00
486	— Express ou pois Alaska, grain rond vert 0 m. 70 Cosses moyennes, droites, très nombreuses. Plus tardif d'un jour ou deux que le pois Prince Albert mais plus productif.	1 80	3 00	5 00	9 00
487	— Express à longue cosse ou le Généreux, grain rond vert 0 m. 90 Belles cosses larges, longues de 8/10 cm., légèrement recourbées. Variété précoce, vigoureuse, productive et très estimée.	1 80	3 00	5 40	10 00
488	— Caractacus, grain rond blanc 0 m. 90 Issu du pois Prince Albert dont il n'a pas tout à fait la précocité. C'est également une bonne variété bien productive.	1 80	3 00	5 00	9 00

Hâtifs.

490	Pois Automobile, grain rond, vert et blanc 0 m. 90 Excellente variété hâtive et de bonne production.	2 00	3 70	7 00	13 00
492	— Michaux de Hollande, grain rond blanc 1 m. Assez hâtif. Cosses bien pleines. Convient pour grandes cultures. On peut le semer avant l'hiver pour récolter en mai.	1 80	3 00	5 00	9 00
494	— Gradus, grain ridé, blanc verdâtre 0 m. 80 Extra-hâtif. La plus précoce des variétés à grain ridé. Superbes cosses, très longues et très larges, bien pleines, remarquables.	1 90	3 50	6 50	12 00
495	— de Knight ridé nain vert hâtif, pois Napoléon. . . 0 m. 70 Nombreuses cosses moyennes à grains très gros. Très productif.	2 00	3 70	7 00	13 00

De moyenne saison.

496	Pois Sénateur, grain ridé vert 0 m. 70 Magnifiques cosses blondes, longues de 10 cm., remplies de gros grains tendres et sucrés, délicieux. Vigoureux, très productif, des plus recommandables.	1 90	3 50	6 00	11 00
497	— Gladiateur ou plein le panier amélioré, grain rond vert 0 m. 70 Très belles cosses longues et larges à grain excellent. Très rustique et de grand rapport. Un des plus estimés.	1 80	3 00	5 40	10 00
498	— Téléphone, grain ridé blanc. 1 m. 10 Un peu plus hâtif que le suivant. Superbe pois d'exposition à cosses géantes, magnifiques. Gros grain très sucré. Remarquablement productif.	2 00	3 70	7 00	13 00
499	— Serpette d'Auvergne à longue cosse, rond blanc . 1 m. 30 Variété extra. Belles cosses fines, très longues, recourbées, remplies de nombreux petits grains. Produit pendant un mois. Rustique, peu exigeant.	1 80	3 00	5 00	9 00

Tardifs.

500	Pois Stratagème amélioré, grain ridé vert. 0 m. 70 Très semblable aux variétés « Omega » et « Orgueil du Marché ». Touffu, productif. Grain de tout premier choix. Variété de luxe.	1 90	3 50	6 50	12 00
501	— de Knight ridé, grain ridé blanc 1 m. 80 Grain blanc, devenant légèrement verdâtre. Résiste bien à la chaleur. Recommandable pour les semis d'été.	2 00	3 70	7 00	13 00
505	— Duc d'Albany, grain ridé vert 1 m. 40 Magnifique variété d'exposition rivalisant avec le pois Téléphone pour la beauté des cosses. Grain d'excellente qualité. Production très abondante.	2 20	4 30	8 00	15 00

3. POIS MANGETOUT A RAMES.

510	Pois de quarante jours 1 m. 20 Variété très précoce. Cosses moyennes, franchement sans parchemin. Excellent mangetout. Produit pendant deux mois.	2 00	3 70	7 00	13 00
513	— hâtif de Henri ou blanc hâtif 1 m. Excellente variété hâtive et rustique. Cosses moyennes, droites, charnues et tendres, très abondantes. Réussit bien partout.	2 00	3 70	7 00	13 00
519	— Corne de béliet, ... 1 m. 40 Superbes cosses vert blond, longues de 12 à 14 cm., très recourbées, charnues et bien tendres. Production intense et soutenue. Le plus cultivé.	2 20	4 00	7 50	14 00

POURPIER.

- 535 Pourpier doré à large feuille
Feuilles larges, jaune d'or. Le seul vraiment recommandable.
Semez en place vers le 15 mai puis vers le 15 juin.

Paquet	15gr.	30gr.	100gr.
--------	-------	-------	--------

1 50	4 60	8 00	—
------	------	------	---

RADIS.

Semez des radis hâtifs en mars, entre les carottes et les oignons. Assurez une production continue par un 2^e semis début avril et un 3^e fin avril.
Faites 3 semis de radis d'été: début mai, juin et juillet. Récolte tout l'été.
Enfin, semez des radis d'hiver longs, fin mai, et des ronds vers le 15 juin.
Récoltez en octobre et conservez pour l'hiver à la façon des carottes.

1. RADIS A FORCER.

- | | | | | |
|---|------|------|------|------|
| 544 Radis rond, rose, très fin, à châssis | 1 00 | 1 80 | 3 00 | 7 50 |
| 545 — rond, rouge carmin, très fin, à châssis | 1 00 | 1 80 | 3 00 | 7 50 |

2. RADIS HATIFS.

- | | | | | |
|--|------|------|------|------|
| 548 Radis rond, rose hâtif 1/4 kil. : 14 00 | 1 00 | 1 60 | 2 80 | 6 50 |
| 549 — rond, rose à bout blanc 1/4 kil. : 12 00 | 1 00 | 1 60 | 2 50 | 6 00 |
| 550 — rond, écarlate hâtif 1/4 kil. : 12 00 | 1 00 | 1 60 | 2 50 | 6 00 |
| 552 — rond, blanc hâtif | 1 00 | 1 60 | 2 80 | 6 50 |
| 553 — demi-long, rose hâtif | 1 00 | 1 60 | 2 80 | 6 50 |

3. RADIS D'ÉTÉ.

- | | | | | |
|---|------|------|------|------|
| 556 Radis rond, jaune ou roux d'été | 1 00 | 1 80 | 3 00 | 7 50 |
| 557 — long, chandelle de glace | 1 00 | 1 60 | 2 80 | 6 50 |
| 558 — demi-long, rose de Chine | 1 00 | 1 60 | 2 80 | 6 50 |

4. RADIS D'HIVER (Ramonasses).

- | | | | | |
|---|------|------|------|------|
| 559 Radis rond, noir gros d'hiver | 1 00 | 1 60 | 2 80 | 6 50 |
| 560 — long, noir gros d'hiver | 1 00 | 1 60 | 2 80 | 6 50 |
| 561 — long, gris d'hiver, de Laon | 1 00 | 1 80 | 3 00 | 7 50 |

RHUBARBE.

- | | | | | |
|--|------|---|---|---|
| 568 Rhubarbe Mitchell's Royal Albert | 4 00 | — | — | — |
| 570 — Queen Victoria | 2 00 | — | — | — |
- Très hâtives. Pétioles énormes, tachés de rouge, excellents.
Pétioles gros et longs, de bonne qualité. Fleurit très peu.



SALSIFIS ET SCORSONÈRE.

	Paquet	15 gr.	30 gr.	100 gr.
576 Salsifis blanc	1 40	2 50	4 00	—
Racines nettes. C'est la scorsonère des terres compactes.				
584 Scorsonère noire (Salsifis noir)	1 90	3 50	5 40	14 00
Grosse, exquise. Précieux légume de provision d'hiver. Scorsonère et salsifis se sèment fin avril et se récoltent dès octobre.				
586 — géante de Russie.	2 20	4 30	7 50	—
Longue, lisse, extra. Amélioration de la précédente.				

TÉTRAGONE.

589 Tétragone cornue, épinard de la Nouvelle-Zélande	1 40	2 20	3 70	—
Remplace l'épinard en été. Semez en pots, en mars.				

TOMATE.


Se sème au début de mars et se repique fin mai. Voir culture page 62.

595 Tomate rouge, grosse hâtive.	1 40	4 60	8 00	—
Très hâtive. Fruit moyen, côtelé. Très productive.				
599 — Chemin, rouge hâtive.	2 50	9 50	16 00	—
Hâtive, vigoureuse, excellente. Gros fruit lisse. Recommandable.				
601 — Reine des hâtives	2 00	8 00	14 00	—
Hâtive, productive, résistant à la maladie. Fruit lisse.				
603 — rouge très hâtive, de pleine terre	2 00	8 00	14 00	—
Bonne variété hâtive et vigoureuse. Beau fruit, à peine côtelé.				
604 — Perdrigeon	2 50	9 50	16 00	—
Enorme fruit rouge vif, peu côtelé, à chair ferme et délicate. La meilleure comme rendement et résistance à la maladie.				
606 — Merveille des marchés	2 50	9 50	16 00	—
Vigoureuse et résistante. Très productive. De grand commerce.				
608 — Mikado écarlate	2 20	9 00	15 00	—
A cultiver sous verre. Fruit énorme, bien rouge, excellent.				


TABAC.

En France, il faut l'autorisation de l'Administration pour cultiver du tabac.

	Paquet	10 gr.	30 gr.	100 gr.
609 Tabac Havane	1 50	4 00	—	—
610 — Maryland	2 00	6 00	—	—
611 — Obourg	1 50	4 00	—	—
612 — Petit Grammont	1 50	4 00	—	—
613 — Semois	2 00	6 00	—	—



N° 557. — Radis Chandelle de glace.



N° 604. — Tomate Perdrigeon.

GRAINES CONDIMENTAIRES ET OFFICINALES.



N° 633. — Thym ordinaire.

La plupart de ces plantes se récoltent à la floraison. On doit les sécher à l'ombre, mais le plus rapidement possible. Quand elles sont bien sèches, on les enroule dans du papier ou on les met en boîtes hermétiquement closes que l'on place dans un local sec. On peut ainsi les conserver pendant plusieurs années.

En infusion, l'absinthe est vermifuge, l'anis (graines) est digestif, la bourrache est diurétique et sudorifique, le fenouil est apéritif, l'hysope, la mélisse et le romarin stimulent l'estomac, la sauge est tonique.

Enfin, beaucoup de ces plantes sont également employées comme condiment et sont indispensables pour assaisonner quantité de plats fins dont elles relèvent délicieusement le goût.

	Paquet		Paquet
614 Absinthe	4 00	625 Mélisse ou citronnelle	3 00
616 Anis vert	1 40	626 Piment long rouge	2 00
617 Basilic grand vert	1 50	627 — doux d'Espagne	3 00
618 Bourrache officinale	1 40	628 Romarin	3 00
619 Carvi ou Cumin des prés	1 20	629 Rue	2 00
620 Fenouil ordinaire (aneth)	1 20	630 Sarriette commune ou annuelle	1 40
621 Hysope	3 50	631 — vivace	3 00
622 Lavande	3 00	632 Sauge officinale	2 00
623 Marjolaine annuelle	1 40	633 Thym ordinaire	3 50
624 — vivace	3 50	634 — d'hiver	3 50

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES.

Beaucoup de personnes ont un jardin potager et n'ont que peu de connaissances en culture maraîchère. Elles trouveront, dans ces assortiments, les espèces potagères les plus utiles et les plus employées.

Les assortiments étant empaquetés d'avance, sont indivisibles. Nous ne pourrions y faire aucun changement. Evidemment, nos clients pourront faire ajouter à l'envoi d'autres articles du catalogue.

636 Pour petit jardin: 16 espèces et variétés Fr. 32 00			
71 Carotte . 15 gr.	284 Fève . 250 gr.	337 Laitue . paquet	471 Poireau . paquet
99 Cerfeuil . 30 »	295 Haricot . 100 »	365 Mâche . »	496 Pois . 250 gr.
260 Cresson . 15 »	313 » . 100 »	405 Oignon . 15 gr.	535 Pourpier . paquet
269 Epinard . 30 »	321 Laitue . 15 »	430 Oseille . paquet	550 Radis . 15 gr.
637 Pour jardin moyen: 32 espèces et variétés Fr. 75 00			
68 Carotte . paquet	260 Cresson . 15 gr.	365 Mâche . 15 gr.	479 Poirée . 15 gr.
71 » . 15 gr.	269 Epinard . 100 »	390 Navet . 15 »	486 Pois . 250 »
95 Céleri . paquet	284 Fève . 250 »	405 Oignon . 15 »	496 » . 250 »
99 Cerfeuil . 30 gr.	295 Haricot . 100 »	420 » . 15 »	510 » . 250 »
122 Endive . paquet	313 » . 250 »	430 Oseille . paquet	535 Pourpier . paquet
125 Scarole . »	321 Laitue . 15 »	439 Persil . 15 gr.	550 Radis . 15 gr.
134 Chicorée . 15 gr.	338 » . 15 »	471 Poireau . 15 »	560 » . 15 »
235 Cornichon paquet	340 » . paquet	476 » . paquet	584 Scorsonère 15 »
638 Pour grand jardin: 44 espèces et variétés Fr. 128 00			
31 Betterave . 15 gr.	166 Chou . paquet	328 Laitue . paquet	471 Poireau . 30 gr.
68 Carotte . 15 »	175 » . »	334 » . 15 gr.	476 » . 15 »
71 » . 30 »	235 Cornichon 15 gr.	338 » . 15 »	479 Poirée . 15 »
91 Céleri . paquet	260 Cresson . 30 »	340 » . paquet	483 Pois . 250 »
95 » . »	269 Epinard . 100 »	365 Mâche . 30 gr.	486 » . 250 »
99 Cerfeuil . 100 gr.	284 Fève . 250 »	390 Navet . 15 »	500 » . 250 »
122 Endive . 15 »	295 Haricot . 100 »	405 Oignon . 30 »	510 » . 250 »
125 Scarole . 15 »	300 » . 250 »	410 » . 15 »	535 Pourpier . 15 »
134 Chicorée . 30 »	313 » . 250 »	420 » . 15 »	550 Radis . 30 »
146 Chou . paquet	318 » . 100 »	430 Oseille . paquet	560 » . 15 »
156 » . »	321 Laitue . 15 »	439 Persil . 15 gr.	584 Scorsonère 15 »

POMMES DE TERRE.

Nous avons dû renoncer à vendre des pommes de terre. Nos clients n'arrivaient pas à les conserver en bon état après les nombreuses manipulations d'expédition et le transport par chemin de fer.



LES FLEURS DU PETIT AMATEUR.

Les personnes qui aiment cultiver des fleurs en abondance trouveront à la page 62 des indications précieuses sur les espèces à choisir, la façon de les assembler et les soins à leur donner.

La notice ci-dessous s'adresse spécialement à ceux qui n'ont que peu d'espace à consacrer aux fleurs.

L'amateur qui ne désire cultiver que quelques fleurs est parfois très embarrassé pour faire son choix. Nous allons l'y aider.

Pour orner les plates-bandes de son petit jardin et pour avoir de quoi faire quelques bouquets, il plantera quelques plantes vivaces, qui vivent un grand nombre d'années et qui constitueront le fond de la décoration florale. Entre elles, il sèmera chaque année quelques plantes annuelles qui apporteront plus de couleur et de variété.

PLANTES VIVACES. — Voici un choix de très bonnes espèces, classées par ordre de mérite: Pied d'alouette vivace (n° 1176), Phlox vivace (n° 1168), Campanule persicifolia (n° 882), Lupin vivace (n° 1037), Achillea Ptarmica The Pearl (n° 796), Pavot d'Orient (n° 1113), Erigeron speciosus hybride (n° 943), Gypsophile paniculée (n° 991).

Les suivantes sont des plantes naines, à mettre en bordure: Œillet mignardise (n° 1089), au soleil; Primevère des Jardins (n° 1195), à mi-ombre; Violette odorante (n° 1315), à l'ombre.

Culture. — Semez les graines en avril, sur une plate-bande terreautée. Repiquez quand les plantes ont quelques feuilles, à 25 cm. de distance, et mettez à demeure au printemps de la deuxième année. Floraison la première ou la deuxième année. Les Pavots et les Lupins se sèment de préférence là où les plantes doivent croître.

Quand les touffes deviennent trop volumineuses, il faut les diviser, en mars. Prenez les portions extérieures de la touffe et replantez-les à un autre emplacement.


PLANTES ANNUELLES. — Le petit amateur bornera son choix aux six meilleures espèces qui sont, classées par ordre de mérite: Reine-Marguerite (n° 1210 à n° 1223), Giroflée quarantaine (n° 960 à 967), Muflier (n° 1062 à n° 1064), Œillet de Chine (n° 1081 à n° 1085), Phlox de Drummond (n° 1160, n° 1161, n° 1165), Immortelle (n° 1010, n° 1013). Cette dernière, coupée avant l'épanouissement des boutons, et séchée à l'ombre, se conservera tout l'hiver et servira à la confection des bouquets secs.

Culture. — Semez vers le 15 avril sur une plate-bande abritée et terreautée. Quand les plantes ont quelques feuilles, repiquez-les à 15 cm. de distance, et, un peu plus tard, plantez-les à demeure. On peut aussi les semer directement en place et éclaircir après la levée, mais les plantes et les fleurs sont moins belles.

Pour jouir plus tôt de la floraison, on sème sous châssis, vers le 20 mars. A l'abri d'un mur ou d'une haie, placez un coffre constitué par quatre planches clouées ensemble, que vous déposez sur le sol et que vous remplissez de terreau ou de terre légère. Semez-y les graines et recouvrez d'une feuille de verre. Après la levée, repiquez au jardin, en pépinière ou à demeure.

FLEURS PRINTANIÈRES. — Pour avoir des fleurs dès le mois d'avril, il faut, en juillet, semer au jardin les espèces suivantes: Pensées (n° 1114 à n° 1133), Pâquerettes (n° 1105 à n° 1107), et Myosotis (n° 1070 à n° 1074). Après la levée des graines, repiquez à 10 cm. et mettez en place en octobre, après la disparition des fleurs annuelles d'été.

PLANTES GRIMPANTES. — Utiles pour orner les murs, les berceaux, etc. Les plus jolies et les plus faciles à cultiver sont: Capucine grande (n° 894), Capucine de Lobbe (n° 896), Haricot d'Espagne (n° 995) et Ipomée (n° 1015). Semez en place vers le 15 avril. En été, ligaturez les tiges qui se développent. Pour jouir plus tôt des fleurs, semez, en pots vers le 20 mars, à raison de 3 ou 4 graines par pot; vous placerez les pots sous châssis ou sur l'appui intérieur d'une fenêtre.



CALENDRIER DE SEMIS DE GRAINES DE FLEURS



Les lettres à la fin de chaque ligne de la nomenclature des graines de fleurs (pages 30 à 39) renvoient aux paragraphes du calendrier ci-contre. Dans la nomenclature, nous avons aussi indiqué, à côté de chaque plante, si elle est annuelle, bisannuelle, vivace ou bulbeuse. Grâce à ces indications, vous verrez immédiatement dans quelle subdivision du paragraphe vous devez retrouver la plante qui vous intéresse.

LES SUBDIVISIONS DE NOTRE CALENDRIER.

Nous avons groupé les plantes de fleurs en annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses.

Les annuelles se sèment de janvier en mai, à chaud, en pépinière ou en place. Elles fleurissent l'année même du semis et sont anéanties par les gelées.

Les bisannuelles se sèment d'avril en septembre, sont repiquées, puis plantées en octobre ou en mars-avril et donnent leurs fleurs au printemps ou en été.

Les vivaces se sèment, en général, au printemps; elles sont cultivées tout l'été en pépinière puis mises en place en automne ou au printemps. Elles vivent de nombreuses années. Certaines donnent leurs fleurs l'année du semis, alors que d'autres exigent deux ans de culture pour atteindre tout leur développement.

Les bulbeuses se sèment à chaud, en janvier-février, sont repiquées en terrines, puis mises en place en pots ou au jardin suivant les espèces. Après la floraison, on laisse dessécher la terre, on arrache les bulbes qu'on conserve à sec en hiver et on les remet en végétation en mars.

SEMIS A CHAUD.

Semer à chaud s'entend de deux manières: 1. Semer en serre chaude ou en appartement régulièrement chauffé; 2. Semer sur couche chaude.

Semis en serre chaude ou en appartement. — Semez en caissettes, pots, terrines, bien drainés et remplis de terreau jusqu'à 1 cm. du bord. Vous aurez préparé ce terreau en accumulant dans un coin du jardin des feuilles et déchets de toutes sortes, en les mélangeant de fumier, de terre et de chaux ou de cendrées, et en les laissant bien se décomposer. Semez clair, recouvrez les graines de quelques millimètres de terre, sauf les graines très fines que vous faites simplement adhérer par une légère pression. Arrosez légèrement, recouvrez les caissettes d'une feuille de verre et placez-les, à défaut de serre, dans une véranda bien éclairée et chauffée ou sur l'appui intérieur d'une fenêtre de cuisine. Veillez à ce que, dans ces pièces, il fasse toujours bon, même la nuit. Chaque matin, essuyez la feuille de verre pour enlever l'humidité. Tenez la terre fraîche. Enlevez la feuille de verre dès que les premières pousses apparaissent. Repiquez en caissettes que vous conservez en appartement ou que vous placez au jardin contre un mur à situation bien abritée, en ayant soin de les rentrer ou de les couvrir de sacs pour la nuit. Quand les plantes auront atteint un certain développement, vous les repiquerez en pots ou en place au jardin, suivant les espèces.

Semis sur couche chaude. — Pour obtenir une couche chaude (15 à 18°), étalez sur le sol du fumier frais de cheval, intimement mélangé d'un tiers de feuilles sèches, sur une épaisseur de 70 cm. en janvier, 60 cm. en février, 50 cm. en mars. Sur cette couche, posez un cadre en planches d'environ 30 cm. de haut, en laissant déborder la couche tout autour de 30 cm. Sur ce cadre, placez une vitre ou plusieurs côte à côte. Attendez une dizaine de jours que la couche ait donné son « coup de feu », puis remplissez le cadre de terre légère bien affermée jusqu'à 8 cm. du bord. Laissez cette terre se réchauffer quelques jours, puis semez clair, à la volée, en recouvrant à peine les graines. Damez légèrement, arrosez, puis remplacez la vitre que vous recouvrez de sacs. De janvier à mars, entourez le châssis d'une épaisseur de 30 cm. de fumier, que vous renouvelez de temps en temps pour entretenir la chaleur intérieure. Dès que les premières pousses apparaissent, enlevez les sacs le jour, mais remettez-les la nuit tant qu'il fait froid. Aérez progressivement. Quand les plantes ont quelques feuilles, repiquez-les sur couche tiède ou même sous un châssis froid que vous maintenez fermé et ombragé quelques jours pour assurer la reprise.

Une couche tiède est une couche chaude ayant moins d'épaisseur et enfermant plus de feuilles. La température y est moins élevée (12° à 15°), mais plus durable.

SEMIS SOUS ABRI.

C'est semer sous châssis froid ou sous un abri suffisant. Choisissez un endroit abrité des vents du Nord. Mélangez la terre de feuilles et détritiques de toutes sortes. Arrosez abondamment, si possible avec du purin. Sur la partie ainsi améliorée, posez un châssis vitré comme celui que nécessite la couche chaude. Remplissez-le de terreau, puis semez et cultivez comme sur couche chaude. Repiquez sous châssis froid ou sur plate-bande abritée, puis mettez en place.

Si vous n'avez pas de châssis, semez au début d'avril, sur une plate-bande abritée, de petites surfaces que vous recouvrez d'un grand pot renversé ou, mieux, d'une cloche de verre. Quand les pousses apparaissent, enlevez les cloches le jour, mais remettez-les la nuit tant que les froids sont à craindre.

SEMIS EN PÉPINIÈRE.

C'est semer en pleine terre, dans un endroit où les plantes vivent temporairement en attendant leur mise en place. C'est généralement un coin du jardin dont le sol, mélangé de terreau, favorise le développement de jeunes plantes. En été, semez à mi-ombre et recouvrez d'un bon paillis.

SEMIS EN PLACE.

C'est semer là où les plantes passeront toute leur vie. Après la levée, éclaircissez plusieurs fois.

A. Plantes à floraison printanière.

PLANTES BISANNUELLES: SEMER EN:
 mai-juin, en pépinière: giroflées d'hiver, giroflées muret et allionii.
 juillet-août, en pépinière: myosotis des Alpes et Victoria, pâquerettes, pensées, silène.

PLANTES VIVACES: SEMER EN:
 avril, sous abri: alyssum saxatile, aubrieta.
 juillet, en pépinière: primevères des jardins et du Japon, violette.
 juillet-août, en pépinière: myosotis palustris, pensée de Munby.

B. Plantes fleurissant au début de l'été.

PLANTES BISANNUELLES: SEMER EN:
 avril-mai, en pépinière: campanule medium, coquelourde des jardins, digitale, lunaire, œillets de poète.
 juin-juillet, en pépinière: rose trémière.

PLANTES VIVACES: SEMER EN:
 avril-mai, en pépinière: ancolies, heuchera, œillet mignardise non remontant.
 juillet-août, en pépinière: pavot d'Islande.

C. Plantes à floraison estivale.**1. Pour corbeilles, plates-bandes, fl. coupées.**

PLANTES ANNUELLES: SEMER EN:
 janvier-février, à chaud: bégonias semperflorens, œillets des fleuristes.
 mars, à chaud: agératums, amarantes crête de coq, célosie, chrysanthèmes des jardins et à carène, cosmos, giroflées quarantaines d'été, hélioïtre, lobellias erinus, mufliers, pentstémon, périlla, pétunias, phlox de Drummond, salvia, statice, tabacs, verveines.
 fin mars, sous abri: balsamines, coréopsis, ficoïde, gaillarde picta, immortelles, kochia, mimulus, némésia, œillets de Chine, reines-marguerites, soleil, tagètes, zinnias.
 avril, en pépinière: chrysanthèmes des jardins et à carène, clarkia, gaura, godetias, scabieuse.
 avril-mai, en place: adonide, asperule, belle-de-jour, belle-de-nuit, campanule speculum, capucines naines, centaures, chrysanthèmes des jardins et à carène, clarkia, coquelourde rose du ciel, coréopsis, dimorphothea, dracocéphale, eschscholtzia, godetias, immortelles, julienne de Mahon, leptosiphon, lin, lupin annuel, malope, némophile, nigelle, pavots tulipe et des jardins, pieds d'alouette des jardins et des blés, pois de senteur sauf celui à forcer, pourpiers, rhodanthe, salpiglossis, schizanthus, souci, thlaspi. Graines de fleurs annuelles en mélange. Gazon japonais.

PLANTES BISANNUELLES: SEMER EN:
 mai-juin, en pépinière: buglosse, œillets des fleuristes et mignardise remontant.
 juin-juillet, en pépinière: rose trémière.

PLANTES VIVACES: SEMER EN:
 mars-avril, à chaud ou sous abri: érigeron, gnaphalium, phlox vivace, rosier multiflore, tritoma, valériane.
 mars-avril, à chaud ou sous abri (fleurissant la première année): aster, chrysanthèmes de l'Inde et des Montagnes du Japon, lychnis, pied d'alouette vivace.
 avril-mai, en pépinière: achillea, aconit, campanules persicifolia et pyramidalis, chrysanthèmes de l'Inde, coquelourde des jardins, gaillarde vivace, julienne des jardins, lobelia cardinalis, lupin vivace, lychnis, pavot d'Orient, pois vivace, potentille, rudbeckias, thalictrum, véronique.

septembre, sous abri: hellébore, valériane.
PLANTES BULBEUSES: SEMER EN:
 janvier-février, à chaud: bégonias tubéreux.
 mars, à chaud: canna, dahlias.

2. Plantes pour bordures.

PLANTES ANNUELLES: SEMER EN:
 mars, à chaud: cinéraire maritime, muflier nain.
 fin mars, à chaud ou sous abri: agératum, phlox de Drummond nain, reines-marguerites naines, tagètes Légion d'Honneur, zinnia nain.
 avril, en place: alyssum maritimum, asperule, belle-de-nuit naine, capucines naines, leptosiphon, némophile, nigelle, phacelia, pois de senteur nain, pourpiers, souci.
 avril-mai, en pépinière: pyrethrus.

PLANTES VIVACES: SEMER EN:

mars-avril, en pépinière: violette.
 avril-mai, en pépinière: julienne des jardins.
 juillet, en pépinière: violette.

D. Plantes à grand développement.

PLANTES ANNUELLES: SEMER EN:
 mars, à chaud: ricins.
 fin mars, sous abri: amarantes tricolore et caudatus, kochia.
 avril-mai, en place: maïs.

PLANTES VIVACES: SEMER EN:
 février-mars, à chaud: gynérium.

PLANTES BULBEUSES: SEMER EN:
 janvier, à chaud: musa.
 mars, à chaud: canna, dahlias.

E. Plantes grimpantes.

PLANTES ANNUELLES: SEMER EN:
 février-mars, à chaud en pots: cobée, mina.
 mars, à chaud en pots: loasa, maurandia, thunbergie.
 mars-avril, en pots ou sous abri: houblons, momordica.
 avril-mai, en place: capucines grandes, coloquinte, haricot d'Espagne, ipomée, pois de senteur grimpants.

PLANTES VIVACES: SEMER EN:
 avril-mai, en pépinière: pois vivace.

F. Plantes d'appartement et pots fleuris.

PLANTES ANNUELLES: SEMER EN:
 janvier-février, à chaud: bégonias semperflorens.
 février-mars, à chaud: coleus, impatiens, sensitive, torenia.
 mars, à chaud: ficoïde, pétunias à fleur frangée, torenia, verveines.
 mars, à chaud ou sous abri: kochia, lobellias erinus, mimulus, muflier nain, reines-marguerites, schizanthus.
 avril, en pots: adonide, capucines naines, godetias, némophile.
 août-septembre, en pots: pois de senteur à forcer, résédas, schizanthus, souci.

PLANTES BISANNUELLES: SEMER EN:
 mai-juin, en pépinière: campanule medium, giroflées d'hiver et giroflées muret, œillets des fleuristes.
 juillet, sous abri ombragé: calcéolaire, cinéraires hybrides, primevères de Chine.
PLANTES VIVACES: SEMER EN:
 février, à chaud: asparagus, chrysanthèmes de l'Inde, du Japon et des Montagnes du Japon, géranium, hélioïtre, rosier multiflore, streptocarpus.
 avril-mai, en pots: campanules pyramidalis, linaire.
 juillet, sous abri ombragé: primevères obconica et malacoides.
 août, en terrines: cyclamens.
 septembre-octobre: hellébore.

PLANTES BULBEUSES: SEMER EN:
 janvier-février, à chaud: bégonias tubéreux, gloxinia.

G. Plantes pour bouquets secs pour l'hiver.

PLANTES ANNUELLES: SEMER EN:
 avril, en place: acroclinium, amarantoïde, ammobium, gypsophile élégante, immortelles, rhodanthe, statice, graminées ornementales sauf gynérium et stipa.

PLANTES BISANNUELLES: SEMER EN:
 avril-mai, en pépinière: lunaire.

PLANTES VIVACES: SEMER EN:
 février-mars, à chaud: eryngium, gynérium, stipa.
 avril-mai, en pépinière: gypsophile paniculée.

H. Plantes pour abeilles.

PLANTES ANNUELLES: SEMER EN:
 avril, en place: asperule, dracocéphale, nigelle, phacelia, résédas, scabieuse, soleil. Graines de plantes mellifères.
PLANTES BISANNUELLES: SEMER EN:
 avril-mai, en pépinière: buglosse.

GRAINES DE FLEURS.

Les lettres en fin de ligne renvoient aux paragraphes correspondants du calendrier des semis, page 29. Nos clients y trouveront l'usage de chaque plante, la date et le mode de semis, ainsi que l'époque de floraison.

Les abréviations: Ann., Bis., Viv., Bulb., employées ci-dessous signifient respectivement: annuelle, bisannuelle, vivace, bulbeuse. La lettre H indique la hauteur.

			Paquet	25 gr.	10 gr.
796	<i>Achillea ptarmica</i> The Pearl. Viv. H. 0 ^m 80. Bouquets blancs . . .	C	2 00	—	—
798	<i>Aconit</i> Napel. Vivace. H. 1 ^m 20. Longs épis bleu violet foncé . . .	C	2 00	—	—
800	<i>Acroclinium</i> rose double. Ann. H. 0 ^m 35. Fleurs sèches, rose clair. . .	G	1 50	2 50	—
804	<i>Adonide</i> Goutte de sang. Ann. H. 0 ^m 50. Grosses fleurs rouges. . .	CF	1 00	—	—
806	<i>Agératum</i> du Mexique Swanley Blue. Ann. 0 ^m 60. Touffes bleues . .	C	1 50	—	—
807	— du Mexique Impérial nain bleu. Ann. H. 0 ^m 20. Bordures . . .	C	2 00	4 00	—
812	<i>Alyssum maritimum</i> , Corbeille d'argent. Ann. 0 ^m 25. Blanc, odor. . .	C	1 20	—	—
813	— saxatile, Corbeille d'or, compact. Viv. H. 0 ^m 15. Jaune d'or. . .	A	2 00	—	—
816	<i>Amarante tricolore splendens</i> . Ann. 1 m. Feuille panaché, ornem. . .	D	1 20	—	—
818	— caudatus, Queue de renard. Ann. 0 ^m 80. Epis retombants. . .	D	1 20	—	—
820	— crête de coq, <i>Celosia cristata</i> , var. Ann. 0 ^m 50. Crêtes vives. . .	C	2 50	—	—
821	— crête de coq naine, monstrueuse, sup. mél. Ann. H. 0 ^m 25 . . .	C	3 50	—	—
825	<i>Amarantoïde</i> (<i>Gomphrena</i>). Ann. 0 ^m 30. Fl. sèches, violet luisant. . .	G	1 20	—	—
828	<i>Ammobium alatum</i> . Ann. 0 ^m 50. Fl. blanches, sèches. Tiges raides . .	G	1 00	—	—
829	<i>Ancolie</i> des jardins hybride double, variée. Viv. 0 ^m 90. Tous tons . .	B	1 20	—	—
830	— <i>chrysantha</i> , double. Viv. H. 1 ^m 20. Gracieuses fl. jaune vif. . .	B	4 00	—	—
831	<i>Asparagus plumosus nanus</i> . Viv. Plante d'intérieur (20 graines) . .	F	2 50	—	—
832	— <i>Sprengeri</i> . Viv. Retombant. Plante d'intérieur (20 graines). . .	F	2 50	—	—
833	<i>Aspérule azurea setosa</i> . Ann. H. 0 ^m 35. Touffes de fl. bleu clair . .	CH	1 50	—	—
835	<i>Aster</i> vivace, choix sup. 0 ^m 80. Marguerites mauves ou blanches . .	C	2 00	9 00	—
837	<i>Aubrietia purpurea</i> . Viv. 0 ^m 25. Touffue. Fl. violettes. Rocailles. . .	A	3 00	—	—
845	<i>Balsamine</i> double, en très beau mél. Ann. H. 0 ^m 50. Tiges fleuries . .	C	1 50	—	—
846	— <i>camélia extra-double</i> var. Ann. 0 ^m 50. Hampes de fl. énormes . .	C	2 00	—	—
851	<i>Bégonia semperflorens atropurpurea</i> Vernon. Ann. 0 ^m 40. Touffes pourpres, couvertes de fleurs rouges. Longue floraison . . .	CF	2 50	—	—
853	— <i>semperflorens gracilis</i> rose. Ann. 0 ^m 20. Touffes de fl. roses . .	CF	3 50	—	—
854	— <i>semperflorens gracilis</i> lumineux, écarlate. Ann. H. 0 ^m 20. Touffes de fleurs écarlates sur un feuillage vert foncé . . .	CF	4 00	—	—
856	— tubéreux hybride simple, en beau mélange. Bulb. H. 0 ^m 40. Larges fleurs de teintes éclatantes. Situation ombragée. . .	CF	4 00	—	—
861	— tubéreux hybride double, en mélange superbe. Bulb. 0 ^m 40. Fleurs pleines. Coloris splendides. Egalement pour l'ombre. . .	CF	8 00	—	—
864	<i>Belle de jour</i> , <i>Liseron tricolore</i> , en mél. Ann. 0 ^m 35. Etalée, florif. . .	C	1 20	—	3 20
869	<i>Belle de nuit</i> , en mélange. Ann. 0 ^m 80. Odorante. Fleurit la nuit. . .	C	1 50	—	—
870	— naine à feuilles panachées, variée. Ann. 0 ^m 30. Décorative. . .	C	2 00	—	—
874	<i>Buglosse</i> d'Italie, <i>Anchusa</i> . Bis. H. 1 ^m 50. Rameaux de fl. bleues . .	CH	2 50	—	—
875	<i>Calcéolaire</i> hybride, en beau mél. Bis. 0 ^m 50. Fleurs étranges. Pots . .	F	8 00	—	—
879	<i>Campanule speculum</i> , miroir de Vénus, simple, var. Ann. H. 0 ^m 30 . .	C	1 20	—	—
880	— medium, à grosse fleur variée, <i>Calycanthème</i> . Bis. H. 0 ^m 60. . .	BF	2 00	—	—
882	— <i>persicifolia</i> , à feuille de pêcher, var. Viv. 0 ^m 50. Gracieuse . . .	C	2 50	—	—
885	— <i>pyramidalis</i> bleue. Viv. H. 1 ^m 50. Longs épis bleu clair. . .	CF	1 50	—	—
886	— <i>pyramidalis</i> blanche. Viv. H. 1 ^m 50. Longs épis blancs. . .	CF	2 00	—	—
887	<i>Canna</i> florifère à grande fleur, race Crozy, en mélange. Bulb. H. 1 m. à 1 ^m 50. Sup. plante à fleurs et feuillage éclatants. . .	CD	3 50	—	—
889	<i>Capucine</i> naine Tom-Pouce, variée. Ann. H. 0 ^m 35. Très florifère. . .	CF	1 50	—	3 20
892	— naine, Impératrice des Indes. Ann. H. 0 ^m 35. Fleur rouge . . .	CF	2 00	—	5 00
894	— grande variée. Ann. atteint 2 m. Fleurs multicolores. . .	E	1 20	—	3 00
895	— des Canaris. Ann. Atteint 3 m. Petites fl. jaunes, gracieuses . .	E	2 00	—	—
896	— hybride de Lobb, variée. Ann. Atteint 5 m. Eclatante. Florif. . .	E	1 20	—	3 50
900	<i>Célosie</i> à panache, Triomphe de l'Exposition, superbe mélange. Ann. H. 0 ^m 60. Panaches brillants. Feuillage bronzé.	C	2 00	—	—
901	<i>Centaurea</i> barbeau double variée, Bleuets des jardins. Ann. H. 1 m. . .	C	1 20	—	—
903	— Impériale, à gde fleur variée. Ann. 0 ^m 60. Odor. Coloris fins . . .	C	1 50	—	—
905	<i>Chrysanthème</i> des jardins à fl. double, var. Ann. H. 0 ^m 70. Florif. . .	C	1 20	—	—
906	— à carène hybride de Burridge. Ann. 0 ^m 60. Larges fl. simples . .	C	1 50	—	—
907	— de l'Inde, double précoce. Viv. H. 0 ^m 70. Jolis petits pompons . .	CF	3 00	—	—
908	— de l'Inde hybride semi-double. Viv. H. 0 ^m 70. Coloris vifs . . .	CF	3 00	—	—
909	— du Japon, à grande fleur. Viv. Superbe pot d'automne . . .	F	4 00	—	—
910	— des montagnes du Japon. Viv. Nombreuses fleurs simples . . .	CF	2 50	—	—

		Paquet	2 gr.	10 gr.
911	Cinénaire hybride à gde fleur. Bis. 0 ^m 50. Gros bouquets. Sup. pots .	F	5 00	—
912	— hybride à fleur double. Bis. H. 0 ^m 50. Bouquets touffus .	F	8 00	—
914	— hybride multiflore polyantha et radiata, en sup. mél. Bis. H. 0 ^m 80. Gracieux bouquets de fl. légères. Coloris fins .	F	3 00	—
916	— maritime candidissima. Ann. H. 0 ^m 40. Feuill. blanc, touffu.	C	1 20	—
917	Clarkia élégante double, var. Ann. H. 0 ^m 60. Rameaux de jolies fl.	C	1 20	—
919	Cobée scandens, grimpante. Ann. Atteint 8 m. Gr. fleurs violettes	E	3 00	—
922	Coleus en beau mélange. Ann. 0 ^m 50. Feuill. panaché, ornemental	F	3 00	—
923	— hybride, à très gde feuille, varié. Ann. Feuilles géantes .	E	8 00	—
925	Coloquinte en mél. Ann. Grimp. Atteint 4 m. Fruits décoratifs.	E	1 20	—
926	Coquelourde Rose du Ciel. Ann. 0 ^m 50. Touffes de jolies fl. roses .	C	1 20	—
927	— des jardins, var. Viv. 0 ^m 70. Nombr. fl. simples, gracieuses	BC	1 00	—
928	Coréopsis hybride varié. Ann. 0 ^m 80. Marguerites jaunes. Florifère	C	1 20	—
929	Cosmos hybride à gde fl. varié. Ann. 1 ^m 20. Jolies marguerites .	C	1 20	—
932	Cyclamen Persicum giganteum, sup. mél. Viv. 0 ^m 20 (20 graines) .	F	5 00	—
933	— Persicum giganteum à grande fleur fimbriée Papilio. Viv. H. 0 ^m 20. Curieuses fleurs ondulées et frangées (20 graines).	F	8 00	—
934	Dahlia simple nain, compact, panaché et var. Bulb. 0 ^m 60. Florif. CD	CD	1 50	—
935	— simple Stella, var. Bulb. 1 ^m 20. En forme d'étoile de mer. .	CD	2 50	—
936	— semi-double géant varié. Bulb. 1 ^m 50. Fl. gracieuses, originales	CD	3 50	—
937	— double var. Bulb. 1 ^m 50. Très grosse fl. compacte, en boule	CD	5 00	—
938	— double à fleur de cactus var. Bulb. 1 ^m 50. La plus jolie race	CD	6 00	—
939	Digitale pourprée à fl. de gloxinia. Bis. H. 1 ^m 30. Beaux épis. Rust.	B	1 50	—
941	Dimorphotheca hybride. Ann. H. 0 ^m 25. Se ferme pour la pluie. .	C	2 50	—
942	Dracocéphale de Moldavie. Ann. 0 ^m 60. Fleurs bleues et blanches.	CH	1 20	—
943	Erigeron speciosus hybride. Viv. H. 0 ^m 30. Marguerites lilas. Rust.	C	2 00	—
944	Eryngium giganteum, Chardon bleu. Viv. H. 0 ^m 60. Fl. épineuses.	G	1 50	—
945	Eschscholtzia de Californie varié. Ann. 0 ^m 50. Belles fleurs larges	C	1 50	—
	Ficoïde glaciale. Voir n° 286, page 11.		—	—
950	Gaillarde picta Lorenziana, double var. Ann. 0 ^m 50. Fleurs pleines	C	1 50	—
951	— vivace, à grande fleur, sup. mél. Viv. H. 0 ^m 80. Fl. éclatantes	C	1 50	2 80 11 00
953	Gaura Lindheimeri. Ann. 1 ^m 20. Gracieux rameaux de fl. blanches	C	1 50	—
954	Géranium Pelargonium, zonale et inquinans, en beau mél. Viv.	F	4 00	—



GIROFLÉES.**1. Giroflées quarantaines d'été (annuelles).**

Sauf le n° 960, les quarantaines ci-après proviennent de plantes cultivées en pots.

		Paquet	2gr.	10 gr.
960	Giroflée 40 ^{ne} beau mél. H. 0 ^m 30. Sélection de 40 ^{es} de pleine terre	C	2 00	7 50 —
961	— 40 ^{ne} à grande fleur double, sup. mél. H. 0 ^m 40. Choix extra.	C	3 00	11 00 —
962	— 40 ^{ne} Victoria, rouge sang foncé. H. 0 ^m 35. Double, superbe.	C	3 00	— —
963	— 40 ^{ne} Victoria, blanc pur. H. 0 ^m 35. Double. Très appréciée.	C	3 50	— —
965	— 40 ^{ne} géante Perfection. 0 ^m 50. Très jolie. Nouvelles teintes	C	3 50	— —
966	— 40 ^{ne} remontante, à gde fleur, double var. 0 ^m 60. Fl. coupée	C	3 00	— —
967	— 40 ^{ne} remontante, géante Excelsior, blanche. 0 ^m 60. Superbe	C	5 00	— —

2. Giroflées d'hiver (bisannuelles).

970	Giroflée d'hiver grosse espèce, var. 0 ^m 50. Pots, massifs printan.	AF	4 00	— —
971	— d'hiver précoce de Nice. H. 0 ^m 50. Fleurit à la fin de l'hiver	AF	4 00	— —

3. Giroflées jaunes, Muret (bisannuelles).

975	Giroflée jaune variée. H. 0 ^m 70. Jolies fl. printanières, odorantes	AF	1 50	— 9 00
977	— jaune double variée. H. 0 ^m 50. Fl. plus grosses. Jolis tons.	AF	4 00	— —

4. Giroflées hybrides (bisannuelles).

978	Giroflée hybride Allionii orangée. H. 0 ^m 40. Splendides corbeilles	A	1 50	3 00 —
979	Gloxinia hybride à gde fleur. Bulb. H. 0 ^m 20. Superbe pot d'été.	F	6 00	— —
980	Gnaphalium des Alpes, Edelweiss. Viv. H. 0 ^m 15. Fleur laineuse.	C	3 50	— —
982	Godetia Whitneyi nain, Lady Albemarle. Ann. 0 ^m 35. Pourpre vif	CF	1 50	— —
986	— demi-nain en beau mél. Ann. H. 0 ^m 60. Gracieux, florifère	CF	1 50	— —
990	Gypsophile élégante à gde fl. blanc pur. Ann. 0 ^m 50. Ram. légers	G	1 00	— 3 00
991	— paniculée. Viv. H. 1 m. Panicules merveilleusement légères	G	1 50	— 9 00
995	Haricot d'Espagne var. Ann. Grimpant. Florifère (20 grammes).	E	1 50	— —
1000	Héliotrope en beau mél. Viv., annuel en pleine terre. H. 0 ^m 60.	CF	2 50	— —
1002	Hellébore noir, Rose de Noël. Viv. H. 0 ^m 30. Fleurit sous la neige	CF	2 00	— —
1004	Heuchera sanguinea splendens. Viv. 0 ^m 35. Légères grappes rouges	B	3 50	— —
1006	Houblon du Japon. Ann. Grimp. Atteint 5 m. Très rapide. Rust.	E	1 20	— —
1007	— du Japon à feuilles panachées. Ann. Atteint 5 m. Décoratif	E	1 50	— —
1010	Immortelle à bractées, monstrueuse, double, sup. mél. Ann. 1 m.	CG	1 50	— —
1013	— à bractées, monstrueuse, double naine, tr. beau mél. 0 ^m 25	CG	2 00	— —



N° 932. — Cyclamen de Perse.

N° 911. — Cinéraire à grande fleur.

			Paquet	2 gr.	10 gr.
1014	Impatiens Sultani hybride. Ann. 0 ^m 50. Beaux coloris. Sup. pots	F	5 00	—	—
1015	Ipomée volubilis variée, Liseron pourpre. Ann. grimp. H. 3 m.	E	1 20	—	3 50
1016	Julienne des Jardins naine blanc pur. Viv. 0 ^m 50. Gr. panicules	C	2 00	—	—
1017	— de Mahon variée. Ann. H. 0 ^m 25. Touffes de jolies fl. Rust.	C	1 00	2 00	—
1018	Kochia trichophylla. Ann. H. 1 m. Buisson ovale léger.	CDF	1 00	—	—
1020	Leptosiphon hybride, varié. Ann. 0 ^m 10. Nomb. fl. multicolores.	C	1 50	—	—
1021	Lin à grande fleur rouge. Ann. 0 ^m 30. Multiples fleurs rouge vif.	C	1 20	—	3 50
1023	Linaire cymbalaire. Ann. Rampante. Fine plante de murailles.	F	2 00	—	—
1024	Loasa orangé. Ann. Grimp. 2 m. Rapide. Curieuses fl. orange	E	1 50	—	—
1025	Lobelia erinus bleu. Ann. H. 0 ^m 15. Gentille fleur pour bordure	CF	1 50	4 00	—
1026	— erinus bleu Crystal Palace. Ann. 0 ^m 15. Feuill. rouge brun	CF	2 00	9 00	—
1027	— erinus nain compact bleu à grand œil blanc. Très joli.	CF	2 50	—	—
1029	— cardinalis Queen Victoria. Viv. H. 0 ^m 80. Superbe plante à feuillage rouge brun. Fleurs en épis rouge vif.	C	5 00	—	—
1033	Lunaire annuelle, Monnaie du pape. Bis. H. 0 ^m 80. Bouquets secs	BG	2 00	—	—
1035	Lupin annuel en beau mél. Ann. 0 ^m 80. Jolis épis multicolores.	C	1 20	—	4 60
1037	— vivace polyphyllus en mélange. Viv. 1 ^m 20. Superbes épis.	C	1 50	—	—
1040	Lychnis de Chalcédoine, Croix de Jérusalem, rouge. Viv. H. 0 ^m 90	C	1 50	—	—
1045	Maïs du Japon à feuille panachée. Ann. 1 m. Feuillage rubané	D	1 50	—	—
1046	Malope à grande fleur var. Ann. 1 m. Grandes fl. pourpres. Florif.	C	1 20	—	—
1047	Maurandia en très beau mél. Ann. Grimpante. 4 m. Fl. mauves	E	2 50	—	—
1054	Mimulus cuivré hybride à gde fl. varié. Ann. 0 ^m 25. Florif. Brill.	CF	4 00	—	—
1056	Mina lobata. Ann. Grimp. 5 m. Exubérante. Beaux épis orangés	E	4 00	—	—
1057	Momordica balsamina, Pomme de merveille. Ann. Grimp. 2 m.	E	2 50	—	—
1062	Muflier à gde fleur, en beau mél., Gueule de Lion. Ann. 0 ^m 80	C	1 50	5 00	20 00
1063	— à grande fleur blanc pur. Ann. 0 ^m 80. Beaux épis blancs	C	2 00	—	—
1064	— nain Tom-Pouce en beau mél. Ann. 0 ^m 20. Touffes brillantes	CF	2 50	—	—
1067	Musa ensete, Bananier. Bulb. 1 ^m 50. Feuille énorme (10 graines)	D	8 00	—	—
1070	Myosotis des Alpes bleu. Bis. 0 ^m 30. Charmantes fl. printanières	A	1 20	2 80	11 00
1071	— des Alpes blanc. Bis. H. 0 ^m 30. A fleurs blanches	A	2 00	—	—
1072	— des Alpes rose. Bis. H. 0 ^m 30. A fleurs roses	A	2 00	—	—
1073	— Victoria compact bleu. Bis. H. 0 ^m 20. Touffes très denses.	A	3 00	—	—
1074	— palustris, Ne m'oubliez pas. Viv. 0 ^m 25. Fleurs larges.	A	2 50	—	—
1076	Némésia strumosa à gde fleur, nain compact. Ann. 0 ^m 20. Brill.	C	2 00	—	—
1078	Némophile insignis bleue. Ann. H. 0 ^m 20. Grandes fleurs bleu ciel	CF	1 50	—	—
1079	Nigelle de Damas double naine. Ann. 0 ^m 30. Fl. bleues. Feuill. lég.	CH	1 20	—	—



N° 935. — Dahlia Stella.

N° 938. — Dahlia Cactus.

CEILLETS.**1. Œillets de Chine (annuels).**

			Paquet	2 gr.	10 gr.
1081	Œillet de Chine double var. 0 ^m 30. Double, très dentelé, chamarré	C	1 20	3 00	12 00
1083	— de Chine de Heddewig Royal simple varié. 0 ^m 30. Large	C	2 00	—	—
1085	— de Chine de Heddewig Royal double varié. 0 ^m 30. Lacinié	C	2 50	7 50	—
	— d'Inde. Voir Tagète Patula.	—	—	—	—

2. Œillets de poète (bisannuels).

1086	Œillet de poète varié, Bouquet parfait. 0 ^m 40. Fl. simples, maculées	B	1 00	—	5 40
1087	— de poète double varié. 0 ^m 40. Bouquets doubles. Coloris vifs	B	1 50	3 00	12 00

3. Œillets mignardises (vivaces).

1089	Œillet mignardise double var. 0 ^m 30. Panaché. Odorant. Bordures	B	3 00	9 00	36 00
1090	— mignardise française, remontant double, gde fleur var. 0 ^m 30. Cultivé en bisannuel. Lacinié. Coloris éclatants.	C	4 00	—	—

4. Œillets des Fleuristes (annuels ou bisannuels).

1091	Œillet des fleuristes double varié. 0 ^m 50. Odorant. Très rustique	CF	3 00	—	—
1092	— de fantaisie, double varié. H. 0 ^m 50. Picoté, liseré, marbré	CF	3 00	—	—
1094	— Flamand, de 1 ^{er} ordre. 0 ^m 50. Grandes rayures bicolores.	CF	4 00	—	—
1096	— remontant nain à tige de fer, double, varié. 0 ^m 25. Coloris brillants. Tiges rigides. Longue floraison. Pots.	CF	4 00	—	—
1098	— Marguerite demi-haut, double remontant, varié. H. 0 ^m 40. Large, frangé, unicolore. Fl. 6 mois après semis. Rustique	CF	3 00	7 50	28 00
1099	— Marguerite remontant à fl. de Malmaison, géant. H. 0 ^m 50. Fleurs énormes, unicolores, 6 mois après semis	CF	3 00	7 50	30 00
1100	— perpétuel géant double (race Chabaud), varié. H. 0 ^m 50. Grosses fleurs odorantes, à tige forte. Fleurit sans arrêt	CF	5 00	12 00	—
1101	— perpétuel géant double (race Chabaud), blanc pur. H. 0 ^m 50	CF	5 00	—	—
1102	— perpétuel géant double (race Guillaud), varié. H. 0 ^m 50. Grosses fleurs de coloris superbes. Fleurit sans arrêt	CF	5 00	—	—
1103	— perpétuel à grande fleur du Midi, Géant de Nice. H. 0 ^m 50. Œillet que le Midi nous envoie en hiver (40 graines)	CF	6 00	—	—



N° 1100. — Œillet perpétuel race Chabaud. N° 1103. — Œillet perpétuel Géant de Nice.

		Paquet	2 gr.	10 gr.
1105	Pâquerette double à très gde fl. var. Viv. 0 ^m 15. Jolis pompons . . .	A	2 00	9 00
1106	— double monstrueuse rouge. Viv. 0 ^m 15. Pompons rouges. . .	A	4 00	14 00
1107	— double monstrueuse blanche. Viv. 0 ^m 15. Blanc pur . . .	A	4 00	—
1110	Pavot des jardins double à fl. frangée, var. Ann. 1 m. Fl. pleines	C	1 00	—
1111	— tulipe. Ann. H. 0 ^m 50. Belle fleur rouge en forme de tulipe	C	1 50	—
1112	— d'Islande à grande fleur, varié. Viv. H. 0 ^m 30. Coloris vifs	B	2 00	—
1113	— d'Orient hybride à gde fl. rouge foncé. Viv. 1 ^m 20. Enorme	C	2 50	—
1114	Pensée cornuta à gde fleur bleue, Admiration. Bis. 0 ^m 20. Florif.	A	3 00	9 00
1115	— cornuta de Paris, violette. Bis. H. 0 ^m 15. Jolies fleurettes .	A	3 00	9 00
1116	— lutea à gde fleur jaune. Bis. H. 0 ^m 20. Unicolore, gracieuse	A	3 00	9 00
1117	— de Munby. Viv. 0 ^m 15. Nombr. fleurs bleues à oeil blanc .	A	3 50	—
1118	— à gde fleur Candidissima, Reine des Neiges, blanc pur. Bis.	A	3 00	—
1119	— à gde fleur Faust, Roi des Noirs. Bis. 0 ^m 20. Noire, bizarre	A	3 00	—
1120	— à gde fl. jaune pur. Bis. H. 0 ^m 20. Belle teinte franche. .	A	3 00	9 00
1122	— à gde fleur rose lilas, Reine des Mauves. Bis. 0 ^m 20. Exquise	A	3 00	—
1123	— à gde fleur Cardinal. Bis. H. 0 ^m 20. Rouge luisant superbe	A	4 00	12 00
1125	— à gde fleur bleu clair. Bis. 0 ^m 20. Teinte délicate . . .	A	3 00	9 00
1126	— à gde fleur Lord Beaconsfield, demi-deuil. Violet et blanc	A	3 00	—

Ces variétés, sélectionnées avec soin, sont de coloris brillants, remarquables. Les fleurs en sont énormes et de dimensions extraordinaires. Les amateurs de pensées en tireront les plus jolis contrastes.

1128	Pensée à grande fleur en mélange, Pensée anglaise. Bis. H. 0 ^m 20	A	1 50	6 00
1129	— à gde fleur striée et marbrée. Bis. 0 ^m 20. Jolies fl. striées	A	3 00	—
1131	— à gde fleur Trimardeau, à grandes macules var. Bis. 0 ^m 20	A	4 00	—
1132	— à gde fleur Bugnot, var. Bis. 0 ^m 20. Riches tons cuivrés .	A	5 00	17 00
1133	— à gde fleur Parisienne, mélange supérieur. Bis. H. 0 ^m 20. .	A	5 00	17 00

Ce mélange est d'une richesse inouïe. A l'amateur, qui ne peut semer toutes les variétés, il donnera une idée de la perfection de ces belles fleurs.

1134	Pentstémon hybride à gde fl. beau mél. Ann. 0 ^m 60. Epis pourprés	C	2 50	12 00
------	--	---	------	-------



			Paquet	2 gr.	10 gr.
1135	Périlla de Nankin. Ann. 0 ^m 70. Feuillage noir-pourpre, décoratif.	C	1 20	—	—
1140	Pétunia hybride, en beau mél. Ann. H. 0 ^m 50. Coloris très variés	C	1 50	3 50	14 00
1141	— hybride à gde fl., choix superbe. Ann. 0 ^m 40. Fleurs larges	C	6 00	—	—
1142	— hybride à gde fl. frangée, var. Ann. 0 ^m 40. Plissé, dentelé.	CF	5 00	—	—
1144	— hybride à grande fleur double frangée, varié. Ann. H. 0 ^m 40. Enorme fleur très double, ondulée et finement dentelée.	CF	8 00	—	—
1155	Phacelia Campanularia. Ann. 0 ^m 15. Nombr. fl. bleues, en cloches	CH	1 50	—	—
1160	Phlox de Drummond en beau mél. Ann. H. 0 ^m 40. Bouq. multicol.	C	1 20	3 00	12 00
1161	— de Drummond, à gde fleur, choix extra. 0 ^m 40. Grandes bouq.	C	1 50	3 50	—
1165	— de Drummond nain compact, beau mél. Ann. 0 ^m 20. Touffu	C	3 00	—	—
1168	— vivace hybride, en beau mél. Viv. H. 1 m. Sup. panicules	C	4 00	—	—
1170	Pied d'alouette des jardins, double nain var. Ann. 0 ^m 40. Gr. épis	C	1 50	—	—
1171	— des jardins double grand varié. Ann. H. 1 m. Grands épis.	C	1 20	—	—
1173	— des blés double panaché tricolore. Ann. 1 m. Epis légers.	C	2 00	—	—
1176	— vivace, de la Chine, à gde fleur, varié. Viv. 1 ^m 20. Splendide	C	2 50	—	—
1180	Pois de senteur sup. mél. Ann. Grimp. H. 1 ^m 50. Anciens types.	CE	1 00	—	3 00
1181	— à forcer en mél. Ann. 1 m. Fleurit en appartement à Noël	F	2 50	—	6 50
1182	— à fleur géante ondulée, race Spencer, superbe mélange. Ann. Grimp. 1 ^m 50. Fl. énormes, ondulées. Tons splendides	CE	2 00	—	4 00
—	— à fleur géante ondulée, race Spencer, variétés séparées.		—	—	—
	Nouveautés pour 1932 et meilleures variétés. Voir page 39.				

Les pois de senteur, de culture si facile, sont précieux pour l'ornementation des jardins, balcons, etc. Avec notre mélange de race Spencer, on obtiendra de belles et grandes fleurs ondulées, d'une richesse de coloris réellement incomparable.

Voir à la page 39, notre collection de pois de senteur en variétés séparées.

1183	Pois de senteur nain Cupidon varié. Ann. 0 ^m 20. Très florifère.	C	2 00	—	6 00
1184	Pois vivace, varié. Viv. grimp. 1 ^m 50. Jolis bouquets pourpres.	CE	3 00	—	14 00



N° 939. — Digitale.



N° 798. — Aconit.

N° 1176. — Pied d'alouette vivace.

			Paquet	2gr.	10 gr.
1187	Potentille hybride double à gde fl. var. Viv. 0 ^m 60. Fl. mordorées	C	2 50	—	—
1188	Pourpier à gde fl. var. Ann. 0 ^m 20. Tapis éclatant en plein soleil	C	1 20	2 50	10 00
1190	— à grande fleur double, sup. mél. Ann. 0 ^m 20. Fleurs pleines	C	2 50	—	—
1195	Primevère des jardins, choix extra. Viv. 0 ^m 20. Jolis bouquets.	A	4 00	—	—
1196	— des jardins acaule hybride à gde fl. Viv. 0 ^m 10. Tons nouv.	A	6 00	—	—
1197	— du Japon variée. Viv. H. 0 ^m 60. Hampes de bouquets étagés	A	2 50	—	—
1198	— de Chine à fleur frangée, 1 ^{er} choix. Bis. 0 ^m 25. (25 graines)	F	3 50	—	—
1199	— de Chine frangée double, sup. mél. Bis. 0 ^m 25 (20 graines)	F	8 00	—	—
1204	— obconica gigantea, superbe mél. Viv. H. 0 ^m 30. Plus légère	F	5 00	—	—
1205	— malacoïde. Viv. H. 0 ^m 35. Bouquets très légers. Tons lilas	F	2 50	—	—
Les primevères de serre et d'appartement (1198 à 1205) sont parmi les plantes les plus estimées pour la décoration d'hiver. Leur culture est aisée et demande peu de soins.					
1207	Pyrethrum parthenium aureum nain. Ann. 0 ^m 20. Feuill. doré	C	1 20	3 00	12 00
1208	— parthenium aureum à feuilles laciniées Perfection. 0 ^m 20.	C	3 00	—	—
1210	Reine-Marguerite demi-naine Comète, sup. mél. Ann. 0 ^m 35. Hât.	CF	2 50	—	—
1211	— naine à fleur de chrysanthème, var. Ann. 0 ^m 25. Très large	CF	3 50	9 00	38 00
1212	— naine Nec plus Ultra, var. Ann. H. 0 ^m 25. Fleur énorme	CF	3 50	—	—
1213	— grande pyramidale double, var. Ann. 0 ^m 60. Tiges dressées.	CF	2 00	4 00	16 00
1214	— grande pyramidale double, pivoine, Perfection. Ann. 0 ^m 60	CF	3 50	—	—
1215	— grande Comète géante, variée. Ann. H. 0 ^m 60. Echevelée.	CF	2 50	—	—
1216	— grande couronnée à centre blanc, var. H. 0 ^m 60. Originale.	CF	3 00	—	—
1219	— grande Mammoth, sup. mél. Ann. 0 ^m 60. Fleurs géantes.	CF	3 50	9 00	38 00
1221	— grande Plume d'Autruche blanche. Ann. 0 ^m 60. Gracieuse.	CF	3 00	9 00	36 00
1223	— grande Unicum, électrique, en mél. H. 0 ^m 60. Rayonnante.	CF	3 00	9 00	36 00
Les variétés naines de Reines-Marguerites conviennent surtout pour petites corbeilles, pots, etc. Les variétés élevées, ornement de tous les jardins, forment de superbes corbeilles, bouquets, etc.					
1225	Réséda odorant à grande fleur. Ann. H. 0 ^m 30. Epis vert blond.	FH	1 50	—	5 40
1226	— Victoria à grande fleur rouge luisant. Ann. 0 ^m 30. Brill.	FH	2 00	—	—
1227	— Goliath à grande fleur, rouge cuivré. Ann. 0 ^m 30. Enorme.	FH	3 00	—	—
1228	— Gabrièle Imperial. Ann. H. 0 ^m 30. Epi rouge très compact.	FH	2 00	—	—
1229	— Machet amélioré. Ann. 0 ^m 25. Gros épi rouge.	FH	2 00	—	—
1233	Rhodanthe de Mangles à fl. pleine. Ann. 0 ^m 30. Fl. roses, sèches.	CG	1 20	—	—
1235	Ricin sanguin. Ann. H. 2 m. Plante géante à feuillage rouge.	D	2 00	—	—
1236	— de Zanzibar varié. Ann. H. 3 m. Feuilles géantes, variées.	D	2 00	—	—



N° 1223. — Reine-Marguerite Unicum.

N° 1219. — Reine-Marguerite Mammoth.

		Paquet	2 gr.	10 gr.
1240	Rose trémière, race Chater, double, choix superbe. Bis. H. 2 m. BC	3 50	—	—
1242	Rosier multiflore, nain remontant var. Viv. 0m40. Fl. en bouq. CF	3 50	—	—
1244	Rudbeckia purpurea grandiflora. Viv. 1 m. Marguerite rouge. C	3 00	—	—
1245	— speciosa. Viv. H. 0m40. Marguerite jaune à centre noir. C	3 00	—	—
1246	Salpiglossis à gde fleur, beau mél. Ann. 0m70. Fleur en cornet. C	2 00	—	—
1247	Salvia splendens Incendie. Ann. 0m50. Superbes épis rouge feu. C	2 50	7 50	—
1249	Scabieuse des jardins naine, double, var. Ann. 0m35. Pompons. CH	1 50	—	—
1254	Schizanthus en beau mél. Ann. 0m70. Buisson de fleurs légères CF	1 20	—	—
1264	Sensitive, mimosa pudica. Ann. 0m40. Se replie au moindre choc F	1 50	—	—
1273	Silène pendula nain compact rouge. Ann. 0m10. Touffes rouges A	2 00	—	6 50
1276	Soleil cucumerifolius, à pétales contournés. Ann. 1m20. Jaune. CH	1 50	—	—
1280	Souci des jardins double Prince d'Orange. Ann. 0m30. Orangé. CF	1 20	—	—
1281	Statice annuel en beau mél. Ann. 0m50. Garniture de bouquets CG	1 20	—	—
1283	Streptocarpus kewensis hybride à gde fl. var. Viv. 0m20. Pots. F	5 00	—	—
1285	Tabac affinis blanc odorant à gde fl. Ann. 0m75. Fl. tubuleuse. C	1 20	—	—
1286	— affinis hybride à gde fl. multicolore. Ann. 0m75. Jolis tons. C	1 50	—	—
1287	Tagète patula, œillet d'Inde double grand, Passe-velours, varié. Annuel. H. 0m60. Jolis pompons orangés et mordorés. C	1 50	—	—
1288	— patula, œillet d'Inde nain, La Légion d'Honneur. H. 0m25. C	2 00	—	—
1289	— erecta, Rose d'Inde double var. Ann. 1 m. Gros pompons. C	1 50	—	—
1290	— signata pumila, naine. Ann. 0m25. Touffes de fl. orangées. C	2 00	—	—
1291	Thalictrum dipterocarpum. Viv. 1 m. Jolies panicules mauves. C	3 00	—	—
1292	Thlaspi blanc. Ann. H. 0m25. Touffes blanches compactes, odor. C	1 20	—	—
1295	Thunbergie ailée, variée. Ann. Grimp. H. 1m50. Jolies fl. jaunes. E	2 50	—	—
1296	Torenia Fournieri. Ann. H. 0m20. Pots de fl. bleues, superbes. F	1 50	—	—
1297	Tritoma uvaria grandiflora. Viv. 1m20. Longs épis orangés. C	2 50	—	—
1300	Valériane des jardins var. Viv. 1 m. Bouq. rouges, blancs, roses. C	1 50	—	—
1305	Véronique vivace, en beau mél. Viv. 1m20. Longs épis bleus. C	2 00	—	—
1308	Verveine erinoïde, violette. Ann. H. 0m40. Nombreux bouquets. CF	2 00	—	—
1310	— hybride ou des jardins à gde fl. variée extra. Ann. 0m40. CF	2 50	6 00	—
1312	— venosa. Ann. 0m35. Nombreux bouquets violets. Sols secs. CF	2 00	—	—
1315	Violette odorante des 4 saisons. Viv. 0m10. D'automne et de print. AC	3 50	—	—
1320	Zinnia élégant double, var. extra. Ann. 0m70. Grandes pompons. C	1 50	—	7 50
1321	— élégant double nain, varié. Ann. H. 0m30. Pl. plus touffue. C	2 00	—	9 00
1322	— élégant double strié, varié. Ann. 0m70. Panaché, décoratif. C	2 00	—	9 00
1323	— élégant double à fleur géante, varié. Ann. 0m70. Enorme. C	3 00	—	20 00
1325	— du Mexique à fl. double, varié. Ann. 0m40. Jolie fl. orange. C	3 00	—	—
1330	Graines de fleurs annuelles en beau mélange. C	1 20	—	5 40
1331	— de plantes mellifères. Beau mélange, pour abeilles H	1 20	—	5 40
1332	Gazon japonais. Mélange de fl. annuelles et graminées naines. C	1 50	—	6 50

GRAMINÉES ORNEMENTALES.

Les graminées ornementales forment de beaux bouquets secs, très utiles pour l'ornementation des appartements pendant l'hiver. Ces bouquets peuvent se composer uniquement de graminées ou être piqués d'immortelles, rhodanthes, statices, physalis, etc. Couper les fleurs avant leur complet épanouissement et les faire sécher au-dessus des sarments encore rouges d'un feu de bois sec qu'on aura fait flamber en plein air.

1335	Agrostis nebulosa, Agrostide capillaire. Ann. H. 0m35. Légère. G	1 50	—	—
1340	Briza maxima à grande fleur. Ann. H. 0m40. Cœurs tremblants. G	1 20	—	—
1342	Coix Lacryma, Larmes de Job. Ann. H. 0m90. Fruits en perles. G	1 00	—	—
1345	Gynerium argenteum. Viv. H. 2 m. Grands plumets argentés. DG	1 50	—	—
1346	Hordeum Jubatum, Orge à épi en crinière. Ann. 0m60. Décor. G	2 00	—	—
1347	Lagurus ovatus, Gros Minet. Ann. H. 0m40. Pelotes soyeuses. G	1 50	—	—
1351	Pennisetum Ruppellianum. Ann. 1 m. Gracieux épis violacés. G	2 50	—	—
1355	Stipa pennata (plumeux). Viv. 0m50. Minces épis argentés. G	4 00	—	—

POIS DE SENTEUR EN VARIÉTÉS SÉPARÉES.


Pour les amateurs de pois de senteur, nous avons choisi quelques belles nouveautés parmi les plus remarquables de l'année. Nous avons ensuite dressé une liste idéale des pois de senteur en prenant, dans chaque teinte, la variété considérée comme la meilleure par la « National Sweet Pea Society ». La collection ainsi obtenue réunit les 30 principales teintes, chacune représentée par son spécimen le plus parfait.

NOUVEAUTÉS POUR 1932.

	Paquet
1490 Ambition, beau lavande profond, plus foncé encore à la base	9 00
1491 Amy Johnson, vieux rose ombré de saumon	9 00
1492 Derby Day, riche cramoiisi brillant et velouté.	9 00
1493 Kathleen Wiltshire, lavande clair à reflet de satin.	13 50
1494 Mayfair, fond blanc richement coloré de rose saumoné.	9 00
1495 Patriot, crème délicatement ombré de rose pur	9 00

CHOIX DE BELLES VARIÉTÉS.

1525 Les 30 variétés ci-après. Choix superbe de teintes merveilleuses. La collection: Frs. 88 00	
1527 Amethyst (1931), bleu d'améthyste clair. Très large.	5 00
1528 Ascot (1929), beau rose clair	2 50
1529 Avalanche, blanc de neige	2 50
1532 Beata (1930), rose vif saumoné	2 50
1534 Beauty (1931), joli rose rougisant. Plante vigoureuse	4 00
1540 Captain Blood (1931), rouge sang légèrement cuivré.	5 00
1544 Chieftain, mauve pur, satiné	2 50
1550 Damask Rose (1931), rose pur à reflet carmin	5 00
1556 Flaming June (1929), écarlate.	2 50
1557 Flamingo (1929), géranium.	2 50
1560 Fortune, bleu foncé profond	2 50
1572 Huntsman (1928), écarlate vif.	2 50
1576 International (1929), mauve rosé.	3 00
1578 Ivory Picture, superbe ivoire	2 50
1581 Jack Hobbs (1928), crème rosé	2 50
1582 Laddie (1931), crème ombré d'abricot rosé	5 00
1584 Lilac Queen, lilas rosé.	5 00
1586 Mammoth, écarlate orangé.	2 50
1589 Mrs. A. Searles (1928), cerise ombré rouge Orient. Superbe	2 50
1595 Olympia (1928), pourpre unique.	3 00
1597 Orange Picture, orange pur.	3 00
1600 Pinkie (1928), rose vif et pur	2 50
1601 Porcelain, lavande clair	3 00
1602 Powerscourt, lavande pur	2 50
1607 Royal Pink, rose orangé.	2 50
1618 Splendour, marron-rouge clair	2 50
1623 Sybil Henshaw, cramoiisi vif	3 00
1631 The Sultan, marron-noir.	3 00
1644 What Joy, le plus joli crème	2 50
1646 Youth, blanc bordé de rose vif	2 50



Pois de senteur de notre collection.

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS.

Ces collections contiennent, pour chaque fleur, 4, 8 ou 12 teintes bien différentes et très brillantes. Elles permettront de jolis contrastes et de beaux effets de coloris en gammes.

	4 var.	8 var.	12 var.
1677 Capucine grande	4 00	7 00	10 00
1679 — naine	4 00	7 00	10 00
1685 Giroflée quarantaine à grande fleur.	8 00	15 00	22 00
1695 Immortelle monstrueuse double	4 00	7 00	—
1700 Muflier à grande fleur (Gueule de lion)	4 00	7 00	10 00
1704 Œillet perpétuel géant double (race Guillaud).	6 00	11 00	—
1705 Pavot double des jardins	4 00	7 00	—
1709 Pensée anglaise.	5 00	9 00	13 00
1730 Reine Marguerite pivoine Perfection.	6 00	11 00	16 00
1735 — naine à fleur de chrysanthème	6 00	11 00	16 00
1745 Zinnia élégant double	5 00	9 00	13 00

ASSORTIMENTS DE GRAINES DE FLEURS ANNUELLES.

Voici trois assortiments de graines de fleurs qui réunissent les principales espèces à semer suivant que vous disposez de peu ou de beaucoup de place. Toutes ces espèces, choisies parmi les plus florifères et les plus rustiques, feront la beauté de vos parterres et vous donneront, pour embellir votre demeure, une profusion de fleurs éclatantes et parfumées.

Ces assortiments, emballés d'avance, sont indivisibles, et nous ne pourrions y faire aucun changement. Evidemment, vous pourrez faire ajouter à l'envoi d'autres articles du catalogue.

1750 Pour petit jardin: 14 espèces et variétés. Fr. 27 00


CORBEILLES	FLEURS COUPÉES	BOUQUETS SECS
1064 Muflier nain.	906 Chrysanth. à car.	1171 Pied d'alouette.
1081 Œillet de Chine.	961 Giroflée 40".	1219 Reine Marguerite.
1165 Phlox de Dr. nain.	1062 Muflier à g ^{re} fleur.	1225 Réséda odorant.
1288 Tagète Lég. d'Honn.	1085 Œillet de Heddewig.	1320 Zinnia élégant.
		1010 Immortelle.
		1281 Statice annuel.

1752 Pour jardin moyen: 27 espèces et variétés Fr. 46 00

CORBEILLES	FLEURS COUPÉES	BOUQUETS SECS
889 Capucine naine.	903 Centaurée Impér.	1171 Pied d'alouette.
1064 Muflier nain.	906 Chrysanth. à car.	1182 Pois de senteur.
1081 Œillet de Chine.	917 Clarkia élégante.	1219 Reine Marguerite.
1165 Phlox de Dr. nain.	945 Eschscholtzia.	1225 Réséda odorant.
1210 Reine-Marg. naine.	961 Giroflée 40".	1276 Soleil.
1285 Tabac blanc.	990 Gypsophile élég.	1280 Souci des jardins.
1288 Tagète Lég. d'Honn.	1062 Muflier à g ^{re} fleur.	1320 Zinnia élégant.
	1085 Œillet de Heddewig.	
		1010 Immortelle.
		1233 Rhodanthe.
		1281 Statice annuel.
		1335 Agrostis (gram.).
		1340 Briza (graminées).

1754 Pour grand jardin: 51 espèces et variétés Fr. 80 00

CORBEILLES	FLEURS COUPÉES	BOUQUETS SECS
807 Agératum nain bleu.	804 Adonide d'été.	1062 Muflier à g ^{re} fleur.
845 Balsamine Camélia.	901 Centaurée Barbeau.	1079 Nigelle de Damas.
889 Capucine naine.	903 Centaurée Impér.	1085 Œillet de Heddewig.
1026 Lobelia Crystal P.	905 Chrysanth. des jard.	1110 Pavot des jardins.
1064 Muflier nain.	906 Chrysanth. à car.	1171 Pied d'alouette.
1081 Œillet de Chine.	917 Clarkia élégante.	1182 Pois de senteur.
1165 Phlox de Dr. nain.	927 Coréopsis hybride.	1219 Reine Marguerite.
1183 Pois de sent. nain.	945 Eschscholtzia.	1225 Réséda odorant.
1188 Pourpier.	950 Gaillarde picta.	1246 Salpiglossis.
1210 Reine-Marg. naine.	953 Gaura Lindheim.	1249 Scabieuse des jard.
1285 Tabac blanc.	961 Giroflée 40".	1254 Schizanthus varié.
1288 Tagète Lég. d'Honn.	982 Godetia Whitneyi.	1276 Soleil.
1290 Tagète signata.	990 Gypsophile élég.	1280 Souci des jardins.
1321 Zinnia nain.	1021 Lin à grande fleur.	1320 Zinnia élégant.
	1035 Lupin annuel.	
		800 Acroclinium rose.
		825 Amarantoïde.
		828 Ammobium alatum.
		1010 Immortelle.
		1233 Rhodanthe.
		1281 Statice annuel.
		1335 Agrostis (gram.)
		1340 Briza (graminées).



INSECTICIDES.

Carbolineum soluble. — Insecticide d'hiver. — Le grand destructeur du puceron lanigère, contre lequel on l'emploie même en été. Le ministère de l'agriculture le recommande aussi contre les autres pucerons, le kermès, gale du poirier, araignée rouge, cochenille du pêcher, érinose du groseillier, chancre. Egalement à employer contre la pyrale, la plupart des chenilles, anthonomes, tavelure, monilia.

Mode d'emploi: Pulvérisation et badigeonnages en hiver, surtout du 1^{er} au 15 mars.

Dose: 5 à 7 kgs. par 100 litres d'eau.

Prix: le bidon de 1 kilo fr. 9.00
le bidon de 5 kilos fr. 35.00

Réol. — Insecticide d'été, très puissant. — Détruit les parasites les plus résistants: thrips, pucerons verts, galéruques, etc. Sans danger pour les plantes, fleurs et fruits. Inoffensif pour l'homme et les animaux. Livré en ampoules scellées.

Mode d'emploi: Solution très diluée pour pulvérisations, arrosages ou trempage des végétaux atteints.

Prix: Boîte de 6 ampoules de 2 cc. permettant chacune de préparer 2 l. de solution fr. 16.00
» 6 » 5 cc. » » » 5 l. » fr. 25.00
» 6 » 10 cc. » » » 10 l. » fr. 35.00

Tabac en poudre. — Egalement efficace pour détruire les pucerons et l'altise.

Mode d'emploi: Le répandre, le matin, un jour de rosée, ou, mieux, après une pulvérisation au Réol ou à l'eau très savonneuse.

Prix: le kil., fr. 1.50. Les 5 kil., fr. 6.00

Taupicine. — Poussière fine pour empoisonner les taupes. D'une efficacité absolue et d'un emploi extrêmement simple. Une notice est jointe à chaque flacon Le flacon fr. 15.00

PRODUITS ANTI-CRYPTOGAMIQUES.

Bouillie bordelaise en poudre. — Combat avec succès le mildiou de la vigne, les maladies des pommes de terre et des tomates et la tavelure des arbres fruitiers.

Mode d'emploi: Versez lentement 1 1/2 à 2 kg. de bouillie dans 100 l. d'eau froide, en agitant avec un bâton. Ependre au moyen de pulvérisateur, seringue ou brosse.

Prix: Le kil., fr. 7.00

Soufre noir nicotinisé. — Contre l'oidium de la vigne, le blanc des pois, rosier et chrysanthèmes.

Mode d'emploi: Soufrages successifs à 2 ou 3 jours d'intervalle, par temps calme et sec.

Prix: Le kil., fr. 4.00; 5 kil., fr. 17.00

DIVERS.

Etiquettes en bois pour arbres, avec fil de fer Le mille, fr. 40.00; le cent, fr. 4.50

Etiquettes en bois à fiche (pointues) » 36.00; » fr. 4.00

Etiquettes en zinc, fortes, avec fil galvanisé » 100.00; » fr. 12.00

Encre pour étiquettes en zinc, inaltérable Le flacon, fr. 4.00

Mastic pour greffer à froid, de qualité supérieure:

La boîte de 100 gr., fr. 4.00; la boîte de 200 gr., fr. 7.00; la boîte de 500 gr., fr. 15.00

Pulvérisateur « Idéal », permettant plus de 100 pulvérisations pour un litre de liquide et la projection à plusieurs mètres d'un véritable nuage qui pénètre partout. Pour la projection des insecticides: pour blanchir à la chaux et peindre au carbolineum les barrières, etc.

Prix: pulvérisateur 2 litres, cuivre nickelé, avec une rallonge en laiton dur et une seconde en cuivre malleable se couplant pour atteindre les endroits difficiles fr. 150.00

Seringue, pour la projection des insecticides fr. 65.00

Raphia du Japon, extra, pour ligatures: 100 kil., fr. 1.800.00; kil., fr. 20.00; 100 gr., fr. 3.00

Le Jardin potager, traité de culture maraîchère, par Charles Chevalier fr. 7.50

Le Jardin d'agrément, traité de floriculture, par Charles Chevalier fr. 7.50

La culture des fruits, traité d'arboriculture fruitière, par Charles Chevalier fr. 7.50

ENGRAIS CONCENTRÉ POUR ARROSAGES.

Dosage garanti pour cent: Azote ammoniacal: 8; Azote nitrique: 5; Acide phosph. sol. citrate: 9; Potasse pure: 10; Manganèse: 0.15; Oxyde de zinc: 0.02.

Mode d'emploi: Arroser les plantes en pots tous les dix jours avec une solution de 2 gr. par litre d'eau; mélanger 4 grammes par kilog. de terreau pour les repotages et surfaçages (un godet contenant 2 gr. se trouve dans chaque boîte).

En outre, d'une manière générale, chaque fois que l'on désire augmenter la vigueur d'une plante cultivée, que ce soit un légume, une plante à fleur, un arbre ou un rosier, l'arroser de temps à autre avec la dissolution à 2 gr. de cet engrais éminemment actif.


Prix: la boîte de 100 gr. (pour 50 litres d'eau). fr. 3.00

» 250 gr. » 125 » » fr. 5.00

» 500 gr. » 250 » » fr. 7.00

» 1 kg. » 500 » » fr. 10.00

» 2 1/2 kg. » 1.250 » » fr. 17.00



LES SEMIS DES PRAIRIES ET DES PELOUSES.

On sème de préférence en avril-mai. On peut aussi semer du 15 août à fin septembre, mais les grands froids sont parfois néfastes à ces semis, à moins de les couvrir légèrement de fumier long. Ratisser ou herser, puis baller ou rouler énergiquement.

Les graines lourdes tombant au fond du sac, bien remuer le mélange avant de semer.

Pour les prairies temporaires on ajoute souvent 5 kg. de minette ou 3 kg. de trèfle blanc par hectare. Pour les prairies à faucher et pâturer, on peut ajouter 3 à 5 kg. de trèfle violet ou 15 à 20 kg. de sainfoin par hectare. Pour les pâtures permanentes, on sème parfois, après les graminées, 3 à 5 kg. de trèfle violet ou 2 à 3 kg. de trèfle blanc. Enfin, pour les gazons d'agrément, on peut semer, après les graminées, une légère dose (1 kg. par hectare) de trèfle blanc.

LES ENGRAIS A EMPLOYER.

Création. — Incorporer au sol, par le labour, 500 à 600 kg., par are, de fumier bien décomposé. Avant le hersage, épandre, par are, un mélange de 3 kg. sulfate d'ammoniaque, 7 kg. superphosphate et 2 kg. sulfate de potasse.

Entretien. — En février-mars, semer, par are, après avoir hersé ou ploutré la prairie, un mélange de 2 kg. sulfate d'ammoniaque, 3 kg. superphosphate et 1 kg. sulfate de potasse.

En été, arroser les pelouses, une fois par mois, avec notre engrais concentré (voir page 41) ou avec une solution de 20 gr. de sulfate d'ammoniaque par 10 litres d'eau; autant dire les « puriner », mais avec un liquide inodore et inoffensif ayant cependant les mêmes propriétés que l'engrais naturel.

LE SEMIS D'UNE PATURE DANS AVOINE.

En grande culture, il est d'usage de semer, en même temps que les graminées, de l'avoine qui constituera une récolte supplémentaire.

Cette façon de procéder est discutable, surtout lorsqu'il s'agit d'établir une pâture permanente. Certes, si l'été est sec, l'avoine protégera les jeunes graminées. Mais elle en étouffera beaucoup aussi. Ensuite on sera empêché de donner à la prairie les engrais dont elle a besoin, sous peine de voir l'avoine verser avant la récolte, en étouffant sous elle les meilleures des jeunes graminées.

En conséquence, si l'on adopte le semis de graminées dans l'avoine, on devra admettre qu'il est inutile, si l'on veut réellement constituer une bonne prairie, de songer à faire en même temps une récolte pleine d'avoine. La prairie aurait dû être semée seulement avec les premières betteraves; on attendra donc que le sol soit bien réchauffé, sans hésiter à dépasser la date extrême pour l'avoine. Malgré cela, on la sèmera très claire, après avoir préparé la terre bien plus soigneusement que d'habitude. Ensuite, il faudra rouler, puis épandre les graminées en ayant soin de les mélanger très souvent. Donner un coup très léger de herse pour enterrer un peu la graine sans faire de sillon. Puis rouler très bien.

On évitera ainsi de perdre les plus nutritives des graminées, dont la semence a coûté si cher.

NOS QUATRE MÉLANGES DE QUALITÉ EXTRA.

Loin d'essayer de les vendre bon marché, nous cherchons à obtenir une qualité réellement supérieure. Trop de mélanges du commerce sont en effet sans grande valeur, soit qu'on les compose presque exclusivement de graminées grossières (houque, brôme, etc.), ou temporaires (ray-grass), soit que les espèces vivaces employées aient une pureté médiocre. Nos mélanges, au contraire, contiennent d'abord une série de graminées à développement immédiat, ensuite la meilleure qualité des plus belles espèces vivaces, qui prendront la place des premières après la troisième année.

Nous prions nos clients de nous indiquer la nature exacte du terrain à ensemençer: 1. S'il est sec, moyen ou humide; 2. S'il est argileux, d'alluvion, calcaire, pierreux sablonneux, léger ou compact; 3. S'il est en plaine, en pente, à l'ombre, etc.

MÉLANGES PRÉPARÉS POUR PRAIRIES ET GAZONS

1. MÉLANGES DE PREMIÈRE QUALITÉ.

	100 k.	Kilogr.	500 gr.	250 gr.	Quant. à semer à l'hect.
1759 Mélange pour prairies et pâtures temporaires (un ou deux ans)	740	8 00	4 60	2 80	60
1764 — pour prairies permanentes à faucher et, accessoirement, à pâturer.	1000	11 00	6 00	3 50	70
1770 — pour pâtures permanentes: prairies à pâturer seulement	1000	11 00	6 00	3 50	70
1775 — pour gazons d'agrément, pelouses fines, tapis, terrains de sports	1200	13 00	7 00	3 70	120

2. MÉLANGE DE QUALITÉ ORDINAIRE.

1777 Mélange pour prairies à faucher et pâturer, bonne germination	740	8 00	4 60	2 80	100
--	-----	------	------	------	-----

GRAMINÉES POUR PRAIRIES ET GAZONS.

	100 kg.	Kilogr.	Quant. à semer à l'hect.
1811 Agrostis traçant (<i>Agrostis stolonifera</i>), vivace. Tardif. Pour sols frais	3000	33 00	60
1814 Brôme des prés (<i>Bromus pratensis</i>), vivace. Pour sols très mauvais	1100	12 00	10
1815 — mou (<i>Bromus mollis</i>), vivace. Pour sols arides et secs. . . .	340	3 70	60
1822 Crételle des prés (<i>Cynosurus cristatus</i>), vivace. Excellente pâture.	2000	21 00	28
1824 Dactyle pelotonné (<i>Dactylis glomerata</i>), vivace. La meill. à faucher.	1000	11 00	50
1826 Fétuque des prés (<i>Festuca pratensis</i>), vivace. Craint la sécheresse.	1100	12 00	12
1829 — durette (<i>Festuca duriuscula</i>), vivace. Pour sols pauvres et frais	1400	15 00	12
1830 — ovine (<i>Festuca ovina</i>), vivace. Pour sols sablonneux et secs .	1800	19 00	40
1832 Fléole des prés (<i>Phleum pratense</i>), vivace. Pâtures temporaires . .	920	10 00	18
1835 Flouve odorante de Puel, annuelle. Tendre, courte, hâtive. Sols secs	1000	11 00	40
1838 Fromental (<i>Avena elatior</i>), vivace. Tr. haut, résistant à la sécheresse	2100	23 00	100
1840 Houque laineuse (<i>Holcus lanatus</i>), vivace. Sols sablonn. et tourbeux	340	3 70	50
1845 Pâturin des prés (<i>Poa pratensis</i>), vivace. A fauch. et extra pr paturer	2000	21 00	20
1850 Ray grass anglais (<i>Lolium perenne</i>). Herbe basse, à faucher et pât.	600	6 50	60
1851 — anglais, surchoix, Ray-grass extra pur, bien trié, superbe . .	600	6 50	60
1852 — de Pacey, très fin, extra. Gazon fin pr pelouses fines et tapis	700	7 50	100
1854 — d'Italie (<i>Lolium italicum</i>), bisannuel. A faucher, productif .	600	6 50	60
1858 Vulpin des prés (<i>Alopecurus pratensis</i>), vivace. Sols ombreux, hum.	3400	37 00	25

BETTERAVES.

Pour avoir de bons rendements en betteraves, incorporer au sol par un labour, avant ou pendant l'hiver, 300 à 400 kg. de fumier par are. Enterrer, par are, au labour de printemps, 6 à 8 kg. de superphosphate et 2 à 3 kg. de sulfate de potasse. Quinze jours avant le semis, appliquer 5 kg. de nitrate de soude, puis extirper ou herser fortement. Si un supplément d'azote est nécessaire dans le cours de la végétation, on le donnera, avant un binage, sous forme de nitrate de soude à la dose de 1 kg. par are.

Plantes voraces, supportant des doses massives d'engrais, les betteraves fourragères, si on les cultive comme nous l'indiquons, donneront des rendements étonnants.

1. BETTERAVES FOURRAGÈRES.

	100 kg.	Kilogr.	500gr.	250gr.
1939 Betterave rouge, longue, géante Mammouth. Hors terre. . . .	920	10 00	5 40	3 00
1941 — rouge géante ovoïde d'Eckendorf. Hors terre. Rustique .	1000	11 00	6 00	3 20
1942 — jaune géante ovoïde d'Eckendorf. Se conserve bien . . .	1000	11 00	6 00	3 20
1945 — jaune géante de Vauriac. Enorme. Arrachage facile . . .	1000	11 00	6 00	3 20
1949 — blanche longue, à collet vert. Terres fortes et fraîches .	920	10 00	5 40	3 00

2. BETTERAVES DEMI-SUCRIÈRES.

1951 Betterave rose géante, demi-sucrière, fourragère (collet rose) .	920	10 00	5 40	3 00
1952 — blanche géante, demi-sucrière, fourragère (collet vert) .	920	10 00	5 40	3 00

3. BETTERAVES SUCRIÈRES.

1955 Betterave sucrière, Elite de Zahn. La meilleure	820	9 00	5 00	3 00
--	-----	------	------	------

GRAINES ÉCONOMIQUES. Prix variables.

	100 kg.	Kilogr.	Quant. à semer à l'hect.
1959 Lupuline ou Minette (trainard), bisannuelle. Luzerne du sol pauvre	920	10 00	20
1961 Luzerne de Provence, surchoix extra, gros grain, sans cuscute. . .	1500	16 00	20
1969 Moutarde blanche, annuelle. Fourrage vert. Excellent engrais vert.	740	8 00	15
1981 Sainfoin à deux coupes, vivace. Sols maigres. Engrais et fourrage.	740	8 00	150
1982 Sarrasin ou bouquette, annuel. Fourrage vert. Excellent pour l'été.	340	3 70	70
1991 Trèfle violet surchoix extra, gros grain. Fourrage de base, vert et sec	1600	17 00	25
1994 — blanc nain (coucou blanc), vivace. Pâturages excellents. . . .	2600	27 00	12
1997 — hybride vert, vivace. Fourrage des sols froids et humides . .	1400	15 00	10
2000 — incarnat hâtif, farouche (trèfle de France). Fourr. Engrais vert	740	8 00	25
2004 Vesce commune de printemps. Fourrage vert, en mai-juin	340	3 70	200



1. A FLORAISON ESTIVALE.

Livrables de novembre en avril.		Le cent	Les dix	Les cinq	Pièce
2500	Anémone simple, en mélange	28 00	3 20	1 80	—
2501	— double, en mélange, premier choix.	36 00	4 00	2 20	—
2502	— double Hortensis, rouge vif.	56 00	6 00	3 20	—
2503	— double, à fleur de chrysanthème, en beau mélange	36 00	4 00	2 20	—
Les anémones fleurissent en juin. On doit les planter avant le 15 mars.					
2510	Bégonia tubéreux simple, à grande fleur, en mélange.	44 00	5 00	2 80	—
	— tubéreux simple, à gde fleur, couleurs séparées ci-après:	48 00	5 40	3 00	1 00
	2511 rouge vif. 2513 blanche. 2515 orange.	—	—	—	—
	2512 rose. 2514 jaune. 2516 cuivrée.	—	—	—	—
2517	Bégonia tubéreux simple, à grande fleur cristata, en mélange	60 00	6 50	3 50	1 00
2518	— tubéreux simple, à grande fleur papillon, en mélange	60 00	6 50	3 50	1 00
2528	— tubéreux double, à grande fleur, en mélange.	48 00	5 40	3 00	1 00
	— tubéreux double, à gde fleur, couleurs séparées ci-après:	56 00	6 00	3 20	1 00
	— 2529 rouge vif. 2531 blanche. 2533 orange.	—	—	—	—
	2530 rose. 2532 jaune. 2534 cuivrée.	—	—	—	—
2535	Bégonia tubéreux double, à grande fleur cristata, en mélange	68 00	7 50	4 00	1 10
2536	— tubéreux double, à grande fleur papillon, en mélange	64 00	7 00	3 70	1 00
2537	— tubéreux double, à grande fleur fimbriata, en mélange.	60 00	6 50	3 50	1 00
2540	Glaïeul hybride Childsi, race américaine, compacte, à gr. fl.	36 00	4 00	2 20	—
2541	— hybride Brenchleyensis, petites fl. écarlates. Très joli	36 00	4 00	2 20	—
2542	— hybride Lemoinei, choix extra. Fleurs à grandes taches	36 00	4 00	2 20	—
2543	— hybride Gandavensis. Beaux croisements des 3 précéd.	36 00	4 00	2 20	—
	— hybride à grande fleur, variétés séparées ci-après:	48 00	5 40	3 00	1 00
2544	Anmut, rose saumoné. 2556 Loveliness, crème.	—	—	—	—
2546	Baron Hulot, mauve rosé. 2558 Maréchal Foch, rose pâle.	—	—	—	—
2548	Empress of India, grenat. 2559 Master Wietse, lie de vin.	—	—	—	—
2550	Golden West, orange feu. 2561 Mr Mark, gris acier.	—	—	—	—
2552	Jacoba Van Beieren, rose, 2563 Sapho, feuille morte pâle.	—	—	—	—
	carthame. 2565 White Giant, blanc pur.	—	—	—	—
2554	Liebesfeuer, beau rouge 2567 Yellow Hammer, jaune vif.	—	—	—	—
	coquelicot. 2568 Yvonne, blanc rosé.	—	—	—	—
Corbeilles de toute beauté. Superbe fleur coupée. Planter en avril-mai.					
2570	Gloxinia, en beau mélange, choix extra	60 00	6 50	3 50	1 00
Empotez des bulbes de gloxinias en février, en terre de bruyère. Rempotez une fois ou deux et vous aurez, de juillet à septembre, de merveilleuses plantes de serre, et même d'appartement.					
2576	Lis blanc (candidum), fleurs très odorantes en juin	—	19 00	10 00	2 50
2579	— tigrinum, à fleur double, extra	—	27 00	15 00	3 50
Superbes plantes, très décoratives, les lis viennent dans toute bonne terre de jardin (voir nos photographies de lis tigrinum, en couverture du présent catalogue). Planter à 15 cm. de profondeur. Floraison en juin. On peut laisser les bulbes en terre pendant 3 ou 4 ans sans les diviser.					
2582	Montbretia crocosmiaeflora, rouge orange, très vif.	24 00	2 80	1 60	—
2585	— crocosmiaeflora aurea, jaune d'or	28 00	3 20	1 80	—
Pour plates-bandes et fleurs coupées. Planter de fin mars à fin mai.					
2590	Renoncule asiaticus superbissimus, double, en beau mélange.	20 00	2 20	1 30	—
Voir aussi Cannas, Dahlias et Iris, page 60.					

2. A FLORAISON PRINTANIÈRE, A PLANTER AVANT L'HIVER.

Ces splendides fleurs de printemps que sont les crocus, jacinthe, jonquille, muguet, narcisses, perce-neige et tulipe doivent se planter en octobre-novembre. Les bulbes sont donc livrables seulement de septembre à fin novembre. Les clients qui en désirent sont priés de nous demander nos prix spéciaux à cette époque.



QUELS ARBRES FAUT-IL PLANTER DANS UN PETIT JARDIN?


Il faut choisir, parmi les arbres qui ne prennent pas trop de place, les variétés les plus productives.

Si vous disposez d'un mur exposé à l'est ou à l'ouest, vous pourrez y créer des espaliers d'abricotiers, de pêchers et de poiriers. S'il est exposé au sud, vous donnerez surtout la préférence aux quelques exquises variétés de poires qui mûrissent après le nouvel-an et qui exigent cette exposition privilégiée. Au nord, vous cultiverez des framboisiers, groseilliers ou cerisiers Griotte du Nord.

Les très hauts murs seront garnis, en dessous, d'espaliers basses tiges, et, au dessus, de hautes tiges. Le long des sentier, vous pourrez planter des poiriers en cordons horizontaux et surtout en contre-espaliers. Ces cordons et ces contre-espaliers doivent être, de préférence, dirigés du nord au sud.

En plein vent, vous planterez le poirier en pyramides distantes de 4 à 5 m., en fuseaux distants de 2 m., ou en vases distants de 3 à 4 m. Le pommier se cultivera de préférence en buissons greffés sur paradis et distants de 3 à 4 m.; les cerisiers et pruniers en hautes tiges ou buissons. Aux endroits exposés au nord, vous planterez des cerisiers Griotte du Nord et quelques groseilliers et framboisiers.

Enfin, si vous désirez masquer quelque recoin du jardin, faites un rideau de noisetiers qui vous donneront, avec un feuillage touffu et décoratif, un des meilleurs fruits d'arrière-saison.



Cordon.




Buisson




Pyramide



Espalier 1 étage



Haute tige



Haute tige espalier

COMMANDE.

Spécifiez s'il s'agit de hautes ou de basses tiges. Sauf avis contraire, nous remplacerons les variétés épuisées par des variétés d'égale mérite et de maturité analogue. De même, les variétés non disponibles en espaliers seront fournies en bonnes greffes de deux ou trois ans, dont on fera aisément des formes palissées. Enfin, les variétés épuisées en buissons seront livrées en cordons.

RÉCEPTION ET PLANTATION.

La reprise des plantes dépendra avant tout des soins qui leur auront été donnés à l'arrivée. Occupez-vous en tout de suite et surtout préservez-les des courants d'air, du soleil et du froid.

Si les envois ont été surpris par les gelées, mettez-les en cave pendant plusieurs jours sans les déballer. Si les gelées persistent, déballez, arrosez et maintenez une bonne humidité aux racines et même aux branches, au moyen de sacs humides. Enfin, si, par suite d'un transport trop long, l'écorce des plantes était ridée ou crevassée, enterrez-les presque complètement, à l'ombre, et maintenez une bonne humidité.

Lorsque les pluies empêchent de planter les arbres ou arbustes dès leur arrivée, mettez-les en jauge (tranchée); celle-ci doit être ouverte assez large et assez profonde pour recevoir et abriter, sans les blesser, toute les racines. Evitez tout enchevêtrement de celles-ci.

Avant la plantation, défoncez le sol à 0 m. 60 de profondeur et sur une surface minimum de 1 m. 50 x 1 m. 50. Enfouissez dans le fond un compost (mélange de chaux, de gazon ou de débris de jardin). Ajoutez du fumier, des engrais phosphatés et potassiques et, si possible, des déchets de laine. Remarquez que la chaux est nécessaire aux arbres à fruits à noyau. De même, le fumier de ferme est indispensable. Mais les engrais et le fumier ne devront jamais venir en contact avec les racines.

Habillez celles-ci, c'est-à-dire taillez nettement à la serpette toutes les extrémités, pour provoquer la formation d'un bon chevelu. Pralinez-les avec un mélange de deux tiers d'argile et un tiers de bouse de vache, auquel vous ajoutez de l'eau, de façon à former une bouillie assez épaisse. Placez les arbres sur une petite butte pour que la greffe soit hors terre. Ayez soin, en les recouvrant, de secouer le sujet afin que la terre pénètre bien dans tous les vides et de bien affermir le sol.

Si vous plantez avant l'hiver, protégez le pied des arbres par un paillis que vous enlèverez au printemps, car il empêcherait le réchauffement de la terre. Vers le 1^{er} mai, remettez un nouveau paillis, destiné, cette fois, à conserver au sol sa fraîcheur.

REPRISE.

Nous mettons tout notre soin à ne fournir que des arbres, arbustes et plants de premier choix, vigoureux, bien enracinés et emballés de façon à supporter aisément le transport.

Il nous est malheureusement impossible d'en garantir la reprise, car, dans toute transplantation, il y a évidemment un risque: la plante doit fournir un effort considérable pour se remettre à végéter et n'y réussit pas toujours. Aussi, nous ne pourrions assez vous recommander de suivre scrupuleusement les conseils ci-dessus et les conseils spéciaux donnés à chaque chapitre. De cette façon vous réduirez au minimum le pourcentage de déchet que laisse inévitablement toute plantation.

ABRICOTIERS.

Basses tiges: buissons, fr. 12 00; espaliers, fr. 16 00. — Hautes tiges: fr. 30 00.
Du Chancelier, fruit gros, coloré, de première qualité. Fertile
Pêche de Nancy, fruit gros, exquis, d'amateur et de marché, hors ligne
Précoce d'Esperen, fruit moyen, juteux, très bon; vig.; pour amateurs.
Royal, fruit gros, très bon. Très fertile. D'amateur et de marché.

**Epoque
de la maturité**

fin juillet
mi-août
fin juillet
début août

CERISIERS.

Basses tiges: fr. 12 00; hautes tiges: fr. 22 00.

Abbesse de Mouland, fruit assez gros, noir; la meilleure des abbeses.
Bigarreau rose d'Espagne, fruit très gros, rosé, savoureux, croquant
 — **noir**, fruit gros, très bon, de première qualité
Cerise Lemercier, fruit gros, acidulé, très bon
 — **Tôt ou tard**, fruit assez gros, excellent; très fertile, hors ligne
Griotte de Tihange, de Portugal, fruit assez gros, rouge, très bon; très fertile.
 — **du Nord**, fruit gros, acidulé, très juteux, extra pour confitures; très
 fertile; très bon espalier nord
Guigne Early Rivers, fruit gros, rouge rosé, très bon; fertile; le plus hâtif.

fin juillet
juillet
juillet
fin juillet
mi-juin
août
août-sept.
début juin

CHATAIGNIERS A MARRONS COMESTIBLES.

A gros fruits de Lyon Hautes tiges: fr. 30 00

COGNASSIERS.

De Portugal Basses tiges: fr. 12 00

FRAMBOISIERS.

A fruits rouges Les dix: fr. 16 00

A fruits jaunes Les dix: fr. 16 00

GROSEILLIERS ÉPINEUX.

	Les dix	Pièce
Grosse longue blanche	30 00	3 50
Monstrueuse d'Amérique.	30 00	3 50
Wynham Industry, énorme.	30 00	3 50

GROSEILLIERS A GRAPPES

	Les dix	Pièce
Cassis royal de Naples, noir	20 00	2 50
Cerise, rouge, extra.	20 00	2 50
Grosse transparente blanche.	20 00	2 50
De Hollande, rouge.	20 00	2 50
De Hollande, blanche.	20 00	2 50
Knight, rouge.	20 00	2 50
Versaillaise rouge	20 00	2 50

GROSEILLIERS TIGES

à grappes, Cerise rouge, extra	—	9 00
à gr. Transparente, blanche	—	9 00

NÉFLIERS.

A très gros fruits Basses tiges: fr. 14 00; Hautes tiges: fr. 25 00

NOISETIERS.

Aveline ou Lombardise, fruit gros, excellent, très hâtif fr. 4 60
Bergeri, fruit gros, oblong, très bon, de moyenne saison fr. 4 60
A feuilles et fruits pourpres, fruits de toute première qualité, abondants fr. 6 50

NOYERS.

Fertile de Chatenay, produisant extrêmement vite Hautes tiges: fr. 20 00

PÊCHERS.

Basses tiges: buissons, fr. 10 00; espaliers, fr. 16 00. — Hautes tiges: fr. 30 00.

Les variétés précédées d'un T sont les seules qui soient disponibles en hautes tiges.

T Amsden, assez gros, coloré, exquis; de commerce; espalier, buisson; fert.
Belle Beauce, grosse mignonne tardive, fr. gros, excell.; fert.; de marché.
Bon ouvrier, fruit assez gros, coloré, très bon; arbre très fertile
Brugnon Lord Napier, gros, très bon; de marché; espalier et buisson
 — **Galopin**, très bon; vigoureux; fruit de commerce.
 — **rouge Mont-Saint-Jean**, fruit gros, exquis. Fertile; bon buisson
Early Rivers, fruit moyen, savoureux, très bon; vigoureux, très fertile
Grosse mignonne hâtive, énorme, extra; de commerce; très fert.; buisson
Le Vainqueur, fruit gros, coloré, exquis; le plus hâtif.
Madeleine rouge, fruit gros, très bon. Vigoureux, fertile.
Précoce Alexandre, fruit savoureux; petits buissons et espaliers.
T Reine des Vergers, grosse, excellente; de commerce; très fert.; plein vent.
Rouge de mai, fruit moyen, très coloré, très bon; assez vigoureux.

**Epoque
de la maturité**

mi-juillet
mi-sept.
début oct.
fin août
début sept.
début sept.
fin juillet
début août
fin juillet-août
début sept.
juillet
mi-sept.
début juillet

POIRIERS.

Basses tiges: cordons, fr. 6 00; buissons et pyramides de 2 et 3 ans, fr. 11 00; espaliers 1 étage, fr. 15 00. — **Hautes tiges:** espalier et verger: fr. 20 00.

Les variétés reprises sous les rubriques « Hautes tiges, Espalier et Verger » sont les seules disponibles en hautes tiges.

1. — POIRIERS BASSES TIGES

Pyramides et buissons. — Sous la rubrique « Pyram. » sont rangées les bonnes variétés de basses tiges à cultiver en pyramides ou en buissons.

Espalier Sud. — Dans cette colonne, nous avons mentionné les excellentes variétés d'après nouvel an, qui ne donnent de résultats en espalier qu'à une exposition Est-Sud-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Sud-Ouest. Il est évident qu'à cette situation privilégiée, toutes les autres variétés d'espalier donneront aussi les meilleurs résultats.

Espalier Est. — Dans cette colonne figurent les variétés auxquelles l'exposition Sud n'est pas indispensable. Les variétés d'espalier Ouest y donneront évidemment aussi d'excellents résultats.

Espalier Ouest. — Ce sont les variétés venant bien au Sud-Ouest et à l'Ouest-Nord-Ouest.

Espalier Nord. — Seules, les trois variétés: Bon Chrétien William, Durondeau, et Louise Bonne d'Avranches donneront des produits passables au Nord-Est ou au Nord-Ouest. Quant aux murs exposés en plein Nord, il ne faut y planter que des cerisiers Griotte du Nord, groseilliers, etc.

Contre-espalier. — On mettra en contre-espalier les variétés indiquées aux colonnes Esp. O. et Esp. E., en réservant pour les variétés d'espalier Est une situation chaude et abritée. Les poires d'Esp. S. doivent être bannies du contre-espalier.

2. — POIRIERS HAUTES TIGES

Espalier. — Dans la colonne « Esp. » figurent les bonnes variétés que nous cultivons en hautes tiges d'espaliers, pour garnir les murs hauts. Il suffira, évidemment, de voir aux colonnes des basses tiges l'exposition à choisir.

Verger (Plein vent). — Enfin, les arbres désignés sous la rubrique « Verger » sont les meilleurs pour hautes tiges de plein vent, et sont disponibles en tiges extra.

VARIÉTÉS	GROSSEUR DU FRUIT	QUALITÉ DE LA CHAIR	MATURITÉ	VIGUEUR	A CULT. EN BASSES TIGES				HAUTES TIGES	
					Pyr.	Esp.E	Esp.S	Esp.O	Esp.	Verg.
Alexandrine Drouillard.	ass. gr.	tr. bonne	Nov.	ass. vig.	tr. b.	—	—	bon	—	—
Beau présent d'été	ass. gr.	juteuse	Août	ass. vig.	—	—	—	—	—	bon
Bergamote d'Esperen	ass. gr.	fond. suc.	Mars-Juin	vig.	peu	tr. b.	—	—	tr. b.	—
Beurré d'Amanlis.	ass. gr.	tr. bonne	Sept.	tr. vig.	ass. b.	—	—	tr. b.	tr. b.	tr. b.
— de Mérode	gros	bonne	Sept.	vig.	bon	—	—	bon	—	tr. b.
— d'Hardenpont	gros	très fine	Déc.-Janv.	vig.	—	extra	—	—	extra	—
— Diel, Magnifique	tr. gros	mi-fine	Nov.-Déc.	tr. vig.	ass. b.	extra	extra	—	extra	—
— Dumont	gros	fine suc.	Oct.-Nov.	vig.	bon	—	—	bon	—	—
— Giffart	moyen	très jut.	et Août	vig.	bon	—	—	ass. b.	—	—
— Hardy	gros	exquise	Oct.	tr. vig.	tr. b.	bon	bon	—	—	bon
Bon Chrétien William	gros	musquée	Sept.	vig.	extra	—	—	extra	extra	tr. b.
Calebasse à la Reine	ass. gr.	bonne	Sept.	tr. vig.	—	—	—	—	—	extra
Catillac, Gros Gillot	tr. gros	à cuire	Nov.-Déc.	vig.	—	—	—	—	—	tr. b.
Charles Ernest	gros	fine jut.	Nov.	tr. vig.	bon	—	tr. b.	—	—	—
Clapp's Favorite	gros	très fine	Août-Sept.	ass. vig.	tr. b.	—	—	bon	—	—
Colmar Dumortier	ass. gr.	très fine	Févr.	ass. vig.	bon	ass. b.	—	—	—	—
Colorée de Juillet	ass. gr.	mi-fine	Juill.-Août	ass. vig.	ass. b.	—	—	—	—	—
Comtesse de Paris	gros	tr. bonne	Déc.-Janv.	vig.	bon	—	bon	—	—	—
Conseiller à la Cour	gros	jut. bonne	Oct.	tr. vig.	bon	—	—	bon	—	bon
Doyenné d'hiver	tr. gros	tr. bonne	Janv.-Mai	ass. vig.	—	bon	—	—	—	—
Doyenné du Comice	gros	exquise	Nov.-Déc.	tr. vig.	tr. b.	—	tr. b.	ass. b.	—	—
Duchesse d'Angoulême	ass. gr.	bonne	Oct.-Nov.	ass. vig.	extra	—	—	bon	—	—
Durondeau de Tongres	gros	savoureuse	Oct.	vig.	extra	—	extra	tr. b.	extra	tr. b.
Joséphine de Malines	ass. gr.	exquise	Janv.-Avr.	vig.	ass. b.	tr. b.	—	—	tr. b.	—
Jules d'Airolles.	ass. gr.	très fine	Déc.-Janv.	vig.	tr. b.	tr. b.	bon	—	tr. b.	—
Lépipont	ass. gr.	tr. bonne	Nov.	ass. vig.	—	—	—	—	—	extra
Le Lectier	gros	tr. bonne	Déc.-Janv.	tr. vig.	ass. b.	tr. b.	—	—	bon	—
Louise Bonne d'Avranches	ass. gr.	extr. bonne	Sept.-Oct.	vig.	extra	—	—	extra	tr. b.	tr. b.
Marie Guisse	gros	jut. bonne	Fév.-Mars	ass. vig.	—	bon	—	—	—	—
Nec plus Meurice	gros	tr. bonne	Nov.-Janv.	ass. vig.	tr. b.	—	bon	—	—	—
Nouvelle Fulvie	ass. gr.	très fine	Déc.-Janv.	ass. vig.	—	extra	—	—	extra	—
Passé Colmar	ass. gr.	exquise	Déc.-Févr.	vig.	ass. b.	extra	—	—	—	—
Passé Crassane	ass. gr.	savoureuse	Janv.-Mars	peuvig.	—	extra	extra	—	extra	—
Président Drouard	gros	tr. bonne	Janv.-Mars	vig.	bon	tr. b.	—	—	—	—
Saint-Remy	gros	à cuire	Déc.	vig.	—	—	—	—	—	extra
Soldat Laboureur	ass. gr.	suc. bonne	Oct.-Nov.	vig.	bon	—	—	bon	—	—
Triomphe de Vienne	gros	savoureuse	Août-Sept.	ass. vig.	tr. b.	—	—	—	—	—
Williams Duchesse	tr. gros	bonne	Oct.-Nov.	tr. vig.	bon	—	—	bon	—	—
Zéphirin Grégoire	ass. gr.	exquise	Nov.-Déc.	ass. vig.	bon	—	—	bon	—	—

POMMIERS BASSES TIGES.

Le pommier greffé sur *paradis* présente de grands avantages sur le pommier greffé sur *doucin*. Dans les terrains substantiels, il permet de former des cordons, fuseaux et surtout de magnifiques petits buissons, qui, au lieu de pousser à bois, restent trapus, fructifient dès les premières années et donnent des produits de toute beauté. Toutes les variétés ci-dessous sont disponibles en sujets greffés sur paradis.

Le *buisson* est la forme parfaite du pommier sur paradis. La taille en est des plus simples. Tailler les productions fruitières (brindilles) sur 3 ou 4 yeux. Raccourcir le prolongement des branches à 25 ou 30 centimètres.

Le *doucin* resté cependant le sujet idéal pour les terres sèches, pauvres ou trop calcaires, et, à cet effet, nous greffons aussi sur *doucin* les variétés précédées d'un D.


Cordons greffes sur paradis: fr. 6 00; greffés sur doucins: fr. 6 00.

Buissons greffés sur paradis: fr. 12 00; greffés sur doucins: fr. 12 00.

- D Belle de Boskoop**, assez grosse, jolie, exquise; très fert.; de marché; extra
Belle-fleur jaune, **Linneous pippin**, fruit assez gros, très bon; vig. et fert.
D Bismarck, fruit très gros, très bon; fertilité extraordinaire; hors ligne . . .
D Borowski, fruit gros, tendre, très bon; assez vigoureux, très fertile . . .
D Calville blanc d'hiver, à côtes, très gros, extra fin; esp. Sud uniquement.
D Cellini, fruit gros, excellent; vigoureux et fertile; très recommandable. . .
D Empereur Alexandre, fruit très gros, très bon; fertile; de commerce. . .
Gravenstein, fruit gros, exquis; très vigoureux et fertile; var. hors ligne.
London pippin, **Calville du Roi**, fr. assez gros, exquis; très fert.; espalier.
Reinette Beaumann, fruit gros, bon; vigoureux; très fertile . . .
 — de **Caux**, fruit assez gros, très bon; vigoureux; très fertile . . .
D — de **Chênée**, fruit gros, exquis; vig. et fert.; longue garde; hors ligne
 — de **Landsberg**, fruit gros, très bon; fertile; très recommandable . . .
 — **Descardre**, fruit gros, extra-bon; extra-fertile; variété hors ligne. . .
 — du **Canada**, fruit très gros, excellent; très fertile; de commerce . . .
 — **Reine des Reinettes d'Angleterre**, fruit exquis; très vig. et fertile . . .
 — **Royale d'Angleterre**, fruit très gros, extra-bon; vig.; très fertile . . .
D Sans Pareille de Peasgood, fruit très gros, coloré, très bon; très fertile. . .
D The Queen, fruit excellent; extrêmement fertile; de grand commerce . . .
D Transparente jaune, fruit assez gros, exquis. Très fertile. Hors ligne . . .
Transparente de Croncels, fr. assez gros, exquis; vig. et fert.; de commerce

Epoque
de la maturité

déc.-février
 déc.-mars
 oct.-janvier
 août-sept.
 déc.-mars.
 octobre
 oct.-nov.
 nov.-janvier
 février-mars
 déc.-janvier
 mars-avril
 déc.-mars
 déc.-février
 déc.-mars
 déc.-février
 oct.-déc.
 octobre
 nov.-déc.
 nov.-déc.
 juillet
 août-sept.



Reinette Descardre.

Franc bon pommier.

POMMIERS HAUTES TIGES

Disponibles en fortes tiges. La pièce: fr. 18 00.

	Epoque de la maturité
Belle de Boskoop, fruit assez gros, très joli; exquis; très fertile; de marché.	déc.-février
Belle-fleur d'hiver, fruit assez gros, bon, surtout pour cuire. Vigoureux, fertile	déc.-juin
Bismarck, fruit très gros, de bon goût; fertilité extraordinaire.	oct.-janvier
Bon Pommier, petite belle-fleur, très fertile, assez petite, mais de longue garde	janv.-avril
Bon Pommier nouveau, Defourny, fruit gros, très bon. Vigoureux, très fertile	déc.-janvier
Brabant gris, fruit assez gros, extra-bon, vigoureux; fertile	nov.-février
Calville des vergers, Qucestresse, fruit moyen, très bon, de grand commerce .	oct.-janvier
Cellini, fruit gros, excellent; vigoureux; fertile; très recommandable. . . .	octobre
Court-pendu, fruit moyen, exquis. Vigoureux, fertilité variable. De marché . .	janv.-juin
Franc bon pommier, double belle-fleur, fruit gros, sucré, bon; arbre énorme.	déc.-avril
Gueule de mouton, fruit moyen, assez bon; arbres géants, très productifs. .	déc.-avril
Jacques Lebel, fruit très gros, très bon; fertilité extrême; très rustique. . .	oct.-nov.
Posson de France, fruit très gros, très lourd, bon à cuire; vigoureux et fertile	déc.-mai
Reinette de Chênée, fruit gros, exquis; vigoureux; très fertile; de bonne garde	déc.-mars
— de France, court-pendu de Tournai, fruit gros, exquis, très fertile. . .	janv.-mars
— Descardre, fruit gros, extra-bon; fertilité remarquable; hors ligne. .	déc.-mars
— étoilée, fruit très joli, rouge, moyen, exquis; grand arbre, très fertile.	oct.-déc.
Transparente Jaune, fruit moyen, exquis; fertile; recommandable.	juillet
Transparente de Croncels, fruit assez gros, exquis; arbre vigoureux, fertile.	août-sept.

PRUNIER

Basses tiges: fr. 12 00; hautes tiges: fr. 20 00.

Belle de Louvain, fruit violet, très gros, très hâtif; très vig.; de commerce.	juillet-août
Goutte d'or, fruit gros, allongé, jaune d'or, très bon. Vigoureux, très fertile. .	fin sept.
Kirker's Plum, fruit gros, sphérique, pourpre violet, extra-bon; vig. et fertile	août-sept.
Passe-abricot, fruit assez gros, sphérique, violet, très bon; très précoce . . .	août
Prune amer, fruit rond, rouge violet, extra-précoce; extrêmement fertile . .	juillet
Prune d'Altesse, fruit assez gros, rouge violet; très fert.; de grand commerce	septembre
Prune d'Altesse double, fruit allongé, violet foncé, excellent, fertilité soutenue	début sept.
Reine-Claude d'Altham, fruit gros, rosé; vig.; très fertile, de grand commerce	fin août-sept.
Reine-Claude dorée, crottée, fruit jaune d'or, exquis; très fertile; hors ligne .	début sept.
Reine-Claude violette, assez grosse, violet foncé, très bonne; très fertile. . .	début sept.
Victoria, fruit gros, rouge pourpre, assez bon; assez vig.; fertilité extrême. .	fin août

VIGNES.

Non livrables en France. — La pièce: fr. 10 00.

Vignes de serre.

Frankenthal, noir, grosse grappe allongée; très fertile; assez vig.; le meilleur	—
Alphonse Lavallée, noir, grappe très grosse, grain très gros, bon.	—
Chasselas de Fontainebleau, doré, exquis. Grappe allongée. Vigoureux, fertile .	—
Foster's White Seedling, blanc, grappe très grosse; vigoureux, fertile	—
Muscat d'Alexandrie, blanc; grosse grappe dorée; grain très gros; fertile . .	—
Gros Colman, noir bleuâtre; grosse grappe allongée; extra p ^r culture retardée	—
Black Alicante, noir foncé; pour culture retardée; le dernier	—

Vignes de plein air.

Saint-Laurent, noir; grappe courte, serrée, extra.	mi-août
Chasselas de Fontainebleau, doré, exquis. Grappe allongée. Vigoureux, fertile .	début sept.
Précoce de Malingre, blanc doré; grappe moyenne, serrée; assez vig., très fert.	mi-août



ROSIERS

NOTRE COLLECTION comprend les variétés de roses les plus méritantes, bien éprouvées à ce jour. Toutes les nouveautés sont essayées dans nos cultures, mais ne sont retenues que si elles joignent à une rusticité non critiquable, de réels mérites comme floraison, teinte, grandeur, port, etc.

Nos rosiers sont sains et vigoureux. En automne, ils sont arrachés, pralinés et mis en jauge, en remise, pour l'hiver.

Sauf avis contraire, nous remplaçons les variétés épuisées par d'autres d'égale mérite.

Les rosiers ne peuvent être arrachés pour l'expédition que lorsqu'ils ont à peu près complètement perdu leurs feuilles, ce qui n'arrive généralement qu'au début de novembre. Nous commençons donc les envois de rosiers vers le 10 novembre.

RÉCEPTION. — Si vous recevez votre commande en temps de gelée, mettez vos rosiers en cave, et laissez-les revenir à l'état normal; si vous en recevez dont l'écorce est ridée ou crevassée par suite d'un transport trop long, enterrez-les à peu près complètement à l'ombre et maintenez une bonne humidité soit par des arrosages, soit en recouvrant les branches d'un sac humide; de toute façon, avant de planter, trempez vos rosiers dans un pralin d'argile, bouse de vache et eau.

ENGRAIS. — La magnésie a un effet favorable sur les rosiers. Par contre, l'excès de potasse amène la chlorose. Il faudra donc épandre très tôt au printemps, par mètre carré, un mélange de 50 gr. nitrate de soude, 60 gr. superphosphate, 20 gr. sulfate de potasse et 30 gr. sulfate de magnésie.

PLANTATION. — Plantez les rosiers à exposition largement éclairée, bien ensoleillée et choisissez-leur le coin le plus argileux du jardin où la terre est bien franche, riche et fraîche. Distancez à 30-35 cm. les variétés faibles (polyantha, bengale, etc.), à 40-45 cm. les variétés de bonne vigueur, à 50-60 cm. les variétés très vigoureuses. Enterrez de quelques centimètres le collet des rosiers nains et *affermissiez bien* le sol pour qu'il soit en contact avec les racines.

HIVERNAGE. — Pour l'hiver, buttez le pied des rosiers B.T., ou bien recouvrez-les de terre légère ou de cendrées qu'il faudra nécessairement enlever en mars. Protégez la greffe des rosiers H.T., avec de la paille ou des copeaux de bois, et ligaturez le tout sans trop serrer.

TAILLE ET ENTRETIEN. — Les rosiers ne fleurissent bien que sur le jeune bois et doivent être taillés chaque année, *en commençant dès l'année de la plantation*. Enlevez le vieux bois ayant fleuri; ne gardez que 4 à 5 branches vigoureuses, jeunes, implantées très bas, tout près de la greffe (rajeunir), et bien disposées pour former un beau buisson. Taillez ces branches en conservant de 3 à 6 yeux suivant la vigueur de la pousse du rosier. Tailler trop long et garder plus de 4 à 5 branches, c'est diminuer la valeur de ses roses et tuer ses rosiers.

Arrachez ou coupez, exactement à l'endroit, où elles s'insèrent sur la tige, les pousses d'églantier venant en dessous de la greffe au cours de la végétation.

Placez aux rosiers un bon paillis de fumier de vache en mai, car ils aiment la fraîcheur en été. Combattez le blanc en saupoudrant de soufre nicotiné. Détruisez le puceron au moyen de Réol (voir page 41) ou encore d'une dissolution de 2 kilos de savon noir dans 100 litres d'eau, auxquels vous mélangez ensuite, lentement, un litre de pétrole.



Rose Pernetiana.

Rose hybride de Thé.

ROSISERS HAUTES TIGES.

greffés sur églantiers, en belles variétés rustiques à notre choix.

ROSISERS 1/2 TIGES	0m60 à 0m80, sous tête . . .	la pièce fr. 10 00
ROSISERS TIGES	0m80 à 1m20, id.	id. fr. 15 00

Nous possédons une superbe collection de rosiers tiges, dont la gravure jointe au présent catalogue représente quelques spécimens. La liste des variétés est envoyée sur demande à tous les amateurs.

Nous ne saurions trop recommander l'emploi de ces élégants arbustes qui n'occupent aucune place et sont par là-même si utiles pour les petits jardins. On les plante au bord des carrés de légumes et on peut même faire grimper, le long de leur tige mince, quelques jolies plantes de pois de senteur.

ROSISERS HAUTES TIGES PLEUREURS .	1m50 à 1m70, sous tête . . .	la pièce fr. 20 00
ROSISERS HAUTES TIGES PLEUREURS .	1m70 à 2m00, id.	id. fr. 25 00

ROSISERS BASSES TIGES GRIMPANTS.

Les rosiers Multiflores et Wichuraiana hybrides conviennent spécialement pour les arcades, balustrades, pergolas et toutes situations en plein air. Les Thé sarmenteux et les Noisette sont plus indiqués pour les murailles, à condition qu'elles soient exposées au sud, au sud-ouest ou au sud-est. Pour celles exposées à l'est et à l'ouest, vous vous en tiendrez aux rosiers Multiflores: Crimson et Crimson remontant, et aux rosiers Wichuraiana: Albéric Barbier, American Pillar et Veilchenblau. Enfin, contre les murs exposés en plein nord, vous planterez seulement des Crimson, Crimson remontant et American Pillar.

Plantes extra-fortes, tuteurées: Le cent: fr. 270 00; les dix: 30 00; la pièce: fr. 3 50

ROSISERS MULTIFLORES.

Très vigoureux: jolis bouquets de petites fleurs. Quoique assez rustiques, ils demandent cependant un léger abri contre les grands froids: buttage des pieds et paillis. Taille de propreté seulement.

Crimson Rambler , rouge cramoisi, tr. brill.	Thoresbyana , blanc, florifère.
Crimson Rambler remontant , florifère.	Veilchenblau , lilas rosé, puis bleu acier.

ROSISERS WICHURAIANA HYBRIDES.

Extrêmement vigoureux; feuillage brillant, abondance extraordinaire de fleurs. Très rustiques, ils supportent 15° sous zéro. Taille à peu près nulle.

Albéric Barbier , blanc crème, centre jaune.	Lady Gay , rose cerise.
American Pillar , rose vif, œil blanc.	Paul's Scarlet Climber , écarlate vif.
Aviateur Blériot , jaune safran.	René André , jaune aurore, orangé.
Carmin Pillar , simple, carmin rosé vif.	Royal Scarlet Hybrid , écarlate foncé.
Dorothy Perkins , rose clair.	Tausendschön , rose carminé.
Hiawatha , rouge cramoisi brillant.	White Dorothy , blanc pur.
Jean Guichard , saumon carminé, puis cuivre.	

ROSISERS THÉ SARMENTEUX.

Vigoureux, floraison superbe tout l'été. Abriter le pied l'hiver et éviter l'humidité. Taille presque nulle.

Beauté de l'Europe , jaune nuancé, odorant.	Maréchal Niel , jaune d'or, odorant. Serres.
Gloire de Dijon , jaune saumon, odorant.	Reine Marie-Henriette , carmin, odorant.
M^{me} Jules Gravereaux , jaune carminé.	

ROSIER HYBRIDE DE THÉ SARMENTEUX.

Souvenir de Claudius Denoyel, cramoisi.

ROSISERS NOISETTE.

Grands corymbes de nuances délicates, de parfum délicieux. Demandent un bon abri au pied pour l'hiver. Tailler peu ou pas. Très vigoureux.

Aimée Vibert , blanc de neige.	William Allen Richardson , jaune ocre.
Bouquet d'Or , jaune saumoné.	

ROSISERS CLIMBING.

Accidents sarmenteux fixés de variétés de massifs. Rosiers à grandes fleurs, florifères, rustiques et franchements grimpants. A préférer aux autres sarmenteux pour les situations ne demandant pas une végétation trop forte. Taille à peu près nulle. Palisser les sarments horizontalement, puis les arquer vers le sol.

Climbing Caroline Testout , rose chair.	Climbing M^{me} Edouard Herriot , corail.
Climbing Laurent Carle , carmin cramoisi.	Climbing M^{me} Jules Grolez , rose très vif.
Climbing M^{me} Abel Chatenay , rose carminé.	Climbing Sunburst , jaune orangé.

ROSIERS BASSES TIGES BUISSONS.

ROSIERS POLYANTHA NAINS.

Très nains et parfaitement remontants, ils donnent d'abondantes grappes de petites fleurs jusqu'aux gelées. Jolies corbeilles, plates-bandes. Ils demandent un bon abri au pied pour l'hiver. Tailler court.

Le cent: 220 00; les dix: 25 00; la pièce: 3 00.

Edith Cavell, écarlate ombré de cramoisi.
Joseph Guy, écarlate vif; très florifère.
Juliana, saumon tendre.
Katharina Zeimet, blanc crème.
Kirsten Poulsen, grandes fl. écarlate clair.

Marie Pavie, blanc, rosé.
Mrs Wm H. Cutbusch, églantine argenté.
Orléans rose, rouge géranium.
Orange Perfection (1927), fleur orange rougeâtre brillant, de belle forme.
Rödhätte, rouge cerise clair.

ROSIER POLYANTHA NAIN RÉCENT.

Gloria Mundi (1929), orange écarlate brillant; coloris nouveau, superbe. La pièce: fr. 6 00.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

A fleurs bien pleines, odorantes. Très rustiques, le moindre abri leur suffit pour résister aux hivers rudes. Leur vigueur étant exceptionnelle, il est préférable de les isoler. Pour obtenir une floraison abondante, taillez très long et arquez toutes les branches jusqu'au sol auquel vous les fixez par un crochet. Ces branches fleurissent sur toute la longueur et forment un magnifique buisson.

Le cent: 220 00; les dix: 25 00; la pièce: 3 00.

Captain Christy, rose carné tendre.
Frau Karl Druschki, Reine de neige.
Général Jacqueminot, rouge velouté.
Mrs John Laing, rose clair lilacé.
Paul Néron, rose pur, fleur géante.

Pierre Notting, pourpre amarante.
Princesse de Béarn, pourpre noir.
Souvenir de William Wood, grenat.
Ulrich Brüner, rouge géranium.
Van Houtte, rouge nuancé grenat.

ROSIERS HYBRIDES DE THÉ.

Fleurs grandes, très abondantes, du printemps aux gelées. Issus du croisement des Thé et des hybrides remontants, ils sont plus rustiques que les Thé, mais demandent toutefois, certains surtout, un bon abri pour l'hiver. Taille à 4, 5, 6 yeux, et plus pour les variétés très vigoureuses.

Le cent: 220 00; les dix: 25 00; la pièce: 3 00.

Betty, rose cuivré, teinté d'or.
Betty Uprichard, rose pur luisant.
British Queen, blanc pur.
Caroline Testout, rose chair, globuleuse.
Charles P. Kilham (1926), rouge Orient.
Dame Edith Helen (1926), rose pur.
Eldorado (1923), or teinté de rouge.
Etoile de France, grenat velouté.
Général Mac Arthur, rouge brillant.
Général superior Arnold Janssen, carmin.
George Dickson, rouge-noir. Extra-vigoureux: à traiter comme les hybrides remontants.
Gloire de Hollande, rouge géranium vif.
Golden Ophelia, jaune d'or pâle.
Gorgeous, jaune cuivré.
Hadley, rouge foncé, brillant.
Jonkheer J-L. Mock, rose argenté.
La Tosca, rose tendre nuancé.
Laurent Carle, carmin cramoisi.
M^{me} Abel Chatenay, rose carminé.
Madame Butterfly, rose carminé.
M^{me} Jules Bouché, crème nuancé rose.

Mme Jules Grolez, rose vif; florifère.
Mme Léon Pain, rose carné argenté, nuancé d'orange.
Mme M. de Luze, rose carminé.
Mme Ravary, grosse fleur orange.
Mme Segond-Weber, rose saumoné.
Margaret Dickson Hamill, grande fleur jaune paille bordée de carmin.
Mrs Ch. Read, blanc très nuancé de rose.
Mrs George Shawyer, rose pur.
Mrs Henry Winnett, rouge brillant.
Mrs T. Hillas, jaune chrome pur.
Mrs Wallace Rowe, mauve rosé.
Ophélia, saumon rosé.
Pharisaer, rose nacré; joli bouton.
Prince de Bulgarie, rose argenté nuancé saumon; très florifère.
Red Star, rouge feu.
Souvenir de H. A. Verschuieren, orange.
Sunstar, jaune orangé foncé.
White Ophelia, blanc à centre aurore.

ROSIERS HYBRIDES DE THÉ RÉCENTS.

Les dix: 45 00; la pièce: 5 00.

Europa (1928), rose foncé pur, ne bleuisant pas; très double et de bonne tenue.**Helen Fox** (1928), grande fleur jaune d'or en forme de coupe; bouton allongé.**Portadown** (1928), riche coloris rouge cramoisi foncé à reflet velouté.**ROSIERS PERNETIANA.**

Groupe illustre, quoique récent. Coloris étranges: orange, cuivre, jaune chrome, rouge cuivré, etc. Nous ne cultivons que les variétés résistantes et florifères. Abritez et taillez comme les hybrides de thé.

Le cent: 220 00; les dix: 25 00; la pièce: 3 00.

Angèle Pernet (1924), orange rougeâtre.**Beauté de Lyon**, corail, nuancé jaune; extra-vig. A traiter comme les hybrides remont.**Feu Joseph Loymans**, jaune et abricot.**Golden Emblen**, grande fleur jaune d'or.**Juliet**, rose foncé à revers vieil or; extra-vig.

A traiter comme les hybrides remontants.

Los Angeles, feu teinté corail.**Louise-Catherine Breslau**, crevette cuivrée.**Lyon rose**, rouge corail saumoné.**Mme Alexandre Dreux**, jaune d'or.**Mme Edouard Herriot**, rouge corail nuancé de jaune; unique.**Mme Henri Gravereaux**, jaune cuivré et bronzé.**Marguerite Amidieu du Clos**, bouton d'or foncé.**Marie-Adélaïde**, orange foncé, superbe.**Mevrouw G. A. Van Rossem** (1926), jaune d'or, flammé orange et bronze.**Pax Labor**, grande fleur jaune d'or pâle.**Shot Silk**, rouge cerise orangé.**Souvenir de Claudius Pernet**, jaune soleil.**Souvenir de George Beckwith**, crevette nuancé jaune.**Souvenir de Georges Pernet**, superbe coloris rouge orient, ombré jaune.**The Queen Alexandra Rose**, vermillon.**Ville de Paris** (1925), jaune soleil orangé.**Wilhelm Kordes**, rouge capucine et or.**Willowmere**, crevette nuancé de jaune.**ROSIERS PERNETIANA RÉCENTS.**

Les dix: 45 00; la pièce: 5 00.

Fancy (1928), rose fleur de pêcher nuancé cerise sur fond jaune.**Jules Gaujard** (1928), grande coupe rouge de carthame brillant; teinte nouvelle.**Lady Forteviot** (1928), jaune d'or teinté d'abricot vif; parfum suave.**Les Amis de Lille** (1928), jaune rougeâtre; pointe et revers des pétales rouge saumoné.

Roses Polyantha.



Les arbustes, en général, viennent bien en tout terrain et à toute situation. On réservera de préférence, les endroits ensoleillés aux arbustes à fleurs.

TAILLE DES ARBUSTES. — La taille des arbustes est très simple; on peut la résumer ainsi:

1. — Ne tailler que pour enlever le bois mort et maintenir l'équilibre (en hiver): althéa, boule de neige, chèvre-feuilles, corète double, cytise, épine-vinette, groseillier, poirier du Japon, sumac, tamarix.
2. — Tailler plus ou moins long suivant la place que doit occuper l'arbuste (en hiver): cornouillers, eleagnus, érable negundo, noisetier pourpre, prunus pissardi, sureau.
3. — Tailler très court, chaque hiver, sur quelques yeux de la base: budleia, hydrangea, hypericum, spirées Bumalda et callosa.
4. — Tailler, en été, après la floraison, en supprimant le bois qui a fleuri, et pour obtenir une bonne charpente, puis éclaircir les touffes en hiver: deutzia, forsythia, hortensias, lilas (peu), philadelphus (très peu), spirée Van Houttei, weigelia.

ARBUSTES D'ORNEMENT A FEUILLES CADUQUES.

Hauteur
qu'atteindra
l'arbuste adulte.

Les dix Pièce

Althéa, 15 variétés. Jolies fl. variées, très grosses, à la fin de l'été.	1 ^m 50 à 3 m.	49 00	5 40
Boule de neige, globes de fl. blanches au début de l'été, tr. jolies.	2 à 3 m.	41 00	4 60
Budleia globosa, épis bleus, odorants, en été; situation abritée.	2 m.	41 00	4 60
Corète du Japon à fleurs doubles. Fleurs jaunes de mai à sept.	1 m. à 1 ^m 50	41 00	4 60
Cornouiller mas à fruits. Fruits rouges. Pour haies ou clôtures.	3 à 4 m.	41 00	4 60
— de Sibérie, panaché blanc, effet de blanc splendide.	1 ^m 50 à 2 m.	41 00	4 60
— doré de Spath, bois rouge, feuillage panaché de jaune.	1 ^m 50 à 3 m.	41 00	4 60
Cytise laburnum, faux ébénier, grappes jaunes, très jolies, en mai.	3 à 4 m.	41 00	4 60
Deutzia crénelé, multiples fleurs roses en mai-juin.	1 à 2 m.	41 00	4 60
— hybride de Lemoine, grandes fleurs blanc pur, en mai-juin.	1 m. à 1 ^m 50	41 00	4 60
Eleagnus angustifolia, Olivier de Bohême, argenté. Beaux fruits.	3 à 4 m.	41 00	4 60
Epine-vinette à feuilles pourpres, fl. jaunes en grappes au print.	1 ^m 50 à 3 m.	41 00	4 60
Erable negundo panaché blanc, feuil. clair très beau, effets magn.	1 ^m 50 à 3 m.	49 00	5 40
— negundo panaché jaune. Jolis effets dans les bosquets.	1 ^m 50 à 3 m.	49 00	5 40
Forsythia fortunei, jolies fleurs jaunes, hâtives, avant les feuilles.	2 à 3 m.	41 00	4 60
Groseillier sanguin, grappes de fleurs rouges, au début de l'été.	1 à 2 m.	41 00	4 60
Hortensia Mme Mouillère, blanc, oeil rosé; sit. ombragée et abrit.	0 ^m 75 à 1 m.	25 00	3 00
— Avalanche, blanc extra-pur, splendide.	0 ^m 75 à 1 m.	25 00	3 00
— La Marne, rose carminé, très beau.	0 ^m 75 à 1 m.	25 00	3 00
— Otaxa compacta, grosses ombelles roses.	0 ^m 75 à 1 m.	25 00	3 00
Hydrangea paniculé, grosses panicules blanc rosé; très beau.	1 m.	45 00	5 00
Lilas à grandes fleurs simples et doubles, dans les var. ci-après:	2 à 3 m.	—	12 00
Alph. Lavallée, bleuté, double.	Marie Legraye, blanc, simple.	»	—
La Tour d'Auvergne, rose d'or.	Maur. de Vilmorin, azuré, d.	»	—
Léon Simon, bleuâtre, double.	Michel Büchner, mauve, doub.	»	—
M ^{me} Cas. Périer, crème doub.	Président Grévy, bleu, double.	»	—
M ^{me} Lemoine, blanc pur, doub.	S ^{ir} de Louis Spath, grenat, s.	»	—
Lilas de Perse, pourpre. Bouquets plus légers, très odor. (manque).	1 ^m 50 à 2 m.	—	—
Noisetier pourpre: voir Arbres fruitiers.	2 à 3 m.	—	—
Philadelphus, 10 variétés, abondantes fl. blanches, odor. en juin.	2 à 3 m.	41 00	4 60
Poirier du Japon, fleurs rouge foncé en avril-mai.	1 m. à 1 ^m 50	41 00	4 60
Prunus pissardi, feuillage pourpre foncé, d'effet merveilleux.	2 à 3 m.	64 00	7 00
— sinensis, à fleurs blanches, doubles, hâtives; très jol.	1 m. à 1 ^m 50	64 00	7 00
Spirée Bumalda, Anthony Waterer, nombr. fleurs roses. Bordures.	0 ^m 50	41 00	4 60
— callosa, blanche; merveil. bordures se couvrant de fleurs.	0 ^m 50	41 00	4 60
— Van Houttei. Belle variété. Fl. blanches. Rameaux souples.	1 à 2 m.	41 00	4 60
Sumac fustet, Rhus Cotinus, arbre à perruque. tr. jol. en fin d'été.	3 à 4 m.	41 00	4 60
Sureau à feuilles dorées, très jol., extrêm. vigoureux et rustique.	2 à 4 m.	41 00	4 60
Tamarix à fleurs pourpres. Fleurs rouge foncé en mai.	2 à 3 m.	41 00	4 60
Weigelia, 10 variétés, multiples fleurs variées, très jolies, en mai.	1 m. à 1 ^m 50	41 00	4 60

ARBUSTES D'ORNEMENT A FEUILLES PERSISTANTES.Hauteur
qu'atteindra
l'arbruste adulte.

Les dix Pièce

Les arbustes à feuillage persistant aiment une situation ombragée; ne les tailler que pour régulariser leur aspect ou les maintenir sous des formes plus restreintes.

Aucuba du Japon, feuillage vert luisant ponctué de blanc . . .	0 ^m 50 à 1 ^m 50	74 00	8 00
Buis pour bordures, traçant très bien, régulier. Le cent: fr. 24 00.	nain	3 20	—
— doré pour bordures. Jaune brill., très joli. Le cent: fr. 40 00.	»	5 00	—
— doré en pyramide. Superbe arbuste à isoler	1 ^m 50	—	15 00
Fusain du Japon. Evonymus. A isoler ou en bord. de massifs verts.	0 ^m 60 à 1 ^m 50	79 00	8 50
— du Japon, panaché jaune, croissance lente, très joli.	0 ^m 60 à 1 ^m 50	79 00	8 50
Laurier-cerise, feuillage vert luisant foncé, brillant	1 à 2 m.	69 00	7 50
Ligustrum ovalifolium, feuillage vert luisant (grosse touffe) . . .	3 à 4 m.	35 00	4 00
— ovalifolium panaché jaune, buisson doré très ornemental.	1 ^m 50 à 3 m.	60 00	6 50
— ovalifolium. Plantes pour haies. Le cent: fr. 100 00.	3 à 4 m.	12 60	—
Mahonia à feuilles de houx, feuil. très beau; fleurs jaunes en mai	1 m. à 1 ^m 50	55 00	6 00

ARBUSTES DE TERRE DE BRUYERE.

Azalée mollis, en boutons. Sup. au printemps. Situation ensoleillée	0 ^m 50 à 0 ^m 60	89 00	9 50
Magnolia, en boutons. Fleurs blanches, énormes, au premier print.	(manque)	—	—
Rhododendron hybride de plein air, en boutons. Situation abritée	1 ^m 25 à 1 ^m 50	—	25 00

ARBUSTES SARMENTEUX ET GRIMPANTS.

Aristolochie siphon, pour berceaux, tonnelles, etc.; très rapide, même à l'ombre.	—	13 00
Chèvrefeuille de Belgique	Chèvrefeuille de la Chine, pourpre.	64 00 7 00
— à feuille réticulée jaune, splend.	— Punicea, rouge vif	64 00 7 00
— semperflorens, toujours fleuri.	— flava, jaune d'or	64 00 7 00
Clematite bleue ordinaire (Viticella), vigoureuse		69 00 7 50
— blanche ordinaire (Flammula), très jolie.		69 00 7 50
— à grande fleur, dans les variétés ci-après.		— 14 00
Daniel Derunda, bleu violacé.	Mme Le Coultre, blanc pur, très belle.	— —
Duchess of Edinburg, blanche, double.	Mrs J. G. Patijn, semi-double, bleu ciel.	— —
Fairy Queen, fleur rose pâle, énorme.	Nelly Moser, blanc nuancé de mauve.	— —
Integrifolia Durandii, bleu velouté.	Patens hybride Siéboldii, bleue . . .	— —
Jackmanni, violet foncé, très florifère.	Président, fleur bleu foncé, splendide.	— —
Lawsoniana, bleue, magnifique.	Ville de Lyon, rouge carmin, superbe.	— —
Lilacina floribunda, lilas pourpre.		

Avant de planter, taillez la tige immédiatement au-dessus des racines. Enterrez ensuite la touffe sous une épaisseur de 4 ou 5 centimètres de terre. La clematite demande un terrain léger et perméable.

Glycine de la Chine, à fleur bleue, grandes grappes bleues en avril-mai; très vig.	—	16 00
— de la Chine, à fleur blanche. Les glycines demandent une bonne exposition	—	16 00
Jasminum nudiflorum, foliis aureis. Pour garnir de petits murs. Fleurit fin hiver	60 00	6 50
Lierre d'Irlande, larges feuilles, croissance très rapide; s'attache seul	55 00	6 00
— panaché, très joli feuillage; pour garnir murs, troncs d'arbres, rochers.	89 00	9 50
Polygonum baldschuanicum, beau feuil. vert foncé; bouquets blancs. Très rapide	—	14 00
Vigne-Vierge (Ampelopsis) ordinaire, pour garnir berceaux, tonnelles, murs, etc.	41 00	4 60
— (Ampelopsis) Veitchii, feuilles pourpres en automne; s'attache seule	41 00	4 60

ARBRES D'ORNEMENT (hautes tiges).

La reprise de ces arbres est très capricieuse. Il faudra les entourer de grands soins.

	Pièce		Pièce
Acacia à fleurs roses.	25 00	Peuplier d'Italie	13 00
Acacia inermis	25 00	Saule pleureur à bois jaune.	15 00
Epine double rouge	20 00	Sorbier des oiseaux	20 00
Erable panaché	25 00	Tilleul de Hollande	30 00



PLANTES POTAGÈRES BISANNUELLES. Livrables d'octobre à avril.

Vous pouvez obtenir ces plantes vous-même, très économiquement. Vers le 15 août, semez clair, à un endroit aéré et bien ensoleillé: choux cabus blanc et rouge, chou de Milan, chou-fleur et laitue d'hiver. Repiquez une partie des plantes fin septembre, en rigoles profondes de 15 cm., les choux à 50 cm., en tous sens, et les laitues à 30 cm. Les autres pieds seront repiqués côte à côte le long d'une haie ou d'un mur non exposé au soleil. Vous disposerez ainsi, dès le premier printemps, de plantes vigoureuses, bien acclimatées et de reprise parfaite.

	Le cent	Les dix	Pièce
Choux cabus blancs de Hollande.	5 00	—	—
— cabus rouges foncés gros.	5 00	—	—
— de Milan hâtifs, de Savoie.	5 00	—	—
Choux-fleurs Lenormand.	10 00	—	—
Laitues pommées d'hiver bourguignonnes	5 00	—	—

PLANTES POTAGÈRES VIVACES. Livrables d'octobre à avril.

Chaque jardin devrait contenir, à portée de la cuisine, un ou deux pieds de chacune de ces plantes condimentaires qui assaisonnent si finement tant de mets.

Toute salade est délicieusement relevée par un fin hachis de ciboulette et d'estragon. Les oignons et cornichons confits au vinaigre réclament le fenouil. La marjolaine séchée est essentielle dans la charcuterie. La menthe fait tout le goût des anguilles au vert. Les fèves et haricots demandent la sarriette. Les pigeons exigent la sauge. Et un potage n'est pas parfait si on n'y a pas mis un peu de laurier et de thym.

L'angélique à confire, l'oseille vierge pour les potages, la rhubarbe pour les compotes et les pâtisseries viennent également à point dans tous les ménages.

	Le cent	Les dix	Pièce
Angélique officinale. Les côtes des feuilles se mangent confites au sucre.	—	16 00	2 00
Ciboulette, civette. Pour assaisonner la salade	—	8 00	1 20
Estragon. Assaisonne les salades, sauces, hachis, oignons et cornichons	—	16 00	2 00
Fenouil vivace. Assaisonne les oignons, cornichons et les sauces	—	8 00	1 20
Hysope. Les fleurs sont employées en infusions stomachiques	—	8 00	1 20
Laurier-sauce, élevé en godets. Feuilles séchées indispensables pour les potages	—	—	4 00
Lavande. Pour parfumer le linge et en éloigner les insectes.	—	12 00	1 60
Marjolaine vivace. Sert à assaisonner la charcuterie.	—	8 00	1 20
Marrube blanc. Condiment. Tisane contre la toux	—	8 00	1 20
Mélisse ou citronnelle. Tisane pour l'estomac. Cordial et antispasmodique	—	8 00	1 20
Menthe poivrée. Les infusions sont stimulantes et stomachiques	—	8 00	1 20
Oseille vierge, ne montant pas à graines	—	8 00	1 20
Rhubarbe Victoria, extra-hâtive	—	12 00	1 60
Sarriette vivace. Pour assaisonner les haricots et les fèves de marais	—	8 00	1 20
Sauge officinale. Pour assaisonner les pigeons.	—	8 00	1 20
Thym ordinaire. Condiment pour la viande, le bouillon, etc.	—	8 00	1 20

PLANTES DE FLEURS BISANNUELLES. Livrables d'octobre à avril.

Vous pouvez semer vous-même ces fleurs, en juillet. Vous repiquerez les plantes en pépinière serrée, puis vous en remplirez vos parterres en automne. Pour les abriter plus facilement d'un froid rigoureux, vous pouvez aussi les laisser en pépinière pour l'hiver et les planter seulement en février-mars. La floraison est moins hâtive.

	Distancer de	Le cent	Les dix	Pièce
Giroflée jaune double ou Muret. D'odeur délicieuse	25	27 00	3 50	—
— hybride Allionii, orangée; splendide corbeille d'avril-mai.	30	22 00	3 00	—
Myosotis des Alpes bleu. Floraison superbe et très longue	20	22 00	3 00	—
Œillet de Poète, double, varié. Floraison prolongée.	40	22 00	3 00	—
Pensée cornue bleue (Cornuta)	20	22 00	3 00	—
— à fleur jaune (Lutea)	20	22 00	3 00	—
— à grande fleur à grandes macules Trimardeau	25 à 30	36 00	4 60	—
— à grande fleur à grandes macules Bugnot, extra.	25 à 30	36 00	4 60	—
— à grande fleur en mélange. Fleurs énormes, splendides	25 à 30	36 00	4 60	—
Voir aussi toutes les plantes vivaces à floraison printanière.	—	—	—	—

PLANTES DE FLEURS VIVACES.

Livrables d'octobre à avril.

Nous avons indiqué l'époque de floraison et la hauteur des plantes. Vous pourrez ainsi combiner vos massifs en graduant les hauteurs et en sériant la floraison pour que l'ensemble reste beau toute l'année. La hauteur de la plante indique généralement la distance à lui réserver.

RECEPTION. — Lorsque les plantes arrivent, éviter, avant ou après le déballage, de les exposer à un courant d'air ou aux rayons du soleil.

Il serait préférable de ne pas les planter en pleine terre tout de suite, mais de les traiter comme suit:

Secouer la terre; couper les parties des tiges ou des racines qui sont quelque peu pourries, et planter provisoirement en terreau léger, sous châssis ou de façon à pouvoir abriter pendant quelques jours des gelées, des vents du Nord et du soleil; donner graduellement plus d'air jusqu'au moment de la plantation.

Si la plantation est faite avant ou pendant l'hiver, avoir soin de mettre sur chaque plante un petit tas de fines cendrées, que l'on enlèvera dès les premiers beaux jours. La plantation avant l'hiver n'est d'ailleurs utile que pour les plantes à floraison printanière qui donneront ainsi de belles fleurs au printemps suivant. Les autres plantes vivaces peuvent être plantées soit avant, soit après l'hiver.

Cependant, les plantes délicates: anémone, aster amellus, gynyrium, lychnis, pied d'alouette, pyrèthre, qui souffrent de la transplantation et exigent de grands soins, ne seront mises en place que fin mars.

	Hauteur.	Floraison.	Le cent	Les dix	Pièce
Achillea Eupatorium Parker. Fl. d'un beau jaune d'or.	60-70	juil.-sept.	—	19 00	2 30
Aconit Napel, char de Vénus. Pl.-bandes, rochers, ombre.	60-80	juin-juil.	—	30 00	3 50
Ancolie des jardins hybride. Coloris splend. Fl. coupées.	»	mai-juin	140 00	16 00	2 00
— Chrysantha double. Jaune. Gracieuse et florifère.	1 m.	mai-juill.	140 00	16 00	2 00
Anémone du Japon Honorine Jobert. Blanc pur.	40-60	août-sep.	—	30 00	3 50
— du Japon Reine Charlotte, semi-double, rose vif.	»	»	—	30 00	3 50
Belles plantes de fin d'été, fleurissant à l'ombre et au soleil.					
Arabette des Alpes, double blanche. Fleurs jusqu'en été.	20-30	avril	40 00	5 00	0 90
— des Alpes, mauve. Très fraîche	»	»	40 00	5 00	0 90
— des Alpes, à feuillage panaché de blanc.	30	»	40 00	5 00	0 90
Jolie plante de printemps, rampante, fleurissant jusqu'en été.					
Asperule odorante, fleurs blanches mellifères. Rustique	20	mai	40 00	5 00	0 90




	Hauteur.	Floraison.	Le cent	Les dix	Pièce
Aster , magnifique collection, 15 variétés disponibles.	50-1 ^m 50	juin-oct.	90 00	11 00	1 50
— Amellus , plus nain et plus précoce.	50-60	août-sep.	170 00	19 00	2 30
Les asters aiment la mi-ombre; ils se couvrent de milliers de fleurs très belles, se conservant longtemps dans l'eau. Sur demande nous envoyons la liste des variétés.					
Astilbe Perle rose , rose tendre	30-50	mai-août	—	25 00	3 00
— Diamant , blanc presque pur	»	»	—	25 00	3 00
— Gunther , rose magnifique	25-30	avril-juil.	—	25 00	3 00
— Rubin , rouge carmin	25-40	»	—	25 00	3 00
Cultivés en plates-bandes, en groupes sur les pelouses, ils forment des effets uniques avec leurs délicates panicules. Ils aiment la mi-ombre. Si l'on en empote quelques plantes en automne et qu'on les cultive en appartement, en augmentant peu à peu la chaleur et les arrosages, on les fait aisément fleurir en hiver.					
Auricule variée , très jolie en bordures, pots, etc.	10-15	avril-mai	—	12 00	1 60
Campanule capitata speciosa . Bouquets violets	40-50	mai-juill.	—	16 00	2 00
— Carpatica Isabel . Touffes de petites coupes bleues.	30	juil.-sept.	—	16 00	2 00
— Carpatica White Star . Mêmes fleurs en blanc.	»	»	—	16 00	2 00
— persicifolia blanche . Epis de petites roses blanches.	60-70	juin-août	—	16 00	2 00
— persicifolia bleue . Mêmes épis en bleu	»	»	—	16 00	2 00
— Platycodon , à grande fleur bleue et blanche	40	juil.-août	170 00	19 00	2 30
Les campanules sont d'excellentes plantes de massifs, fleurs coupées, etc., venant bien à l'ombre. Voir, page 57, notre photographie de campanule <i>Platycodon</i> .					
Coréopsis verticillata . Feuillage très fin. Fleurs jaunes.	50-60	juil.-août	—	16 00	2 00
Dahlias : voir ci-après.	—	»	—	—	—
Dielytra spectabilis , Cœur de Marie. Grappes roses.	50-70	mai-juin	—	35 00	4 00
On obtiendra une floraison hâtive en les empotant en automne. Enterrer les pots sous châssis et les rentrer en appartement vers la fin de l'hiver.					
Digitale pourprée , à fleur de gloxinia, en épis.	1 ^m 40	mai-août	—	13 00	1 70
Entreplanter des digitales dans les corbeilles de dahlias. Elles fleuriront en juin-juillet et les dahlias continueront la floraison.					
Doronicum du Caucase . Grandes fl. jaunes au printemps.	1 m.	mai	—	13 00	1 70
Erigeron mesa grande speciosus , à grande fleur bleue	30-40	juin-oct.	—	13 00	1 70
Ressemblant aux asters, mais moins élevé, à fleurs plus grandes.					
Eryngium giganteum (chardon bleu). Beaux bouq. secs.	50-80	juil.-août	—	45 00	5 00
Fougère asplenium filix mas cristata (fougère mâle).	75	—	—	74 00	8 00
— osmunda regalis cristata (fougère royale)	»	—	—	74 00	8 00
— struthiopteris germanica , rocailles, sous-bois, etc.	»	—	—	74 00	8 00
Fuchsia rustique coccinea . Massifs et bordures à l'ombre.	50	juin-sept.	—	16 00	2 00
Les abriter légèrement l'hiver sous une couche de feuilles.					
Funkia panaché . Très jolie bordure de massifs	20-30	juin-août	110 00	13 00	1 70
Gaillarde , à très grandes fleurs, se succédant tout l'été.	40-60	mai-juill.	110 00	13 00	1 70
Glaïeuls : voir page 44.	—	—	—	—	—
Gynerium argenteum (herbe géante des Pampas).	2 m.	sept.-nov.	—	—	6 00
— argenteum roseum	2 m.	»	—	—	6 00
Les plus belles plantes à isoler sur les pelouses et dans les perspectives. Magnifiques panaches soyeux, que l'on conserve séchés. Pour l'hiver, relever les feuilles en faisceau, les entourer d'une chemise de paille et protéger la souche de cendrées.					
Gypsophile paniculée , très fine. Bouquets frais et secs	50-60	juin-août	80 00	9 00	1 30
— paniculée à fleur double	»	»	—	45 00	5 00
Superbes panicules de fleurs blanches. Admirables bouquets secs.					
Helenium , beau jaune d'or	60	juil.-août	—	13 00	1 70
Helianthus rigidus à grande fleur, jaune. Soleil vivace.	1 m.	août-oct.	—	13 00	1 70
Hémérocalle aurantiaca . Grosses fleurs orange foncé	60-80	mai-sept.	—	16 00	2 00
— flava . Grosses fleurs jaunes, très odorantes	60-80	mai-sept.	—	16 00	2 00
Heuchera en mélange. Légères grappes rouges. Bordures.	50	juin-juil.	—	13 00	1 70
Hoteia (astilbe) japonica, blanc rosé	40-50	avril-juil.	—	35 00	4 00
— (astilbe) hybride Peach Blossom , rose pâle délicat.	»	»	—	35 00	4 00
Très semblables aux astilbes. Jolies plantes, faciles à cultiver en pots. Nous recommandons aux amateurs de belles plantes les Astilbes, Hoteias et Spirées. Situation fraîche et ombragée.					
Iris : voir ci-après.	—	—	—	—	—
Julienne des jardins double blanche . Bouq. blanc rosé.	60	mai-juill.	—	20 00	2 50

	Hauteur	Floraison	Le cent	Les dix	Pièce
Lavande: voir plantes potagères vivaces, page 56.	—	—	—	—	—
Leucanthemum à très large fleur Etoile d'Anvers.	50-60	juin-juil.	—	13 00	1 70
— à très large fleur Princesse Henri.	»	»	—	13 00	1 70
— à très large fleur Shasta Daisy Westralia.	»	»	—	13 00	1 70
Précieuses plantes de bouquets, ces grandes marguerites blanches atteignent jusqu'à 10 cm. de diamètre. Superbes touffes. Les bouturer chaque année en avril pour obtenir de très larges fleurs.					
Lis: voir page 44.	—	—	—	—	—
Lupin vivace polyphyllus. Magnifiques épis. Pl.-bandes.	70-1 ^m 50	juin-août	—	13 00	1 70
Lychnis viscaria rose double. Pl.-bandes, bouquets. Magn.	manque	mai-juill.	—	—	—
Lysimachia verticillata. Petits rameaux de fleurs jaunes	0 ^m 50	mai-juin	—	16 00	2 00
Montbretia: voir page 44.	—	—	—	—	—
Œillet mignardise, Her Majesty, rose double. Bordures.	20-25	mai-juin	80 00	9 00	1 30
— mignardise Mrs Sinkins, double blanc merveilleux	»	»	80 00	9 00	1 30
— des fleuristes double varié. Florifère. Rustique.	50-60	juin-août	70 00	8 00	1 20
Pâquerette monstrueuse double blanche extra	10	mars-mai	27 00	3 50	0 70
— monstrueuse double rouge extra. Fleurs énormes.	»	»	27 00	3 50	0 70
Pavot d'Orient hybride, à gde fl. Coquelicot. A tuteur.	60-80	mai-juill.	—	25 00	3 00
Une des plus belles plantes de plates-bandes. Orne bien les grands vases. Aime une terre fertile et une exposition ensoleillée.					
Pensée vivace blanche. De toute beauté. (manque).	10-15	mai-oct.	—	—	—
— vivace bleu foncé, fleurissant toute l'année.	»	»	90 00	11 00	1 50
— vivace bleu pervenche. Teinte exquise	»	»	90 00	11 00	1 50
— vivace jaune, fleurissant toute l'année.	»	»	90 00	11 00	1 50
Pervenche grande. Tapisse le sol, même à l'ombre, Bleue	30-40	mai-juin	—	20 00	2 50
— à feuilles panachées. Rocailles, talus, etc.	manque	»	—	—	—
Phlox hybride des jardins, belles variétés avec noms	40-80	juin-sept.	270 00	30 00	3 50
Bouquets abondants, volumineux, très variés et richement colorés. Magnifique plante pour plates-bandes, corbeilles. Très belle en bordure de massifs d'arbustes. Fleurs coupées de toute beauté. Sur demande, nous envoyons la liste des variétés.					
Physalis franchetti. Petits ballons rouges à garder l'hiver	30-40	août-nov.	100 00	12 00	1 60
Pied d'alouette de la Chine, à grande fleur, en mélange.	80-1 ^m 50	mai-oct.	—	25 00	3 00
Longs épis blancs, bleus, violets, admirables, semblables à des rameaux d'orchidées. Massifs, plates-bandes, fleurs coupées.					
Pivoine herbacée de la Chine, mél. splend. avec noms.	1 m.	juin-juil.	—	35 00	4 00
Potentille à grande fleur double, variée. Rouge, or, etc.	20-30	juin-juil.	180 00	20 00	2 50
Primevère des jardins, variée. Fl. en bouquets au print.	10-20	mars-mai	50 00	6 00	1 00
Aime une situation fraîche et mi-ombragée. Très florifère.					



Dahlia Cactus Andries Middagzon.



Dahlia Cactus décoratif Royal Pink.

Deux belles nouveautés de dahlias.

	Hauteur	Floraison	Le cent	Les dix	Pièce
Pyrèthre hybride à fleur simple, variée	50-70	mai-oct.	—	41 00	4 60
— hybride à fleur double, variée	»	»	—	41 00	4 60
Très belle fleur coupée, de longue durée. Couper les tiges après la floraison et arroser régulièrement pour obtenir une 2 ^e floraison.					
Rose trémière, race Chater, en magnifique mélange	2m.-3 m.	juil.-sept.	—	12 00	1 60
Rudbeckia purpurea, grande marguerite rouge	80	juill.-oct.	140 00	16 00	2 00
— speciosa Newmanni, jaune orangé à centre noir	60-70	»	—	16 00	2 00
Saxifrage hypnoïde, gazon turc. Tapis vert, fl. blanches	5-10	mai-juin	50 00	6 00	1 00
— ombreuse, désespoir du peintre. Bordures	20-30	mai-juill.	40 00	5 00	0 90
— crassifolia. Fleurs roses. Massifs, rochers	15-25	mars-avr.	140 00	16 00	2 00
Sedum maximum atropurpureum. Feuill. gras, pourpre	0m30	août-sep.	140 00	16 00	2 00
— roseum. Feuilles grasses, glauques, fleurs jaunes	»	»	140 00	16 00	2 00
— spectabile atropurpureum. Glauque, fl. rose vif	»	»	140 00	16 00	2 00
— spectabile brillant. Amélioration. Fl. plus foncées	»	»	140 00	16 00	2 00
Spergule pilifère. Sagine. Gazon très fin, fleuri de blanc	4-5	mai-août	60 00	7 00	1 10
Spirée barbe de bouc, grands panaches blancs, très jolis	1 m.	mai-juill.	—	45 00	5 00
Isolés, groupés sur les pelouses, disséminés dans les massifs d'arbustes, ces grands panaches produisent des effets uniques.					

Spirée venusta rosea, rose pourpré, remarquable	60-90	juin-juil.	—	16 00	2 00
Stachys lanata argenté, bord. de massifs de rosiers. etc.	20-30	juin-août	50 00	6 00	1 00
Statice armeria purpurea, gazon d'Espagne. Bordures	20-25	mai-juill.	50 00	6 00	1 00
— latifolia, grandes panicules acier, magnifiques	50-60	juil.-sept.	—	16 00	2 00
— tartarica, rose rougeâtre	25-30	»	—	16 00	2 00
— incana hybride, blanc rosé, lilacé	30-35	»	—	16 00	2 00

Immenses panicules très fines, très jolies, recherchées pour les bouquets. On peut, en les séchant, les conserver tout l'hiver.

Tritoma uvaria grandiflora, hauts épis corail orangé	80-1m20	juil.-oct.	—	12 00	1 60
Trolle d'Europe Fire Globe, grosses fl. jaunes, doubles	30-40	mai-juin	—	45 00	5 00
Valériane des jardins, en mélange. Floraison abondante	50-60	juin-oct.	—	16 00	2 00
Verge d'or (Solidago). Grandes gerbes dorées. Rustique	50-60	juin-sept.	—	12 00	1 60
Véronique Hendersonii. Grands épis bleu foncé	0m60	juin-juil.	—	12 00	1 60
Violette odorante Princesse de Galles, large, bleu clair	15	mars-oct.	50 00	6 00	1 00
— odorante Rawson White, très florifère, blanc pur	»	»	50 00	6 00	1 00
— odorante de Parme double, bleue, odeur forte	»	»	100 00	12 00	1 60

Bordures à mi-ombre, à renouveler tous les 2 ans au moyen des couplants enracinés. On obtiendra une floraison hâtive en les recouvrant de châssis en janvier.

Yucca filamentosa. Gr. hampes de clochettes blanches	1 m.	juin-oct.	—	25 00	3 00
---	------	-----------	---	-------	------

DAHLIAS.

Sur demande, nous envoyons la liste des variétés.

Dahlia double à fleur de Cactus, var. choisies, avec noms	1m25	août-oct.	—	30 00	3 50
— double à fleur de Cactus décoratif, avec noms	»	»	—	30 00	3 50

NOUVEAUTÉS DE DAHLIAS.

Andries Middagzon (Cactus). Grande fl. parfaite, jaune clair à pétales bordés de rouge laque. Tige rigide	1m25	août-oct.	—	55 00	6 00
Royal Pink (Cactus décoratif). Magnifique fleur rose lilas très tendre sur longue tige rigide	»	»	—	55 00	6 00

IRIS.

Iris pumila. Iris nain. Floraison précoce. Belle bordure	20-25	mars-mai	100 00	12 00	1 60
— Germanica ou des jardins, 20 variétés avec noms	60-1 m.	mai-juin	100 00	12 00	1 60

Fleurs très riches, de toutes nuances: bicolores, lavées ou tachetées. Sur demande, nous envoyons la liste des variétés.

Iris Kaempferi, en mélange	80-1 m.	juin-juil.	—	25 00	3 00
---	---------	------------	---	-------	------

Grandes fleurs souvent unicolores avec une ligne jaune d'or à la base. Sol frais ou bon paillis, et fréquents arrosages.



FRAISIERS.

RECEPTION. — Si les fraisiers ont été expédiés par temps sec, déballez-les immédiatement, plongez les racines dans l'eau pendant quelques heures et plantez ensuite, *après avoir bien affermi le sol*. Si les plantes étaient complètement fanées, il faudrait les planter d'abord en pépinière, les ombrager, et les arroser souvent, pour ne les mettre en place que lorsqu'elles auraient émis de nouvelles racines.

ENGRAIS. — Plus qu'une autre plante, le fraisier réclame une terre fertile. Il lui faut de l'engrais et beaucoup d'engrais. Chaque année, aux premiers beaux jours, incorporez au sol, par mètre carré, un mélange de 40 gr. nitrate de soude, 50 gr. superphosphate et 20 gr. sulfate de potasse. Assurez le grossissement des fruits en complétant la fumure ci-dessus par des arrosages fertilisants. Et pour ce fruit surtout, qui est trop souvent puriné, renoncez à l'engrais naturel liquide et employez notre engrais concentré (voir page 41).

La chaux donnée aux fraisiers en petite quantité, rend les fraises plus grosses et plus savoureuses.

POUR OBTENIR DE GROS FRUITS. — Plantez les fraisiers à situation aérée, en lignes distantes de 60 cm. et à 30 ou 35 cm. dans la ligne, dans un terrain bien défoncé, fumé et amendé. Dès après la floraison, épandez du fumier pailleux autour des plantes. Supprimez tous les coulants, ne laissez à chaque hampe que 5 ou 6 fleurs et arrosez souvent à l'engrais concentré.

La fraisière doit être renouvelée tous les trois ans. Le mois de septembre est le meilleur moment pour la plantation des fraisiers.

Asperge grosse hâtive d'Argenteuil, fortes plantes. Livr. à part. du 15 mars

Une notice détaillée est jointe à chaque envoi de plantes d'asperges.

Chou-marin (Crambé maritime). Légume précieux (manque)

Le cent	Les dix	Pièce
36 00	4 60	0 80
—	—	—

FRAISIERS.

Livrables en septembre-octobre et en mars-avril.

1. DE PREMIÈRE SAISON.

Noble (Laxton). Fruit gros, parfumé. Très hâtif et productif; hors ligne.

Professeur Burvenich. Enorme. Pour sols secs. Très hâtif, vig. et fertile.

Louis Vilmorin. Fruit petit, juteux et parfumé. Hâtif, assez vig., fertile.

30 00	4 00	—
30 00	4 00	—
30 00	4 00	—

2. DE DEUXIÈME SAISON.

Madame Moutot (fraise tomate). Enorme. Exquise. De marché

Jucunda. Gros fruit juteux, excellent. Extra-vigoureux. De commerce. .

Docteur Nicaise. Fruits monstrueux; chair rouge pâle, bonne

St-Lambert. Variété liégeoise. Beau fruit, gros, rouge-noir, exc. (manque).

Ville de Caen. Fruits volumineux, rouge vif. Chair ferme très sucrée . .

30 00	4 00	—
30 00	4 00	—
30 00	4 00	—
—	—	—
30 00	4 00	—

3. REMONTANTS OU A DEUX RÉCOLTES.

Pour obtenir le maximum de rendement à la seconde floraison, il faut renoncer à la première récolte et supprimer tous les boutons qui apparaissent en mai-juin.

Merveille de France. Fruit énorme, à chair très ferme (manque).

—	—	—
---	---	---



Fraise Madame Moutot.



Nos clients trouveront à la page ci-contre les quelques espèces qui supportent assez bien le transport et que nous pourrions fournir, en plantes saines, trapues et munies d'un bon chevelu.

Ces plantes seront expédiées dès qu'elles seront à point, et dans l'ordre d'arrivée des commandes. Les époques de livraison que nous prévoyons sont approximatives: quelques semaines de mauvais temps peuvent causer à la végétation des retards considérables. Souvent même, nous sommes obligés de faire plusieurs envois successifs, lorsque certaines plantes sont déjà à point alors que d'autres réclament encore beaucoup de soins. Evidemment, nous cherchons toujours à réduire ces frais supplémentaires au minimum.

Les envois de plantes de mai sont parfois surpris par les premières chaleurs, et nous ne pouvons en garantir l'arrivée en bon état.

SEMEZ VOUS-MEME TOUTES LES PLANTES DONT VOUS AVEZ BESOIN.

Il serait préférable que chaque amateur sème lui-même les plantes qu'il devra repiquer. Sans matériel spécial, sans grand travail, sans dépenser beaucoup de place, chacun peut y arriver et réaliser ainsi une sérieuse économie tout en s'assurant des plantes de première fraîcheur et de reprise parfaite.

PLANTES POTAGÈRES.

Tout au début de mars, semez en pépinière, sur cote (bande de terrain le long d'une haie ou d'un mur exposés au midi): choux blancs et rouges, choux de Milan et laitues pommées printanières. Semez aussi sur couche ou en caissettes: céleris, choux-fleurs, poireaux hâtifs et tomates. Placez les caissettes dans la cuisine jusqu'à germination, puis sortez-les quand il ne gèle pas pour accoutumer peu à peu les plantes à l'air extérieur. Quand celles-ci ont quelques feuilles, repiquez-les une première fois en caissettes. Ainsi, vous disposerez au 15 mai de tout un choix de belles plantes.

Repiquez vos tomates au pied d'un mur bien exposé ou sur une plate-bande abritée. Vous les cultiveriez: en espalier, sur deux branches portant chacune deux bouquets ou en échelas, sur une branche portant trois bouquets. Pincez à une ou deux feuilles au-dessus du dernier bouquet. Supprimez les ramifications latérales inutiles au-dessus de chaque bouquet. Pincez les ailerons à l'aisselle des feuilles.

Fin mars-avril, semez en pépinière, en pleine terre: choux de Bruxelles et choux verts non pommés que vous repiquerez, au 15 juin, entre les pommes de terre hâtives. Faites aussi un second semis de poireaux tardifs (à hiverner), que vous repiquerez fin mai-juin.

Fin mai-juin, semez également en pépinière, en pleine terre: chicorées-endives, chicorées-scaroles et laitues pommées d'été. Ces légumes seront prêts pour le repiquage au moment où vos carrés d'échalotes, fèves de marais, pois printaniers et pommes de terre hâtives deviendront libres.

PLANTES DE FLEURS.

SEMIS EN PLACE. — Avant de vous parler des plantes à repiquer, nous devons vous dire un mot des belles fleurs annuelles à semer en place, ressource précieuse et souvent inconnue des amateurs.

Ces semis se font en avril-mai, à la volée, dans les parterres, dont on a terrauté et ameubli le sol. Enterrez à peine les graines, surtout celles qui sont très fines. Arrosez en cas de sécheresse.

Au plein soleil, semez: Belle-de-jour avec bordure de Pourpier; Chrysanthème à carène: bordure de Phacelia; Lupin annuel: bordure de Capucine naine Impératrice des Indes; Malope: bordure d'Alyssum maritimum; Pieds d'aloette annuels: bordure de Thlaspi blanc; Salpiglossis: bordure de Phacelia.

Au soleil ou à mi-ombre indifféremment: Clarkia avec bordure de Nigelle, Coréopsis avec bordure de Godetia Whitneyi nain, Cosmos avec bordure de Julienne de Mahon, Souci avec bordure de Némophile. Enfin, spécialement à mi-ombre, vous sèmerez la Belle-de-Nuit avec bordure d'Asperule azurea.

Vous trouverez toutes ces fleurs dans la nomenclature alphabétique des graines de fleurs, pages 31 à 40.

PLANTES A REPIQUER. — Les fleurs à semer pour les repiquages de mai-juin sont nombreuses. Les semis se feront sur couche chaude ou en caissettes, comme il est dit ci-dessus.

Vous sèmerez ainsi, en janvier-février, l'Éillet Marguerite et l'Éillet perpétuel géant, race Chabaud, Cinéraire maritime, Cobée, Dahlia simple nain, Giroflées quarantaines d'été, Immortelles, Lobélia érinus, Pétunias, Phlox de Drummond, Perilla, Tabac, Verveines hybrides et venosa.

Fin mars, encore en caissettes: Balsamines, Dimorphothea, Immortelles, Kochia, Éillets de Chine, Reines-Marguerites, Tagètes et Zinnias. En avril, en pleine terre: Pyrethrus.

Voici maintenant un choix de massifs convenant pour toutes les expositions ensoleillées.

Massif de:	Amarante crête de coq	avec bordure:	Pyrethrum.
»	Balsamine ou Célosie	»	» Cinéraire maritime.
»	Dahlia simple nain.	»	» double de Tagète signata.
»	Giroflée d'été ou Reine-Marguerite	»	» Tagète patula.
»	Immortelle ou Muflier haut	»	» Tagète signata.
»	Muflier nain	»	» Lobélia érinus.
»	Éillet de Chine	»	» Pyrethrum ou Cinéraire maritime.
»	Éillet Marguerite et perpétuel	»	» double de Tagète patula.
»	Pentstémon ou Tabacs	»	» Périlla.
»	Pétunia ou Phlox de Drummond	»	» double: Lobélia et Pyrethrum.
»	Verveine hybride	»	» double: Lobélia et Pyrethrum.
»	Verveine venosa ou Zinnia	»	» Tagète patula.

A mi-ombre, vous planterez: Giroflée quarantaine avec bordure de Tagète patula, Muflier haut avec bordure de Muflier nain, Verveine hybride ou venosa avec bordure de Tagète patula.

Dans vos bacs et pots, au soleil, repiquez en mai-juin: Giroflées 40^{ans}, Kochia, Lobélias érinus, Éillets, Pétunias, Reines-Marguerites, Verveines et Zinnias. A mi-ombre: Giroflées, Kochia et Verveines. Enfin, comme plante grimpante, pour toutes expositions, en bacs ou en pleine terre, employez la Cobée.

PLANTES DE BOUTURES. — Certaines plantes ne donnent une belle floraison qu'à condition d'être multipliées par bouture. L'amateur peut difficilement les produire. Mais nous pourrions lui en fournir.

En plein soleil, on plantera: Bégonia semperflorens: bordure d'Agératum; Géranium de corbeilles et Géranium-lierre: bordure de Cinéraire maritime; Hélotrope: bordure de Tagète patula; Éillet remontant: bordure de Tagète patula; Salvia: double bordure de Lobélia et de Pyrethrum. A mi-ombre: Bégonia semperflorens et surtout Fuchsia. A l'ombre: Fuchsia.

Toutes ces plantes peuvent également se cultiver en pots, bacs, vases, placés aux mêmes expositions. Pour les vases suspendus, les Géraniums-liers sont inégaux. Enfin, Fuchsia, Géranium de pots et Hélotrope sont parmi les belles fleurs pour l'intérieur des appartements.

PLANTES POTAGÈRES.

	Le cent	Les dix	Pièce
Céleris, livrables fin mai-juin, dans les variétés ci-après	7 00	—	—
à côtes, plein blanc court hâtif	—	—	—
à côtes, plein blanc doré Chemin	—	—	—
à jets fins, pour potages	—	—	—
à jets fins, pour potages	—	—	—
à jets fins, pour potages	—	—	—
Choux, livrables en mai-juin, dans les variétés ci-après	5 00	—	—
cabus blanc	—	—	—
cabus blanc, pain de sucre	—	—	—
cabus rouge	—	—	—
de Milan hâtif, de Savoie	—	—	—
de Milan hâtif, de Savoie	—	—	—
Choux-fleurs, livrables de fin mai à août	8 00	—	—
Poireaux, livrables du début de juin à fin juillet	5 00	—	—
Tomates, fortes plantes, en mottes. Livrables fin avril-mai	45 00	5 00	—

PLANTES DE FLEURS.

(Livrables à partir du 15 mai.)

	Distance	Le cent	Les dix	Pièce
Agératum du Mexique nain bleu, en boutures. Pour bordures	15	27 00	3 50	—
Begonia semperflorens gracilis rose, en mottes. Bordures, dessins	20	50 00	6 00	1 00
— semperflorens lumineux rouge, en mottes. Toutes situations	»	50 00	6 00	1 00
Canna florifère, race Crozy, en végétation, collection avec noms	50 à 60	—	30 00	3 50
— florifère, à feuilles pourpres, en végét., collection avec noms	50 à 60	—	30 00	3 50
Cobée scandens (sujets tuteurs en mottes). Atteint 6 à 7 mètres	—	100 00	12 00	1 60
Cosmos hybride à gde fleur, varié. Marguerites roses et blanches	40 à 50	24 00	3 20	—
Dahlia double à fleur de Cactus, en boutures, avec noms	1 ^{re} 50	—	20 00	2 50
— double, à fleur de Cactus, décoratif, en boutures avec noms	»	—	20 00	2 50
Fuchsia globosa hybride, pour massifs à mi-ombre, pots, etc.	35 à 40	100 00	12 00	1 60
Geranium de corbeilles, rouge. Massifs et pots au soleil	»	160 00	18 00	2 20
— de corbeilles, rose. Jolis contrastes avec le rouge.	»	160 00	18 00	2 20
— de corbeilles, blanc. S'harmonise bien avec les précédents.	»	160 00	18 00	2 20
— de corbeilles, saumon, très jolie teinte.	»	160 00	18 00	2 20
— lierre (peltatum) rose. Superbes vases suspendus, au soleil	»	160 00	18 00	2 20
— lierre (peltatum), en beau mélange. Retombant, très joli	»	160 00	18 00	2 20
— de pots, belles variétés d'appartement, coloris splendides	—	—	20 00	2 50
Héliotrope, en boutures. Belles corbeilles, pots; odeur suave.	35 à 40	100 00	12 00	1 60
Lobelia erinus Crystal Palace, nain bleu. Bordures, tapis, etc.	15	24 00	3 20	—
Muflier grand varié. Vient partout, à toute situation	35 à 40	20 00	2 80	—
Némésia nain compact varié. Touffes de petites fleurs brillantes.	20 à 25	30 00	4 00	—
Œillet de Chine de Heddewig, double, à fleur énorme. Coloris vifs	25 à 30	24 00	3 20	—
— perpétuel géant double (Chabaud), varié. Semis de l'année	»	60 00	7 00	1 10
Périlla de Nankin, à feuillage pourpre-noir. Bordures, corbeilles	20	20 00	2 80	—
Pétunia hybride, en beau mélange. Massifs, pots, vases suspendus	»	24 00	3 20	—
— hybride à grande fleur. Fleurs énormes, ondulées	»	40 00	5 00	—
Phlox de Drummond à grande fleur, varié. Jolis bouquets	»	24 00	3 20	—
Pyrethrum, jaune d'or. La plus belle bordure	15	20 00	2 80	—
Reine-Marguerite Mammouth, variété extra. Massifs au soleil	25 à 30	24 00	3 20	—
— Comète, demi-naine, variée	»	24 00	3 20	—
— Plume d'Autruche, fleurs blanc pur, très gracieuses	»	24 00	3 20	—
— Unicum (Electrique), à fleur rayonnante	»	24 00	3 20	—
Salvia splendens, Incendie, en boutures. Longs épis rouge feu	30 à 35	120 00	14 00	1 80
Tagète patula, œillet d'Inde, La Légion d'Honneur. Bordures	25 à 30	20 00	2 80	—
Verveine hybride ou des jardins, bonnes plantes. Jolis massifs	40 à 45	24 00	3 20	—
Zinnia élégant double, varié. Sols secs. Corbeilles en plein soleil	35	24 00	3 20	—
Oignons à fleurs à floraison estivale: voyez page 44	—	—	—	—
Plantes vivaces à floraison estivale: voyez pages 57 à 60.	—	—	—	—

CHRYSANTHÈMES.(Livrables à partir du 1^{er} mai.)

	Le cent	Les dix	Pièce
Chrysanthème du Japon, à grosses fleurs tubulées, incurvées, échevelées, en très belles variétés à notre choix, fortes boutures	150 00	17 00	2 10
Chrysanthème à petites fleurs. Pour la Toussaint. Fortes boutures.	110 00	13 00	1 70
— de l'Inde, double, précoce, vivace. Jolis pompons. Fleurit tout l'été.	110 00	13 00	1 70





Vérification des commandes exécutées.
Verificatie der uitgevoerde bestellingen.



Emballage des commandes.
Inpakking der bestellingen.



-Scellage et étiquetage des colis.
De colli's worden verzegeld.



Chargement des colis.
Oplading der colli's.



Un envoi postal journalier.
Een dagelijksche postverzending.



Dépôt des colis à la gare.
Aflevering der colli's aan het station.



Service des factures.
Afdeling der facturen.



Service publicité et envoi catalogues.
Afdeling : publiciteit en verzending van catalogussen.



Bureau des services généraux.
Kantoor van algemeene werkzaamheden.



Sortie du personnel.
Uitgang van het personeel.

ALGEMEENE CATALOGUS VAN CH. GONTHIER FILS

HUIS J. & A. DONY, GESTICHT IN 1846

VEREDELDE ZADEN EN PLANTEN

KANTOREN, MAGAZIJNEN EN TEELTGRONDEN

KANTOOR VOOR FRANKRIJK

WANZE (HOEI)
BELGIË



ST-QUENTIN (AISNE)
FRANKRIJK

R. C. HOEI 1.
TELEFOON : HOEI 142
TELEGRAMMEN : GONTHIER HOEI
STATION : STATTE
POSTCHECKREKENING : N° 137

R. C. AISNE 8875
TELEFOON : ST-QUENTIN 2896
TELEGR. : GONTHIER ST-QUENTIN
STATION : ST-QUENTIN
POSTREKENING : PARIJS 276.40

INHOUD :

Groentezaden:	BLZ.	Boomen, Rozelaars en Heesters:	BLZ.
Moestuinkalender	2	Fruitboomen	45
Naamlijst	3	Rozelaars	50
Sorteringen	25	Sierheesters	54
Ingemaakte groenten	26	Moesplanten:	
Bloemzaden:		Tweejarige planten	56
Bladzijde van den kleinen Hefhebbet	27	Doorlevende planten	56
Bloestuinkalender	28	Bloemplanten:	
Naamlijst	30	Tweejarige planten	56
Pronkerwt in variëteiten	39	Doorlevende planten	57
Verzamelingen	40	Moesplanten, leverbaar in Maart:	
Sorteringen	40	Asperges	61
Tuinbouwbenodigdheden en mest-		Aardbezieplanten	61
stoffen	41	Planten, leverbaar in Mei	62
Voederzaden	42	Algemeene verkoopvoorwaarden	64
Bloembollen	44		

LENTE 1932

ONZE FOTOGRAFISCHE OMSLAG.

De omslag van onzen catalogus stelt een hoekje voor van een binnenhuisje, versierd met getijgerde lilies, alsook een afzonderlijken tak van dezelfde lillie, wonderschoone gloeiend oranjeleukige bloem, gemakkelijk te telen en een buitengewoon groot effect makend. (Zie Hoofdstuk: Bloembollen, blz. 44.)

ONZE GRAVURE OP ZILVEREN GROND.

Dit jaar voegen wij bij onzen catalogus een kleurenfoto van rozen op zilveren grond.

Deze grond, zoo glad en glanzend, is niets anders dan een uiterst dun blad aluminium, op karton geplakt. Wij hopen dat dit staalje van een nieuwe werkwijze U zal bevalen en dat U het sult benutten om een hoekje van uw woning te versieren.

Het stelt eenige schoone bloemen voor van hoogstammige rozelaars, waarvan wij een heerlijke verzameling bezitten (zie blz. 51). Deze groote zoo smaakvolle sierboompjes nemen om zoo te zeggen geen plaats in en zijn zeer kostbaar voor kleine tuinen, waar ze de groentebedden omgeven en met hun lieve bloemtuilen prijken zonder bij de groenteteelt te hinderen.

ONZE PREMIE VOOR SAMENGEVOEGDE BESTELLINGEN.

Wij vragen onze klanten van onze tweede bestellijst gebruik te maken om ons, met de hunne, de bestelling van een nieuwen klant over te maken. Aan allen, die ons het genoegen zullen doen aldus twee of zelfs verscheidene bestellingen te vereenigen, bieden wij, voor elke toegevoegde bestelling, een premie, onder uitdrukkelijke voorwaarde dat iedere bestelling het volledig adres drage van den nieuwen klant.

Deze premie zal zijn naar keus: of wel een schoone moderne lampekap van dik stevig perkamentpapier en gemakkelijk ineen te zetten, of wel 2 pakjes groente- of bloemzaden, die zij zullen aanduiden.

De personen die recht hebben op een dezer premien zullen er zorg voor dragen ze in te schrijven op de 2^e bladzijde van hun persoonlijke bestellijst.

Wij vereenigen altijd in een enkele zending de bestellingen, die ons aldus samengevoegd toegestuurd worden, tenzij de klant ons uitdrukkelijk het tegenovergestelde vraagt.

MOESTUINKALENDER.

Hierna geven wij een moestuinkalender op, dien wij zoo praktisch mogelijk opgesteld hebben. De werkzaamheden, welke moeten uitgevoerd worden, zijn in verschillende groepen verdeeld:

1. — Het zaaien ter plaatse in alle tuinen.
2. — Het zaaien op kweekbed, waarmede vele liefhebbers zich niet bezighouden, hetzij zij over het noodige materieel niet beschikken of het eenvoudiger vinden de te verpoten planten te koop.
3. — Planten om te verpoten. Liefhebbers, die niet zouden gezaaid hebben, zullen op bladzijde 63 van onzen catalogus de lijst vinden van planten geschikt voor het verpoten, die door ons op geschikten tijd zullen geleverd worden

4. — Wat men kan zaaien en planten wanneer men over eenen grooten tuin beschikt of als men groenten telen wil, die of wel in ons klimaat niet tot hun volle recht komen, of wel weinig gekend zijn en afwijken van de gewoonlijk geplante groenten.

Op al onze zaadpakjes is de zaaitijd, alsook de manier van telen aangeduid. Maar de aangegevene datums hangen af van de weergestelden; bij gewone jaren zijn ze normaal voor de teelten in de vallei der Maas. In zandachtige gronden, die gemakkelijk warm worden, zal men eenige dagen vroeger kunnen beginnen. Maar in min of meer koude, zware, kleiachtige gronden, blootgesteld aan vorst, zal men maar zaaien wanneer de grond goed verwarmd is en zich gemakkelijk laat bewerken. Men zal, zooals het maar al te dikwijls gebeurt, de eerste zonnestralen der maand Februari niet betrouwen.

In onzen moestuinkalender herhalen wij niet de volgende groentesoorten, welke men opvolgentlijk gedurende den Zomer kan zaaien:

Alle maanden van Mei tot Juli: mag men hofmelde zaaien; en van Maart tot Augustus: tuinkers, kervel en spinazie. Van Maart tot in Augustus mag men maandelijks latuwtuinen; van Juni tot in Augustus gekrulde andijvie en scarol andijvie. Plant geheel het jaar door: kampernoelie.

In Januari

men kan op warme broeilaag zaaien, om te forceeren: bleekselderij, steeksla en gottesalade, konkommers, ajuinen van Madeira.

Begin Februari

men kan op warme broeilaag zaaien, om te forceeren: vroege prei, erwten, vroege lage labboon.

Einde Feb./begin Maart

men zaait op warme broeilaag: lente- en zomerlatuwtuinen, prei, tabak.
men zaait onder glasbeschutting of in open lucht; korte of halflange vroege wortel, vroege snijlatuwtuinen, witte en roode koolen.
men plant: koolen, die men heeft laten overwinteren, en lookbollen
men kan nog op warme broeilaag zaaien: pompoenen, Nieuw-Zeelandsche spinazie, waterkers.

Met half Maart

men kan nog in open lucht zaaien: raapkoolen, cichorei, labboonen, savoiekkoolen.
men zaait ter plaatse: vroege radijsjes, kervel, spinazie, tuinkers, snijlatuwtuinen, labboonen, vroege radijs, erwten, ajuin.

Einde Maart/begin April

men zaait op kweekbed: lente- en zomerlatuwtuinen, prei, koolen, zomerbloemkool.
men zaait op warme broeilaag: tomaten, bleekselderij, raapselderij.
men plant ter plaatse: sjalotten, ajuinen van Mulhouse, lentebloemkool.
men kan nog zaaien: suikerijls, pastinaken.
men zaait ter plaatse: halflange wortel, peterselie, zuring.

In April

men zaait op kweekbed: spruitkoolen.
men zaait op warme broeilaag: meloenen.
men plant ter plaatse: vroege aardappelen en aardbeziën.
men kan nog zaaien, in open lucht: savoiekkoolen, ajuinen, prei.
men zaait ter plaatse: ajuinen om in te leggen, vroege en middenseizoen erwten, vroege zwarte Belgische struikboon.

Begin Mei

men plant ter plaatse: late aardappelen, zomerlatuwtuinen.
men kan nog zaaien: konkommers, gewone snijbiet, waterkers, gekrulde andijvie, zomerbloemkool, vroege radijsjes.

Rond half Mei

men zaait ter plaatse: late winterwortel, schorseneer, boksbaard.
men zaait op kweekbed: late savoiekkoolen.
men kan nog zaaien: halflange wortel, molsalade, tuinbeet, hofmelde, snijbiet met eetbare bladstelen, kardoelen, prei, koolrapen, middenseizoen erwten.
men zaait ter plaatse: cichorei witloof, zomerradijsjes, postelein, erwten (middenseizoen en late), struikboonen (10 Mei), staakboonen (15-20 Mei).

Begin Juni

men zaait op kweekbed: spruitkoolen, late bloemkool.
men plant ter plaatse: tomaten, bleekselderij, raapselderij, prei, spruitkool, melkool, zomerbloemkool, meloenen, tabak.
men kan nog zaaien: cichorei capucienbaard en koffiecichorei, Nieuw-Zeelandsche spinazie, bleekselderij.

In Juni

men zaait ter plaatse: halflange wortel, zomerlatuwtuinen (op kweekbed).
men plant ter plaatse: prei, winterkool.
men kan nog zaaien: gekrulde en ongekrulde andijvie, winterbloemkool of brocoli.
men kan nog planten: savoiekkoolen voor wintervoorraad.
men zaait ter plaatse: lange winterradijsjes, gekrulde andijvie (op kweekbed).
men plant: selderij, late savoiekkool, spruitkool.

Einde Juni/begin Juli

men kan nog zaaien: pastinaken, zomerradijsjes, hofmelde, snijbiet, staakboonen, selderij.
men kan nog planten: zomerbloemkool.
men zaait op kweekbed: raapkoolen.

In Juli

men plant: late bloemkoolen.
men zaait: korte Hollandsche wortel, ronde winterradijs, peterselie, veldsla.
men kan nog zaaien: winterpostelein, zuring van Belleville, vroege erwten, zwarte Belgische struikboon, zomerlatuwtuinen (op kweekbed).

Einde Juli/begin Aug.

men kan nog planten: spruitkool, winterbloemkool.
men zaait: tuinrapen, gekrulde en ongekrulde andijvie.
men plant: raapkoolen.
men kan nog zaaien: halflange roosachtige Chineesche radijs, winterpostelein, spinazie, zomerlatuwtuinen.

In Augustus

men zaait ter plaatse: vroege witte ajuin, kervel, spinazie, doorlevende spinazie, veldsla.
men zaait op kweekbed: roode en witte kabuiskoolen en savoiekkoolen.

Einde Augustus/Sept.

men zaait op kweekbed: winterlatuwtuinen, vroege bloemkool.
men kan nog zaaien: kervel.

Begin October

men plant: aardbeziën.
men plant: winterlatuwtuinen en winterkoolen.

OVERBLIJVENDE PLANTEN EN SPECERIJKRUIDEN.

In Februari

men zaait op warme broeilaag: artisjok, zeekool

Rond half Maart

men zaait op warme broeilaag: rabarber, peperplant.

men zaait: engelkruid, eierplant, basilik, pimpernel.

men plant: engelkruid, zeekool, dragonkruid, venkel, hysoep, lavendel, marjolein, muntkruid, ramonas, rabarber, rozemarijn, wijnruit, boonenkruide, salie, tijm, bieslook, zuring.

In April

men zaait: alsen, anijs, asperge, basilikkruid, bernagie, venkel, hysoep, lavendel, marjolein, citroenkruid, rozemarijn, wijnruit, boonenkruide, salie, tijm.

In Mei

men plant: asperge, artisjok.
men plant: karvij.

GROENTEZADEN

HOE MEN MOET ZAAIEN.



Wij achten het nuttig voor de personen, die weinig op de hoogte zijn van tuinbouw, de hoofdzakelijke regels van de bezaaiing der tuinen samen te vatten. De aandacht, die wij wijden aan de goede hoedanigheid, aan de hoogte kiemkracht der zaden, en de zorg die wij besteden aan de teeltkeus der variëteiten, zijn dusdanig dat het waarlijk betreurenswaardig zou zijn, dat onze klanten zich, bij gebrek aan ondervinding, aan slechte uitslagen zouden blootstellen. Na deze enkele aanduidingen gelezen te hebben zullen onze klanten zoo goed willen zijn ook de aanwijzingen, bladzijde 62, te raadplegen; zij zullen er nuttige inlichtingen vinden aangaande de zaaiingen van pootplanten.

ZAAIING OP BROEIBED.

Spread op den grond een laag verschen paardenmest uit, met een derde droge bladeren vermengd, in Januari ter dikte van 70 a 80 cm., in Februari-Maart 60 cm., in April 40 cm. Leg op deze laag een plank, ongeveer 30 cm. hoog raam en laat de laag rondom 30 cm. uitkomen. Bedek het raam met een ruit. Een week later, als de broeilaag haar vuur gegeven heeft, vul het raam met lichte, goed vastgedrukte aarde, tot 7 a 8 cm. van den rand en, als deze verwarmd is, zaai dun, zorg dragende de zaden niet te diep te leggen. Bedek de ruit met stroodekken. Leg van Januari tot Maart, rond den broeibak, een 30 cm. dikke mestlaag, die U van tijd tot tijd mengelt en hernieuwt. Neem, als de eerste scheutjes verschijnen, het stroodek weg over dag maar leg het 's nachts terug, zoolang het koud is. Verlucht zooveel mogelijk.

ZAAIING ONDER BESCHUTTING.

Kies een hoekje uit tegen de noordenwinden beschut. Vermeng de aarde met bladeren, allerhande afval, paarden- en konijnenmest. Begiet overvloedig, zoo mogelijk met aalt; druk daarna de aarde goed vast. Leg op het aldus verbeterde deel een raam met ruit zooals men gebruikt voor een broeibed. Vul het met teelaarde (humus uit de ontbinding van plantenafval ontstaan, met aarde, stalmost en kalk of assche vermengd); zaai vervolgens en verzorg zooals voor den broeibak.

ZAAIING IN VOLLEN GROND.

Zaai niet te vroeg. — Het is beter niet te zaaien dan te zaaien in een vochtige, niet verwarmde aarde. Het welslagen van dit werk hangt van den toestand van den grond af.

Bereid den grond goed toe. — Bewerk en verkruiemel de aarde. Laat ze goed opdrogen. In vaste gronden wordt zij vastgestampt en krachtig geharkt, om de kluiten te verbrijzelen. Trek de voortjes en dek ze, na gezaaid te hebben, slechts toe, als ze goed opgedroogd zijn. Druk den grond nooit vast na de eerste zaaiingen in het voorjaar. Vermijd vooral een nog vochtigen grond te bewerken.

Leg de zaden niet te diep. — Bedek de zaden in verhouding met hun dikte: de fijne, nauwelijks; de middelmatig dikke (ajuin, wortelen), met 1 of 2 cm. aarde of teelaarde; de vleezige (erwten, bonen), met 3 of 4 cm. fijne, gezifte assche (teelaarde vermijden). Hoe zwaarder en kouder de grond is, hoe minder diep men de zaden moet leggen, en omgekeerd.



AJUINEN.



N° 420. — Koningin-ajuin.

Om gedurende het gansche jaar ajuin te hebben: 1. Zaaït men rond 15 Augustus de vroege witte ajuin; gedurende den Winter, met dore bladeren beschutten. Oogsten in Mei-Juni. 2. Men plant ajuin van Mulhouse in Februari-Maart om in Juni-Juli te oogsten. 3. Men zaaït provisie-ajuin in Maart om in Augustus te oogsten en gedurende den Winter te bewaren.

Om schoone provisie-ajunten te oogsten moet men den grond goed bewerken, rijke en wel verteerde meststoffen er over uitspreiden, zooals hoender- en duivendrek, mestaarde, om ze zeer oppervlakkig in te graven. Hierbij voegt men, per m²: 60 gr. sodanitraat, 80 gr. kalksuperphosphaat, en 30 gr. potasch-sulfaat. In Maart-April, in rijen met 25 cm. tusschenwijdte zaaien. Als de jonge planten 10 cm. hoog zijn, dunt men ze uit op een afstand van 10 cm. Bij aanhoudend droog weder strooit men mestaarde tusschen de lijnen en begiet men overvloedig met klaar water, langs de lijnen. De stengels drukt men neer in het begin van Augustus. Als deze verdroogd zijn, oogst men de ajunten en spreidt men ze op den zolder uit, waar ze volkomen rijp zullen worden. Bij vorst moet men vermijden de ajuinbollen aan te raken.

Om reusachtige ajunten voor tentoonstellingen te bekomen, kiest men variëteiten die een groote ontwikkeling kunnen nemen, zooals de platte ronde van Madeira, de reusachtige van Zittau en zelfs de stroogeel van Vertus en de bleekroode van Hoel. Men zaaït op warme broeilaag in Januari, verplant op broeilaag in Maart, om in April met aardkluit in als hierboven aangeduid voorbereiden grond op een afstand van 40 cm. tusschen de rijen en 20 cm. in de rij te planten. De stengels neerdrücken in het begin van Augustus. Aldus zal men ajunten van 20, 30 zelfs 40 cm. omtrek kunnen bekomen.

Onze klanten zouden ons verplichten met onze bestellijst te gebruiken. Opgemaakt volgens de volgorde van den catalogus, voorkomt zij alle vergissing of verwarring.

Daar al onze zakjes vooruit gereedgemaakt zijn, is het ons onmogelijk ze te verdeelen.

1. VROEGE AJUINEN.**402 Witte Parijsche**

Middelmatig dikke, zilverwitte, platte bol. Volkomen bestand tegen koude en uitstekend om te bewaren. De beste vroege ajuin. Zaailing in Augustus.

403 Dikke witte

Dikke bol met niet zeer vast vleesch en zoet van smaak. Wat minder goed om te bewaren, maar veel opbrengend.

2. PROVISIEAJUINEN.**405 Bleekroode van Hoel**

Kg.: 86 00; 205 gr.: 25 00

Sedert lange jaren op onze teeltgronden veredeld, heeft deze zich wonderwel aangepast aan ons klimaat en gedijt er beter dan al de andere. Zeer groote, bleek wijnroode, snelgroeiende bol van allereerste hoedanigheid, extra om te bewaren.

408 Donkerroode, goed om te bewaren. Kg.: 106 00; 250 gr.: 30 00

Middelmatig dik, zeer plat, violetachtig donkerrood. Vuurrood vleesch. Ook een uitmuntende, veel opbrengende, zeer geharde variëteit, gemakkelijk te telen en bijzonder goed om te bewaren.

410 Stroogeel van Vertus Kg.: 80 00; 250 gr.: 23 00

Zeer dikke, koperkleurige, platte bol. Groeit tamelijk langzaam, blijft buitengewoon lang goed, langer zelfs misschien dan de roode, die beter van smaak zijn. Uitstekende variëteit, veel gebruikt voor teelt in 't groot, vooral rond Parijs.

411 Gele reuzenajuin van Zittau.

Zeer goede variëteit. Dikke, zeer vaste, zeer harde, schoon gele ajuin. Veel opbrengend en uitmuntend om te bewaren.

3. AJUINEN OM IN TE MAKEN.**420 Koningin, zeer vroege, witte**

Uiterst vroeg. Vormt in twee maanden mooie, zilverwitte bolletjes, extra om in te maken. Te verkiezen boven de Nocera-variëteit, die een strekking heeft om dik te worden en te verbasteren.

4. MADEIRA-AJUINEN.**424 Ronde, zeer dikke van Madeira.**


Reuzige, zoetsmakende bol, waarvan de diameter 20 cm. bereikt. Vooral gekweekt voor uitstallingen en tentoonstellingen.

5. AJUINEN VAN MULHOUSE.**427 Gele van Mulhouse Kg.: 19 00; 500 gr.: 10 00; 250 gr.: 5 40**

Middelmatig dik, rond, koperkleurig geel. Wordt herplant in Februari-Maart. Groeit snel.

Zakje	15 gr.	30 gr.	100 gr.
2 20	4 30	7 50	—
1 40	2 50	4 30	—
1 40	2 80	4 60	12 00
1 60	3 50	5 40	14 00
1 20	2 50	4 30	11 00
1 60	3 50	5 40	—
2 20	4 30	7 50	19 00
1 90	4 00	7 00	—
—	—	—	2 80

ANDIJVIE.



N° 125. — Groene ongekrulde.

Andijvie is een uitstekende groente. Zij verschaft ons uitmuntende salade. Gekookt heeft zij een aangename bitteren smaak en is weldoend voor de maag.

Zaai de altijd witte, vroegste, gekrulde andijvie ter plaats rond 15^e April. Om ze te oogsten snijdt men ze achtereenvolgens af, dicht boven den grond, in Juni, Juli en Augustus.

Zaai de andere gekrulde andijvie en zelfs de ongekrulde einde Mel-Juni om in Juli te verpoten. Bind, als de planten volkomen ontwikkeld zijn, de bladeren samen om ze te laten wit worden. De oogst begint veertien dagen later en wordt voortgezet zelfs bij vriesweer op voorwaarde, dat men de planten bijtijds met zakken bedekt.

Andijvie kan men zeer goed 's Winters bewaren. Leg een goed zaaibed aan rond 15^e Juli en verpoot einde Augustus. Doe in October, bij droog weder, de planten uit, bind ze op en verplant ze in een 30 cm. diepe groeve, die U open laat, maar met zakken toedekt, zoodra het dreigt te vriezen. U zult gansch den Winter oogsten.

1. GEKRULDE ANDIJVIE.

	Zakje	15 gr.	30 gr.	100 gr.
108 Altijd witte Gekruld, wit. Ter plaats gezaaid wordt afgesneden gelijk de latuw.	1 60	3 50	5 40	—
110 Fijngekrulde zomerandijvie of Italiaansche Ingesneden. Vol hart, rozige nerven. Goed om te forceeren.	1 40	3 00	5 00	—
115 Keizerlijke of Bengaalsche Hooge welgevulde, blondgroene krop. Uitstekende zomervariëteit.	1 60	3 50	5 40	—
116 Van Louviers Lage, bolronde dichte rozet. Vol hart. Neemt weinig plaats in.	1 40	3 00	5 00	—
117 Van Meaux Uitgespreide rozet. Bestand tegen hitte. Voor den Herfst.	1 40	3 00	5 00	—
118 Groote Pancalière Zeer taal. Rechtop groeiend blad. Verbleekt bijna natuurlijk.	1 40	3 00	5 00	13 00
120 Rouaansche of corne de cerf Breed, zeer vol. Gehard. Voor vochtige gronden en voor Herfst.	1 40	3 00	5 00	—
122 Van Ruffec Fijn gekruld, zeer breed, dicht, goed vol. Even geschikt voor Zomer en Winter en wonderwel bestand tegen koude. Extra.	1 20	2 50	4 30	11 00

2. ONGEKRULDE ANDIJVIE.

125 Groene, ronde, met vol hart Zeer dikke krop. Breede bladeren met dikke, witte nerven, die in 't midden een soort van wit hart vormen.	1 20	2 50	4 30	11 00
126 Breede, goudgele, met vol hart Gelijkvormig met de voorgaande, maar met blonde bladeren.	1 40	3 00	5 00	—
11 Artisjok, groene van Laon. Gehard. Zeer groot bloemhoofdje. Zaai in kleine potten onder beschutsel. Men zaait zelfs in vollen grond na 15 April.	4 00	15 00	—	—
14 Asperge, dikke vroege van Argenteuil Zeer groote lekkere keurvariëteit. Te zaaien in Maart. Men plant ook klauwtjes in April. (Zie aspergeklauwtjes, blz. 61.)	1 00	1 80	3 00	7 50

AUGURK (CORNICHON).

235 Augurk, kleine groene Parijsche	1 00	2 50	4 30	—
---	------	------	------	---

BEETWORTELEN (TUINBEETEN).

30 Zwartroode, platronde Egyptische	1 00	1 60	2 80	6 50
31 Zwartroode halflange « Nec plus ultra »	1 00	1 60	2 50	6 00
39 Zwartroode, dikke, lange Men gebruikt deze tuinbeeten in azijn ingelegd, in den oven gebakken of in stukjes gesneden in sla. Zaaien in Mei; oogst in September. Bewaren in den Winter zooals wortelen.	1 00	1 60	2 50	6 00
223 Bieslook, vroeg, wit Lange, fijne bladeren met kenmerkenden ajuinsmaak. Boksbaard: zie Schorseneeren.	1 90	4 00	7 00	—

BOONEN.



N° 313. — Staakprinsessenboonen zonder draad.

De boonen zijn een voortreffelijke, uiterst voedzame groente.

De boonen met draad hebben peulen, die snel vezelachtig worden, en worden vooral gekweekt om droog te bewaren. Pluk daarom de peulen, als ze goed vol zijn en laat ze op den zolder drogen. Wilt U bijzonder malsche en fijne boonen, kweek dan de variëteit « Flageolet Chevrier » met groen zaad (n° 304). Pluk de peulen, vooraleer zij hun volledige ontwikkeling bereikt hebben en laat ze langzaam in de schaduw drogen. De boonen zullen goed groen en versch blijven.

De boonen zonder draad worden met de peul geëten. Maar, als ze rijp zijn, kan men ze ook als voorraad laten drogen. Deze boonen zijn, groen verbruikt, een kostelijke groente, die op allerhande wijzen kan dienen. Men bewaart ze gezouten of gesteriliseerd in glazen potten.

De boonen zonder of met draad verdeelt men bovendien in struik- of staakboonen. De struikboonen zijn vroeger rijp dan de staakboonen. Maar deze brengen natuurlijk meer op. Zaai dus van de twee soorten: de struikboonen zult U eerst kunnen oogsten; de staakboonen zullen de opbrengst voortzetten, die den ganschen Zomer zal duren, indien U eenige opeenvolgende zaaiingen gedaan hebt. U zoudt zelfs rond 10 Juli zwarte Belgische struikboonen (n° 300) kunnen zaaien, die, indien U ze van einde September af beschut, U in November nog goede boonen zullen geven om met de peul te verbruiken.

Boonen vergen een overvloedig verlichte, wel verluchte, zonnige, maar tegen hevige winden beschutte standplaats, een lichten, voedzamen, gezonden, doordringbaren en bij voorkeur den vorigen Herfst bemesten grond, want een wel verteerde, goed met den grond vermengden mest is deze planten onmisbaar. Zij houden niet van een te zeer kalkachtigen grond, noch van te veel stikstof. Potasch- en phosphoorzuurhoudende meststoffen, integendeel, kunnen zij niet missen.

Te veel vocht doet de gezaaide boonen rotten en de rijpe boonen vlekken. Over 't algemeen, zoowel voor teelt in 't groot als in den hof, zijn te vaste, te vochtige, te kalkachtige gronden niet geschikt voor boonenteelt.

Zij zijn bovendien buitengewoon gevoelig voor koude en eischen, om zich goed te ontwikkelen, een tamelijk hoogen warmtegraad. 1 tot 2 graden vorst zelfs verdragen zij niet. Ook moet men geen struikboonen zaaien vóór de eerste dagen van Mei, noch staakboonen voor 10^e Mei.

Zekere jaren, of als men te dicht gezaaid heeft, ziet men sommige struikboonen te hoog opschieten en lang worden. Wij zijn er op gesteld onze klanten daarvan kennis te geven, opdat zij niet zouden denken, dat er bij de levering vergissing geschied is.

1. STAAKBOONEN MET DRAAD.

288 Lange breedpeulige slagzwaardsnijboon

Zeer kloeké, veel opbrengende variëteit. Rechte, buitengewoon lange en volle peulen, die men, jong of bijna ontwikkeld, fijn gesneden gebruikt. Ook geschikt om in te leggen. Uitstekende boon, versch of droog.

289 Staakboon, witte van Soissons

Goede opbrengst. Nogal gebogen, breede, groene peulen, die al rijkende geelachtig worden. Geteeld voor haar goede, hooggeschatte boon.

	100 gr.	250 gr.	500 gr.	Kilogr.
288	2 20	4 00	7 50	14 00
289	2 20	4 00	7 50	14 00

2. STAAKBOONEN ZONDER DRAAD.

	100 gr.	250 gr.	500 gr.	Kilogr.
295 Staakprinsessenboon, groene zonder draad	2 50	5 00	9 00	17 00
De beste variëteit zonder draad; tamelijk vroeg, zeer gehard en uiterst veel opbrengend. Groene, rechte, nogal lange, buitengewoon talrijke peulen. Zeer fijne smaak. Witte, eivormige boon. Veel geteeld in België.				
296 Witte boterboon van Algiers, gele peul	2 20	4 30	8 00	15 00
Lange, dunne, malsche, lekkere peulen. Hooggeschat als boon zonder draad, tevens geteeld om droog te bewaren. Witte, smakelijke boon.				
297 Zwarte boterboon van Algiers, gele peul	2 00	3 70	7 00	13 00
Minder lange doch bredere peulen. Voor middenseizoen. Ook goed met de peul. Blijft malsch tot volkomen ontwikkeling.				
298 Vancelst's reuzenboon, groene peul (Ontbreekt)	—	—	—	—
Ook een goede boon zonder draad. Prachtige, zeer lange, zeer talrijke peulen. Buitengewone opbrengst.				
299 Phenomeen, groene peul	2 20	4 30	8 00	15 00
Zeer kloek en gehard. Brengt het meest op. Trossen lange peulen. Uitstekend met de peul en als droge boon.				

3. STRUIKBOONEN MET DRAAD.

300 Zwarte Belgische	1 80	3 00	5 00	9 00
Zeer lage, geharde en zeer vroege variëteit, geheel geschikt om onder raam te forceeren. Rechte, schoon groene peulen, die jong gebruikt worden. Tevens geschikt om in den Herfst te telen.				
301 Van Perreux	1 90	3 50	6 50	12 00
Vroeg, zeer talrijke rechte peulen, tot 20 cm. lang. Extra om groen te gebruiken. Lichtgmskleurige boon. Overvloedige, langdurige opbrengst.				
302 Witte Flageolet	1 80	3 00	5 40	10 00
Type van struikboon met draad. Lekkere versche boon. Geeft, met de Zwitserse, den grootsten voorraad droge boonen. Variëteit voor teelt in 't groot.				
303 Witte « Onuitputbare »	1 90	3 50	6 00	11 00
Zeer eigenaardig. Talrijke groene rechte peulen, die voortdurend bijkomen, als men er regelmatig plukt.				
304 Groenzadige flageolet Chevrier	1 90	3 50	6 50	12 00
Lekkere boon. Men plukt de nog groene peulen en laat ze langzaam drogen: de boonen blijven schoon groen en malsch in de peul.				
307 Heilige Geest	2 00	3 70	7 00	13 00
Veel opbrengend. Lange peulen. Witte boon, gevlekt nabij de klem.				
310 Witte Zwitserse	1 90	3 50	6 00	11 00
Nogal laat. Kloek, geharde, veel opbrengende variëteit. Om droog te bewaren. Voor teelt in 't groot.				

4. STRUIKBOONEN ZONDER DRAAD.

311 Extra vroege met groene peul	2 20	4 00	7 50	14 00
Zeer laag. Vroeger dan al de andere boonen zonder draad. Om te forceeren. Droge, schoon witte, hooggeschatte boon.				
313 Prinses, zonder draad, groene peul	3 20	6 50	12 00	23 00
Zeer vroeg, veel opbrengend. Gele, vleezige, goed volle, zeer Verschaft ook een rijken voorraad uitstekende droge boonen. Zeer gezochte variëteit. Een der meest gekweekte in België.				
315 Prinses, zonder draad, van Volgers	3 70	7 50	14 00	27 00
Malsche, lekkere peulen. Uitstekend geschikt om jong ingemaakt te worden. Weinig geteeld voor de boon.				
316 Boterboon « Wonder van de markt »	2 00	3 70	7 00	13 00
Prachtige, gele, rechte, zeer lange peulen, geheel zonder draad. Zwarte boon. Zeer overvloedige opbrengst.				
317 Boterboon van den « Mont d'Or », gele peul	2 20	4 00	7 50	14 00
Zeer vroeg, veel opbrengend. Gele, vleezige, goed volle, zeer talrijke peulen. De beste, duurzaamste, meest geharde der struikboonen zonder draad. Donkere rossige boon.				
318 Boterkoningin, gele peul	2 50	4 60	8 50	16 00
Minder gehard, doch zeer goed. Dikke, gebogen, met kenmerkende gele kleur. Overvloedige, voortdurende opbrengst. Zeer malsche droge boon.				

CICHOREI (SUIKERIJ).

De cichorei «Capucienenaar», de verbeterde cichorei, de koffiecichorei en de cichorei «Witloof» worden begin Mei gezaaid. Elk van deze heeft haar bijzondere teelt, uitvoerig behandeld op onze zaadpakjes.

130 Gewone of bittere, Capucienenaar

Van licht beroofd bied zij een voortreffelijke wintersla.

131 Verbeterde blonde

Breedbladige, blonde, rozet, die natuurlijk krypt.

132 Met dikke wortel voor koffiecichorei

Tamelijk dikke, zeer lange, puntige wortel. Voor 100 kg. geroosterde en gemalen wortelen heeft men ongeveer 20 kg. cichorei.

134 Brusselse of Witloof

Kg.: 114 00; 250 gr.: 32 00

Kostbare, uitstekende wintergroente. Teelt en oogst in den kelder zijn uitvoerig behandeld op ieder zaadzakje.

Cornichon: zie Augurk.

EIERPLANT.**25 Eierplant, violette.**

De eierplanten zijn vruchten als groente hooggeschat, vooral in warme streken. Men zaait in Februari op warm broeibed, verpoot op broeibed en kan planten in open lucht einde Mei.

ERWTEN.

Wij hebben de erwten in verschillende groepen volgens hun rijp worden gerangschikt.


De hoogten betreffen alleenstaande planten. Als het jaar zeer vochtig is of als men te dicht gezaaid heeft, ziet men soms struikerwten opschieten. Hierop trekken wij de aandacht van onze klanten opdat zij niet zouden denken dat er een vergissing bij de bestelling heeft plaats gehad. Zoo komt het dat de Wondererwten uit Amerika dikwijls door een traliewerk van 50 cm. moeten ondersteund worden. Het traliewerk moet men boven staken verkiezen, daar het altijd opnieuw gebruikt kan worden.

De erwt houdt van een voedzamen, diepen, tamelijk lichten grond, dien men den voorgaanden Herfst gemest heeft. Lucht en vooral licht zijn deze plant onontbeerlijk.

Wilt U zeer vroeg erwten oogsten, zoo kunt U einde Februari een zaailing wagen met struikerwten in een 80 cm. tot 1 m. breede strook grond langs den zuidkant van een muur, of zelfs aan den west- of oostkant, maar niet aan den noordkant. Dit strookje grond noemt men «muurbed». Het vangt de warmte op der zonnestralen, die door den muur weerkaatst worden en laat toe zeer vroeg te oogsten. Zoo zult U beginnen erwten te plukken in Juni. U zoudt er zelfs kunnen in slagen begin Mei te oogsten, indien U uw zaalbed met ramen bedekt, die U wegneemt, als de warmtegraad rond 15° gevestigd blijft. Een ander middel om den oogst te vervroegen is de stengels in te knippen boven vier of vijf bloemengroepen.

Om gedurende gansch den Zomer erwten te oogsten, zaait men: 1. in Maart-April een vroege variëteit; 2. in April een vroege en een middenseizoen variëteit; 3. in Mei een middenseizoen variëteit en een late; 4. in Juni, een late. In de eerste helft der maand Juli kan men nog een vroege variëteit zaaien, die bij gunstig weder, in September-October nog een goede opbrengst zal opleveren.

De middenseizoennerwten kunnen niet goed de zomerhitte verdragen: zij verdrogen en worden door de witziekte aangetast. Begiet ze dikwijls en bedek den grond met bijna verteerd mest. Vermijd de witziekte door het gebladerte met nicotinehoudende zwavelbloem te bestrooien. (Zie blz. 41.)



N° 496. — Hooge doperwt Senator.

1. LAGE DOPERWTEN.

	100 gr.	250 gr.	500 gr.	KHogr.
481 Zeer vroege van Annonay voor broeibak, wit rond zaad. 0 m. 25 Nogal veel opbrengend. Voor raam. Gedijt ook in open lucht.	2 00	3 70	7 00	13 00
482 De « Onovertroffene » met wit en groen rond zaad. 0 m. 25 Goed, veel opbrengend, gehard. Voor raam of vollen grond.	1 90	3 50	6 50	12 00
483 Wonder van Amerika, groen, gerimpeld zaad. 0 m. 25 Vroeg. Zeer talrijke nogal kleine, maar dikke, volle peulen. Uitstekende soort, die, alhoewel klein, zeer veel opbrengt.	1 90	3 50	6 50	12 00
484 Groene lage Krombek, met groen gerimpeld zaad. 0 m. 35 Uitmunten, veel opbrengend, gehard. Lange gebogen peulen.	1 90	3 50	6 50	12 00

2. HOOGHE DOPERWTEN.**Zeer vroege.**

485 Prins Albert, met wit rond zaad. 0 m. 70 De vroegste. Veel opbrengend, uitmunten. Zeer dikke doppen.	1 80	3 00	5 40	10 00
486 Express of Alaska, met wit rond zaad. 0 m. 70 Eenige dagen later dan de voorgaande, maar meer opbrengend.	1 80	3 00	5 00	9 00
487 Langpeulige Express of « de Milde », groen rond zaad. 0 m. 90 Vroeg, kloek. Breede, lange, licht gebogen peulen. Hooggeschat.	1 80	3 00	5 40	10 00
488 Caractacus, met wit rond zaad. 0 m. 90 Stamt af van de « Prins Albert ». Wat later, goed, veel opbrengend.	1 80	3 00	5 00	9 00

Vroege.

490 Automobiel, met groen en wit rond zaad. 0 m. 90 Uitstekende, vroege, veel opbrengende variëteit.	2 00	3 70	7 00	13 00
492 Hollandsche Michaux, met wit rond zaad. 1 m. Nogal vroeg. Zeer volle peulen. Voor teelt in 't groot. Kan vóór den Winter gezaaid worden om in Mei geoogst te worden.	1 80	3 00	5 00	9 00
494 Gradus, met gerimpeld, wit, groenachtig zaad. 0 m. 80 Extra vroeg. De vroegste met gerimpeld zaad. Prachtige zeer lange, zeer breede, goed volle, merkwaardige peulen.	1 90	3 50	6 50	12 00
495 Vroege, groen gerimpelde van Knight, erwt Napoleon. 0 m. 70 Middelmatig groote peulen; zeer dik zaad. Zeer hooge opbrengst.	2 00	3 70	7 00	13 00

Van middenzeizoen.

496 Senator, met groen gerimpeld zaad. 0 m. 70 Prachtige, blonde, 10 cm. lange peulen, vol dikke, malsche, soete, lekkere erwten. Kloek, rijkdragend, extra.	1 90	3 50	6 00	11 00
497 Gladiator of verbeterde mandvuller, groen rond zaad. 0 m. 70 Zeer gehard en rijkdragend. Schoone peulen met lekkere erwten.	1 80	3 00	5 40	10 00
498 Telefoon, met gerimpeld wit zaad. 1 m. 10 Wat vroeger dan de volgende. Reuzige, prachtige peulen voor tentoonstelling. Zoete, dikke erwt. Bijzonder veel opbrengend.	2 00	3 70	7 00	13 00
499 Krombek uit Auvergne, langpeulige, wit rond zaad. 1 m. 30 Schoone fijne, zeer lange, gebogen peulen; talrijke kleine erwten. Brengt een maand lang op. Gehard, niet veeleischend. Extra.	1 80	3 00	5 00	9 00

Late.

500 Stratagem, verbeterde, met gerimpeld groen zaad. 0 m. 70 Gelijkt zeer op de variëteiten « Omega » en « Wonder van de markt ». Dichtgroeiend, rijkdragend. Prachtvariëteit.	1 90	3 50	6 50	12 00
501 Gerimpelde van Knight, met wit gerimpeld zaad. 1 m. 80 Wit, groenachtig zaad. Bestand tegen hitte. Voor zomerzaailing.	2 00	3 70	7 00	13 00
505 Hertog van Albany, groen gerimpeld zaad. 1 m. 40 Prachtig, voor tentoonstelling. Mededingster van de « Telefoon » om haar schoone peulen. Uitmunten, erwt. Zeer rijkdragend.	2 20	4 30	8 00	15 00

3. HOOGHE PEULERWTEN.

510 Veertigdaagsche 1 m. 20 Zeer vroege soort. Middelmatig groote peulen, heel en al zonder draad. Uitstekende peulerwt. Brengt twee maanden lang op.	2 00	3 70	7 00	13 00
513 Hendriks, vroege of vroege witte 1 m. Uitmunten, vroege, geharde soort. Middelmatig groote, rechte, vleezige, malsche, zeer talrijke peulen. Gedijt overal.	2 00	3 70	7 00	13 00
519 Ramshoren 1 m. 40 Prachtige, blondgroene, 12 cm. lange, vleezige, zeer malsche peulen. Intensieve, langdurige opbrengst. De meest geteelde.	2 20	4 00	7 50	14 00

KAMPERNOELIE.

- 105 **Kampernoeliewit** 3 brikken: 9 00; 6 brikken: 17 00
Men kan in elk seizoen een kampernoeliebed aanleggen in een niet te droog, noch te vochtig lokaal (kelder). Zes brikken zijn voldoende om meer dan een vierkanten meter van een kweekhoop te doorspekken. Een uitvoerige teeltaanwijzing wordt overigens gevoegd bij elke zending.

- 60 **Kardoën, volle, doornlooze**
Kostbare herfst- en wintergroente, te weinig gekweekt. Men zaait ter plaats, begin Mei op 1 m. afstand. Tot 15^e Augustus kan men andere groenten kweken tusschen de kardoenen.

KERS.

- 259 **Tuinkers, gewone**
260 — **gekrulde.**
Lekker toekruid voor salade. Zaaïen van Maart tot in Augustus.
263 — **doorlevende.**
Minder malsch, meer prikkelend. Schiet slechts het tweede jaar in 't zaad. Zaaïing vanaf Maart. Wordt vooral 's Winters geoogst.
264 **Waterkers**
Men kan er winnen in halfschaduw. Vergt veel begietingen. Zaaïen in Mei.

KERVEL.

- 99 **Kervel, gewone** 250 gr.: 7 50
Gehard. Breede en ingesneden bladeren, met zeer kruidigen smaak. Kan gemakkelijk met dolle kervel verward worden.
100 — **fijn gekrulde** 250 gr.: 9 50
Kan niet met dolle kervel verward worden. Even gemakkelijk te telen als de gewone. Zaaï om de derde week in de schaduw. Oogst: van Mei af. In begin September een goed zaaïbed van aanleggen, dat tot in de Lente zal opbrengen.

KOMKOMMERS.

- 226 **Komkommer, zeer dikke, witte, van Bonneuil**
Witte, eivormige vruchten, die tot 2 kg. wegen. Voor vollen grond.
227 — **zeer lange groene.**
Langwerpige vruchten, die men jong gebruikt, vóór ze geel worden.
228 — **Rollisson's Telegraph**
Prachtige, uitstekende lange vruchten. Voor broellaag en broeikas.

Zakje	15 gr.	30 gr.	100 gr.
—	—	—	—
2 00	4 60	8 00	—
1 00	1 40	1 90	4 60
1 00	1 40	1 90	4 60
1 00	2 00	3 50	—
2 50	—	—	—
1 00	1 30	1 60	3 70
1 00	1 40	1 90	4 60
1 20	3 70	6 50	—
1 40	4 00	7 00	—
6 00	—	—	—



KOOLSOORTEN.

Witte en roode kabuskoolen. — Doe hiervan twee zaalingen: eene rond 15^e Augustus, die haar opbrengst zal leveren in Juni-Juli indien het een vroege, in Augustus-September indien het een late variëteit is; een tweede van Maart tot Juni, die U in September-October zult oogsten en die U tot wintervoorraad zal dienen.

Savoieikoolen. — Zaaï rond 15^e Augustus een vroege en een half-vroege variëteit. U zult beginnen te oogsten vanaf einde Mei. Zaaï daarna in Maart een half-vroege variëteit, die in Augustus-September haar opbrengst zal leveren. Zaaï eindelijk een late variëteit in April. U zult ze tusschen aardappelen verpoten en de koolen zullen goed zijn op het oogenblik waarop de tweede zaailing geen opbrengst meer zal geven.

Spruitkool. — Ook een goede wintergroente. Zaaï ze in Maart en in April om van October tot volgende Maart te oogsten. Pluk de kropjes van onder naar boven.

Niet gekropte koolen. — Die koolen verkrijgen eerst gansch hun smaak, als zij bevroren geweest zijn. Zij verschaffen gansch den Winter een uitmuntende groente, bijzonder de groene scheutkool « Coô ». Men zaait ze in Maart en men oogst van het inzetten van het vriesweder af tot laat in de Lente. De voederkool « Cavalier » levert in den Winter een voedsel voor konijnen.

Bloemkoolen. — Zaaï: 1. Een vroege variëteit in September om in Mei-Juni te oogsten; 2. In Februari-Maart een late: oogst in den Zomer; 3. Einde April een half-vroege om in den Herfst te oogsten en te bewaren; 4. In Juni een Broccoli-variëteit: oogst einde April.

Raapkool. — Zaaï in de Lente om in den Zomer te gebruiken; daarna in Juni om vóór den Winter te oogsten en te bewaren.

Koolrapen. — Deze zaait men einde April-Mei en men brengt ze in October binnen om ze gedurende den Winter te bewaren.

N^o 146. — Brunswijker wittekool.**1. WITTEKOOL.**

De vroege wittekoolen 137, 143 en 145 met puntig hoofd, worden in den Zomer gebruikt. Zij hebben een veel fijneren smaak als de ronde en zijn niet zoo veeleischend als deze. Zij zijn veel te weinig gekend.

	Zakke	15 gr.	30 gr.	100 gr.
137 Express	2 20	5 00	8 50	—
Zeer vroege, die vanaf het zesde blad krypt. Middelmatig dik.				
143 Suikerbrood	2 20	5 00	8 50	—
Vroege. Hooge, zeer lange krop, uitstekend van smaak. De beste.				
145 Ossenhart, dikke	1 90	4 30	7 50	—
Vroeg en gehard. Nogal breede, hooge, kegelvormige, grijsachtig groene kool, die lang vast blijft.				
146 Brunswijker of van Boston	1 90	4 30	7 50	19 00
Korte stam. Dikke platte, heldergroene kool. Uitmuntend ras. Brengt veel op. Voor den Herfst en het begin van den Winter.				
148 Hollandsche, late	2 20	5 00	8 50	21 00
Laat, uiterst gehard. Volle, zeer vaste kool.				
149 Quintaal, uit den Elzas of van Straatsburg	1 90	4 30	7 50	19 00
Zeer laat en gehard. Zeer groote bleekgroene, platte, zeer harde kool; zeer geschikt voor zuurkool. Teelt in 't groot.				

2. ROODEKOOL.

152 Negerkop	3 00	7 00	11 00	—
Korte stam. Kloek en zeer vroeg. Goede kleine donkerroode, zeer ronde, zeer vaste kool. Uitmuntend voor salade.				
156 Export	3 00	7 00	11 00	—
Wat later maar zeer veel opbrengend. Hooge stam, dikke, donkerroode, snel gevormde kool.				
157 Poolsche	2 20	5 00	8 50	—
Bijna zonder stam. Zeer vaste, zeer harde, platte, donkerroode kool. Herfst- en wintervariëteit. Sedert lang ten onzent geteeld, is zij er zoo gehard geworden als de volgende.				
158 Donkerroode, dikke, late, verbeterde.	2 20	5 00	8 50	21 00
Door een uiterst zorgzame teeltkeus hebben wij hiervan een echte wintervariëteit gewonnen. Dus zaait men in Augustus en plant ter plaatse vóór of na den Winter. Zeer dikke, zeer vaste kool. Volkomen gehard. Extra voor teelt in 't groot.				

3. SAVOOIEKOOL.

	Zakje	15 gr.	30 gr.	100 gr.
162 Meikool of Driekropper Door ons veredeld, zeer gehard. De vroegste. Uitmuntend van smaak. In Augustus gezaaid krypt zij in Mel. Na het wegsnijden van de krop, schieten er twee of drie kleine uit.	2 20	5 00	8 50	21 00
163 Vroege van Sint-Jan Zeer vroeg. Zeer korte stam, kegelvormige, gezwollen, snel gevormde krop; weinig losse bladeren. Zaaien in de Lente.	2 20	5 00	8 50	—
166 Halfvroege van Aubervilliers Veredeling van de dikke savoieekool van Vertus; minder gehard maar vroeger. De vroegste met dikke krop.	1 90	4 30	7 50	—
167 Halfvroege dikke van Vertus. Hooge stam. Zeer groote, zeer vaste krop. Bestand tegen eerste koude. Uitmuntende voor Herfst en begin Winter.	1 90	4 30	7 50	19 00
168 Van Pontoise Wintervariëteit. Zeer harde, vaste krop, wonderwel bestand tegen koude. De meest gekweekte rond Parijs.	2 20	5 00	8 50	—
170 Late, uit Noorwegen. Ronde, nogal kleine krop. De laatste en meest geharde.	1 90	4 30	7 50	—

4. BRUSSELSCH SPRUITKOOL.

174 Gewone Stam van ongeveer 1 m. Langwerpige spruiten op kleine afstanden. Gehard.	1 90	4 30	7 50	—
175 Halfhooge der Hallen. Stam van 0m50 a 0m70. Talrijke, middelmatig groote, ronde, dichtgroeiende spruiten. Zeer gehard. De beste.	2 20	5 00	8 50	21 00

5. BLADERKOOL.

178 Groene, kortstammige winterkrulkool Fijn gekrulde slerbladeren. Wordt malsch en smakelijk door de vorst. Zeer kostbaar voor koude streken.	1 20	2 50	4 00	—
179 Hooge, groene, winterkrulkool uit het Noorden. Dezelfde kenmerken, maar de bladeren groeien trapsgewijze op de bovenste helft van den 1 a 1m50 hoogen stam.	1 00	2 00	3 50	—
184 Gewone groene met scheuten Ontwikkelt malsche bladerscheuten in de oksels der bladeren. Scheuten en bladeren oogst men op het einde van den Winter. Kostbare wintergroente, zeer fijn van smaak. Vooral geteeld in Wallonië onder den naam van « Brocoli ».	2 00	—	—	—
188 Roode Vlaandersche voederkool Cavalier Kloek. Wordt 1m25 hoog. Breede violetachtige bladeren. Zeer bestand tegen koude. De alleen aanbevelenswaardige voor teelt in 't groot.	1 40	2 50	4 00	10 00



N° 210. — Vroege witte Raapkool.



N° 193. — Mechelsche Bloemkool.

6. BLOEMKOOL.

	Zakje	10 gr.	15 gr.	30 gr.
193 Vroege, witte Mechelsche of Leuvensche Uiterst vroeg, zoo vroeg als de Erfurter bloemkool, maar dikker. Blijft langer goed. Zeer wit. Fijnkorrelig.	5 40	21 00	30 00	—
196 Lage, vroege zesweeksche De volmaakste lage, vroege bloemkool. Zeer korte stam. Insluitende bladeren. Zeer witte, zeer harde, fijnkorrelige, lekkere, lang vaste krop. Zeer gehard.	5 40	21 00	30 00	—
197 Kortstammige Lenormand Zeer korte stam, zeer dikke, vaste, witte krop. Snelle groei. Vroeg, veel opbrengend, gehard, vergt weinig plaats. Dus allerbest en de meest aanbevelenswaardige.	4 60	17 00	25 00	—
199 Late, dikke, vaste Hollandsche Halflaat. Groote geharde variëteit met hoogen stam. Middelmatig groote, zeer harde, vaste variëteit. Voor teelt in 't groot.	2 50	7 00	9 50	—
201 Late, herfstreuzen Hooge stam, zeer dikke, vaste, witte krop. Uitstekende late variëteit. Zaailing in Februari-Maart. Oogst tot in November.	2 80	9 00	12 00	—
205 Vroege, extra, winterbloemkool Brocoli van Angers of van St-Laud Vroeg en gehard. Dikke, regelmatige, vaste, witte en zeer fijnkorrelige krop. Wordt in April-Mei geoogst.	4 60	17 00	25 00	—
206 Late, extra, winterbloemkool Brocoli van Angers of van St-Laud Vaste, zeer witte, zeer fijnkorrelige krop, goed door bladeren ingesloten. Oogst in Mei.	6 00	25 00	38 00	—

7. RAAPKOOL, MET VERDIKTEN STENGEL.

	Zakje	15 gr.	30 gr.	100 gr.
210 Witte, vroege van Weenen. Oogst twee en een halve maand na zaailing. Wit, rond kropje met malsch, zeer fijn vleesch. Zeer mooie variëteit.	1 90	4 30	7 50	—
212 Violette Goliath Zeer laat. Zwaar, bleekgroen, met fijn vleesch. Blijft zeer vast, zelfs bij ver gevorderde ontwikkeling.	1 80	3 70	6 50	—

8. KOOLRAAP.

217 Rutabaga, dikke, gele, met rooden hals, Kampioen van Sutton. Kg.: 42 00; 500 gr.: 23 00; 250 gr.: 12 00 Dikke, bijna ronde wortel met geel vleesch. De hoogst geschatte en meest aanbevelenswaardige variëteit voor teelt in 't groot.	1 00	1 40	2 20	8 00
219 Kool, verbeterde Chineesche (Pé Tsai)	1 00	2 00	3 50	—
221 Kool, Zeekool (crambé maritime)	1 50	4 60	8 00	—
Korensalade: zie Veldsla.	—	—	—	—

LABBOONEN.

Doe één of twee zaailingen van het begin van Februari af tot einde Maart, maar niet later want uw planten zouden gevaar loopen door de zwarte bladluizen aangetast te worden, die rond 15^e Mei haar verschijning doet. Men gaat ze te keer met Réol, tabakstof (zie bladz. 41), zelfs kalk, of stof van de wegen.

282 Labboon, lage, vroege, voor broeibak. Kg.: 15 00; 500 gr.: 8 00; 250 gr.: 4 30 Vroeg, veel opbrengend, uitstekend. Kleine plant voor broeibak.	—	—	—	2 20
283 — van Sevilla . . Kg.: 10 00; 500 gr.: 6 00; 250 gr.: 3 50 Vroeg, halfhoog. Zeer schoone peulen. Goede hoedanigheid.	—	—	—	1 90
284 — gewone dikke vroege. Kg.: 9 00; 500 gr.: 5 00; 250 gr.: 3 00 Om 80 tot 1 m. hoog. Zeer gehard, veel opbrengend. Tairijke breede peulen. Dikke, uitstekende boonen. De meest geteelde.	—	—	—	1 80
285 — breede, groene, van Windsor Kg.: 15 00; 500 gr.: 8 00; 250 gr.: 4 30 Hoog. Goede opbrengst. Laat: dikwijls door bladluizen aangetast.	—	—	—	2 20
286 IJskruid (Mesembrianthemum crystallinum). Breedbladige rozet, die met kristalletjes overdekt schijnt. Zaailing: begin Juni. Vervangt de spinazie gansch den Zomer.	2 00	8 00	14 00	—

LATUW (SALADE).

Men heeft latuw voor elk jaargetijde. Men moet er dus achtereenvolgens voor elk seizoen zaaien om er altijd verse te hebben. De latuw eischt een voedzamen grond in volle zon.

De snijlatuw is de vroegste. Zij kropt niet maar wordt afgesneden als ze 5 cm. hoog is. Zaai ze ter plaats van de eerste schoone dagen af. De variëteit van Amerika schiet weer spoedig op na het afsnijden, als men het oog der planten niet afgesneden heeft. Zoo zult U verscheidene malen oogsten.

De lentekroplatuw, vroeger dan de zomerlatuw, past enkel voor de eerste verplantingen want in den Zomer schiet zij te snel in 't zaad. Zaai ze van Maart tot einde April en verpoot ze als ze 6 tot 7 cm. hoog is. Zij zal in Mei-Juni kroppen.

De zomer- en de herfstkroplatuw geven dikke kroppen en verdragen de hitte zonder snel in het zaad te schieten. Zaai er alle drie weken van 15 April af tot 1^o Augustus. U zult van einde Juni tot het vriesweder schoone kroppen oogsten.

De winterlatuw kan onder ons klimaat overwinteren. Zaai ze in het begin van September, verplant ze in voren en bedek ze in den Winter met bladeren of zakken. U zult van de eerste lentedagen af oogsten.

De Romeinsche latuw heeft smalle, lange, kegelvormig groeiende bladeren. Men eet ze vooral gestoofd, maar ook als lekkere verfrissende salade. Zaai ze gelijk zomerlatuw en verpoot met 40 cm. tusschenwijdte. De krop, die 3 kg. kan wegen, vormt zich twee maanden na het verplanten. Bind de buitenbladeren, suikerbroodvormig samen met raffia als de plant omtrent volkomen ontwikkeld is.



N^o 325. — Goudgele gotte kroplatuw.

1. SNIJLATUW (SNIJ- OF STEEKSALADE).

	Zakje	15 gr.	30 gr.	100 gr.
321 Ronde, blonde, met wit zaad	1 00	2 50	4 00	10 00
Dikwijls onder raam geteeld. Snelle groei. Wordt zeer jong afgesneden.				
322 Gekrulde, met zwart zaad	1 20	2 80	4 60	12 00
Gehard en veel opbrengend. Breede, dichtgroeiende gekrulde bladeren. Voor vollen grond.				
324 Gekrulde Amerikaansche	1 40	3 50	5 40	—
Dichtgroeiende, gekrulde bladeren met sterk koperkleuriggetinte randen. Deze latuw groeit snel bij na het afsnijden, hetgeen toelaat verscheidene malen te oogsten.				

2. LENTEKROPLATUW.

325 Goudgele gotte, met wit zaad.	1 20	2 80	4 60	12 00
Goede, bijzonder vroege lentevariëteit. Kleine, platte, niet zeer vaste krop met geblaarde, verfrommelde, schoon blondgroene bijna gele bladeren. Al schiet ze wat sneller in 't zaad dan de volgende variëteit, toch heeft ze gewoonlijk de voorkeur van de liefhebbers, om haar schoone aantlokkende goudkleur.				
326 Gotte of gau	1 40	3 50	5 40	—
Snelle groei. Blondgroene zeer geblaarde bladeren. Kleine nogal vaste, lang gesloten krop. Korte, dikke, gedrongen plant, die men kan planten met 17/18 cm tusschenwijdte en daarom veel opbrengt.				
327 Roodrandige, met wit zaad	1 40	3 50	5 40	—
Een der meest opbrengende der lentelatuwsorten. Zeer volle, vaste gewrongen krop met bleekblonde bladeren en roodge-vlekte randen. Zeer malsch en vast. Een der beste variëteiten.				
328 Meikoningin, met wit zaad.	1 20	2 80	4 60	12 00
Bijna even vroeg als de voorgaande variëteiten; schoone helder-groene, van boven licht roodachtige krop, ongeveer zoo dik als de zomerlatuwsorten. Zeer bestand tegen koude en vochtigheid. Even geschikt om te forceeren als voor zomerteelt. Blijft lang vast.				

3. ZOMER- EN HERFSTKROPLATUW.

	Zakje	15 gr.	30 gr.	100 gr.
332 Palatijnsche of rossige, met zwart zaad. De vroegste der zomerlatuwsoorten. Nogal dikke, zeer volle, bruingevekt donkergroene krop. Zeer goede, geharde variëteit, hoog geschat door de groenboeren rond Parijs.	1 40	3 50	5 40	—
334 Van den Trocadero, Lorthois of roodrandige, wit zaad. Zeer vroeg. Bleekgroene, paarsrood getinte bladeren, die een vaste, platte krop vormen met een kenmerkend uitzicht. Uitstekend voor het begin van den Zomer. Gedijt overal.	1 20	2 80	4 60	12 00
335 Rijselsche, met zwart zaad. Dezelfde als de variëteit «Zonder weerga» maar met zwart zaad. Ontwikkelt in zes weken een schoone, blonde, zware, vaste, uitstekende krop, goed bestand tegen hitte. Kan gansch het seizoen gezaaid worden om aldus een voortdurende opbrengst te bekomen.	1 40	3 50	5 40	—
336 Blonde van Cazard, met zwart zaad. Dikke, ronde, zeer vaste, witte, van binnen zeer malsche krop die goed vast blijft. Bestand tegen hitte.	1 20	2 80	4 60	—
337 Dikke, blonde, laatdoorschietende, met wit zaad. Zeer dikke, hooge, van boven afgeplatte, uiterst bleek blondgroene krop. Een der goede zomerlatuwvariëteiten, die veel opbrengt en altijd gedijt. Verdraagt de felste hitte zonder snel in 't zaad te schieten.	1 20	2 80	4 60	12 00
338 Dikke bruine trotskop of Sint-Jan-het-Lam, wit zaad. Schoone breedbladige plant, met dikke goed volle, bruingevekt heldergroene krop. Tevens wel bestand tegen hitte. Zoo genoemd om den langen duur van haar krop. Met de voorgaande, de meest gewilde zomerlatuw.	1 20	2 80	4 60	12 00
340 Wonder der vier jaargetijden of roode Besson, zwart zaad. Gedrongen, snelle groei. Schoone dikke ronde krop met zeer geblaarde, bleekgroene, overvloedig, vuurroodgekleurde bladeren. Gedijt gelijkelijk wel in Lente, Zomer en Herfst.	1 40	3 50	5 40	14 00
341 Reuzige zomerlatuw of latuw van Montluçon, geel zaad. Gelijkt fel op de variëteit «Emilia». Dikke zeer hooge, vaste, blondgroene krop, van boven lichtjes rooskleurig getint. Schiet niet snel in 't zaad. Zeer groote opbrengst.	1 40	3 50	5 40	—
343 Witte gekrulde Batavia of van Pierre-Bénite, wit zaad. Dikke ronde, afgeplatte krop, die er uitziet als de variëteit «Napelsche koollatuw», maar veel bleeker blond en met sterker gekrulde bladeren. Kloek, gehard, gemakkelijk te telen.	1 50	4 30	7 50	—
344 Parijsche Batavia of reuzige blonde, wit zaad. Zware, goudgele, wat afgeplatte, volle, zeer geharde krop. Knappende, lekkere, bij hitte zeer verfrisschende bladeren. Hooggeschat in de omstreken van Parijs.	1 50	4 30	7 50	—

4. WINTERKROPLATUW.

345 Blonde Passie, met wit zaad. Ronde, nogal dikke, bleekgroene, roodgetinte krop. Gehard.	1 20	2 80	4 60	12 00
346 Bruine, met wit zaad. Zeer gehard. Geblaarde, sterk bruingevekte bladeren. Ronde, nogal volle, uitmuntende krop. Vergt weinig plaats.	1 40	3 50	5 40	—
348 Burgondische, met wit zaad. Vroeg en bijzonder gehard. Kloeke plant met breede, geblaarde, gekrulde bladeren. Dikke ronde, blondgroene, geploide, goed volle krop. Veel opbrengend, zeer aanbevelenswaardig.	1 40	3 50	5 40	—

5. ROMEINSCH LATUW.

355 Blonde tuinderlatuw, met wit zaad. Om te stoven. Schoone, ronde, zeer hooge, van boven afgeplatte krop, die twee maanden na het verpoten 3 kg. wegen. Vooral aanbevolen voor den Zomer. Meest gekweekte variëteit.	1 50	4 30	7 50	—
356 Ballon of van Bougival, met zwart zaad. Kloeke, bijzonder geharde variëteit. Breedere, zeer zware krop met goede opbrengst. Uiterst geschikt voor den Herfst.	1 50	4 30	7 50	—
2 Look, wit of gewoon (bollen) K.: 10 00; 500 gr.: 5 40; 250 gr.: 3 00 Iedere bol bestaat uit een tiental bolletjes. Look plant men in voedzamen grond in Januari en zelfs van October af.	—	—	—	1 80
9 Melde (tuinmelde) Vervangt de spinazie in den Zomer. Zaai om de derde week van Mei tot einde Jull. Oogst: één maand na zaailing.	1 00	1 40	1 90	4 60

MELOENEN.

Men deelt de meloenen in in twee klassen: de kanteloepen met bijna gladde, geribde vrucht, en de netmeloenen met zeer hobbelige, weinig geribde vrucht. Talrijke proefnemingen hebben ons in staat gesteld alle variëteiten uit te schakelen, waarvan het vleesch niet van eerste hoedanigheid was, namelijk de netmeloenen met monstervruchten.

Men meent, en wel ten onrechte, dat het voor den liefhebber onmogelijk is een goeden uitslag te bekomen in de meloenteelt. Maak U de volgende raadgevingen ten nutte en in uw tuin zult U heerlijke meloenen oogsten.

Zaai begin Maart in voedzamen grond in potten. Verplant rond 20^e Mei, op een 0m40 dikke mestlaag, waarover een 0m20 dikke laag aarde uitgespreid is. Bedek de planten met een glasruit, die op vier baksteen rust.

De meloen brengt stengels voort, die zich gaffelvormig verdeelen. Uit de eerste drie vertakkingen ontstaan mannelijke bloemen, uit de vierde, vrouwelijke. Om het verschijnen der vertakkingen te verhaasten en spoedig vrouwelijke bloemen te bekomen moet men snoeien.

1. Snoei op de eerste twee oogten boven den voet der plant;

2. De twee ranken, na deze snoeiing ontstaan, worden afgeneepen op drie of vier bladeren;

3. De ranken door deze nijping bekomen nijpt men in op vier of vijf bladeren,

4. De ranken daarna gevormd worden op vier of vijf bladeren afgeneepen.

Daarop verschijnen de vrouwelijke bloemen. Behoud twee a vijf meloenen per plant en nijp eindelijk in op drie a vier bladeren boven den meloen. Laat de andere bladeren zich vrij ontwikkelen.

De snoeiingen moeten gedaan worden met een zeer scherp mes. Bepoel de wonden met ongebluschte kalk om ze te doen toegroeten.

Begiet overvloedig om de acht dagen met onze geconcentreerde meststof (zie blz 41), maar vermijd de bladeren en bijzonder den voet der plant nat te maken, daar zij anders snel door kanker zouden aangetast worden. Begiet intusschen met klaar water. Oogst in Augustus-September.



N^o 382. — Zwarte karmelietenkanteloep.

	Zakje	15 gr.	30 gr.	100 gr.
380 Kanteloep Prescott, vroege voor raam	2 80	—	—	—
Middelmatig dik, donkergroen gemarmerd bleekgroen. Geel, oranjeleurig, zeer goed vleesch. Met de volgende de beste om onder raam te forceeren.				
382 Kanteloep, zwarte Karmelieten	3 50	16 00	—	—
Middelmatig dik, met gladde, donkergroene, bijna zwarte huid. Vast, lekker, zoet, geurig, uitstekend. Geharde variëteit, even geschikt om te forceeren als voor koude teelt. De hoogst geschatte.				
383 Kanteloep van Bellegarde of van Montauban	2 50	—	—	—
Een weinig langwerpig, bleekgroen. Helder oranjeleurig rood, dik, zoet, geurig, uitstekend vleesch. Gedijt in vollen grond.				
385 Witte Kanteloep Prescott van Parijs	2 20	9 00	—	—
Dikke, geribde, hobbelige, afgeplatte, die 4 kg. kan wegen. Oranjerood, smeltend, sappig, zoet vleesch. Een der meest geteelde.				
386 Kanteloep van Algiers	2 00	8 00	—	—
Lichtjes langwerpig, donkergroen gemarmerd zilverwit. Geurig, zeer zoet, uitstekend vleesch. Klok, een der meest geharde.				
388 Suikermeloen van Tours (netmeloen)	2 20	—	—	—
Middelmatig dik, donkergroen, met witachtige broderie. Bleekrood, dik, goed vleesch. Gemakkelijk te telen in vollen grond.				
436 Watermeloen	3 00	5 40	9 50	—
Zeer waterachtige meloensoort, vooral gekweekt in warme landen.				
MOLSLA.				
461 Molsla (gewone)	1 40	3 00	5 00	—
Met aangename bitteren smaak. Kostbare sla in den Winter.				
462 — verbeterde volhartige	2 80	12 00	21 00	—
Prachtige bladerbos, die bijna natuurlijk wit wordt.				

PASTINAK (PINKSTERNAKEL).

Het is het best de pastinak slechts rond 15^e Juni te zaaien om van October af te oogsten. Aldus ontwikkelt zij zich niet te zeer en blijft zij malsch en lekker. Om malsche pastinaken te hebben moet men ze uit doen als zij 5 a 6 cm. dik zijn. Dan vormen zij een goede aangenaam smakende groente, die gelijk rapen toebeleid gebruikt worden. De pastinaken zijn zeer kostbaar voor koude streken, want men laat ze zonder beschutting in den grond overwinteren.

	Zakje	15gr.	30gr.	100gr.
434 Pastinak, ronde vroege	1 00	1 50	2 20	5 40
Witte, tolvormige wortel. Deze variëteit alleen is geschikt voor moestuinen.				
435 — lange	1 00	1 50	2 20	5 40
Zeer lange, puntige wortel. Voedervariëteit, vooral gebruikt als voedsel voor paarden. Komt goed van pas in den Winter voor de konijnen.				


PETERSELIE.

Zaai peterselie in Maart-April. Om er gansch den Winter te hebben moet U er begin Juli in 12 tot 15 cm. breede potten zaaien. Graaf deze in den tuin in, breng ze vervolgens in een niet verwarmde plaats, waar zij nog verscheidene maanden zullen opbrengen.

438 Gewone	1 00	1 40	1 90	4 60
Ingesneden, zeer gekruid smakende bladeren, die echter veel gelijken op dollie kervel.				
439 Gekrulde of dubbele	1 00	1 40	2 20	5 40
Zeer fijn gekrulde bladeren, welke niet met die der dollie kervel kunnen verward worden. Het is dus voorzichtig deze kervel te gebruiken in plaats van de gewone.				
441 Gekrulde Nec plus ultra.	1 00	1 80	3 00	—
Lage, zich als breede rozetten uitspreidende gekrulde bladeren. De sierlijkste en meest gebruikte om gerechten te versieren.				
459 Pimpernel, kleine voor salade	1 00	1 60	2 50	—
Doorlevend, zeer gehard. Mooie bladeren, die jong in salade gebruikt worden. Men snijdt ze dikwijls af om er altijd versche te hebben. Zaai ter plaatse in April of in Augustus. Oogst twee maanden na zaaiing.				

POMPOENEN.

237 Mergpompoen, rankende	1 40	3 00	5 00	—
Wordt geplukt als ze 15 cm. lang is. Smaakt als bloemkool.				
243 Pompoen uit Touraine	1 00	1 40	1 80	—
Reuzige vruchten, die gewoonlijk voor het vee gebruikt worden.				
244 — dikke gele Parijsche	1 00	1 80	3 00	—
Kan tot 50 kg. wegen. Uitstekend vleesch. Blijft lang goed.				



N° 334. — Latuw Trocadero.

N° 337. — Dikke, blonde, laatdoorschietende latuw.

TEELT VAN DE MOLSALADE.

De molsla, vooral de verbeterde variëteit met vol hart, verschaft van Januari tot Maart de kostelijkste salade. Te weinig liefhebbers kweeken ze en nochtans kan men ze gemakkelijk winnen.

Zaai er dus van Maart tot Mei, hetzij op kweekbed om op 7 cm. afstand in voren met 25 cm. tusschenwijdte te verpoten, hetzij rechtstreeks ter plaats. In dit geval is het voldoende deze uit te dunnen op dusdanige wijze, dat men denzelfden afstand bekomt als hierboven aangeduid en ze gedurende gansch het goed jaargetijde te laten groeien.

Begin van November af eenige planten te laten bleeken en ga hiermede voort, naarmate U ze noodig hebt. Verwijder daarom al de buitenste bladeren om slechts die van het hart te laten: bedek daarna de planten met een omgezetten bloempot of met 20 cm. losse aarde of zand. Wanneer ze wit geworden zijn, kunt U beginnen te oogsten. Indien U bloempotten gebruikt, zult U gemakkelijk achtereenvolgens het gansch bed kunnen laten bleeken door ieder maal de potten, die U juist weggenomen hebt, op nieuwe planten te plaatsen.

POREIZAAIINGEN.

Om altijd porei te hebben, zaai in Januari vroege porei op kweekbed op warme broeilaag; of, einde Februari, in vollen grond, in goede ligging. Als de planten de dikte hebben van een potlood, zult U ze, na wortels en bladeren ingekort te hebben, in 10 cm. diepe voren en nagenoeg 10 cm. diepe hollen verplanten. Verpoot met den plantstok op een afstand van 8 a 12 cm. volgens de dikte der variëteiten en laat tusschen de rijen een afstand van 30 cm. U zult reeds in Juni-Juli oogsten.

Leg vervolgens in Maart een zaaibed late porei aan in vollen grond, om in Mei te verpoten en van September af te oogsten.

En om een opbrengst te bekomen, die tot de Mei maand zal duren, zaai nog einde April-Mei porei van Hoei of Luik. U zult ze in Augustus verplanten en U aldus gedurende gansch den Winter en de Lente een onafgebroken oogst van dikke porei verzekeren, waarmede U uitmuntende soep en zeer aangename gerechten zult bereiden.


TEEL SNIJBIETEN.

Deze kostelijke en veel te weinig gekende groente is een soort van beet, waarvan de bladeren zich ten koste van de wortels ontwikkeld hebben. Zij brengt groote gegolfde bladeren voort, die men in den Zomer als spinazie jong verbruikt. Bij de snijbiet met eetbaren steel zijn hoofdnerf en bladsteel, zeer ontwikkeld, dik en viezeig; dit is de eetbare steel, dien men afzonderlijk bereidt gelijk selderijribben. Deze heeft een eigenaardigen en zeer aangename smaak.

Zaai dus snijbiet in Maart-April op rijen met 40 cm. tusschenwijdte en dun uit op 40 cm. in de rij. U zult twee maanden na de zaailing beginnen te oogsten. Pluk achtereenvolgens de bladeren naarmate de bladschijf een lengte van 10 cm. bereikt.

Een tweede zaailing in Juli zal U, mits beschutting bij vriesweder, toelaten er den ganschen Winter en de volgende Lente te oogsten.

N° 476. — Dikke winterporei van Hoei.



N° 462. — Verbeterde molsalade.

POSTELEIN.

- 535 Postelein, breedbladige, goudgele** 1 50 4 60 8 00 —
Breede goudgele bladeren. De waarlijk alleen aanbevelenswaardige. Zaai ter plaatse rond 15^e Mei, daarna rond 15^e Juni.
- 224 Winterpostelein van Cuba (Claytonia perfoliata)** 3 00 — — —
Horenvormig, dik, vleezig blad. Vervangt de postelein in den Herfst en in den Winter. Zaailing einde Juli-Augustus.

PREI (POREI).

1. VROEGE PREI.

- 465 Korte dikke zomerporei of dikke uit het Zuiden** 1 00 1 80 3 00 —
De vroegste. Nogal dikke, half lange, uitmuntende stengel. Tamelijk gevoelig voor koude. Wordt gebruikt in den Herfst.
- 467 Dikke gele uit Poitou** 1 60 3 50 6 00 —
Vroege, die snel dik wordt. Nogal korte maar breede stengel. Ook gevoelig voor koude. Om in den Herfst te oogsten.

2. LATE PREI.

- 471 Reuzenprei van Carentan** Kg.: 76 00; 250 gr.: 21 00 1 20 2 50 4 00 10 00
Prachtige veredeling van den zeer dikken Rouaanschen. Half lang maar zeer dik. Kan 6 tot 8 cm. breed worden. Gehard, bestand tegen koude, waarlijk aanbevelenswaardig.
- 472 Dikke groene Brabantsche winterporei** 1 40 2 80 4 60 —
Ook een goede variëteit. Nogal korte, dikke, van onder gezwollen stengel. Volkomen gehard en bestand tegen de koude.
- 473 Lange groene Parijsche winterporei** 1 40 2 80 4 60 —
Dunne, buitengewoon lange stengel. Kan 30 cm. lang worden. Een der meest geharde; bestand tegen de hevigste koude. Veel geteeld door de tuinders rond Parijs.
- 476 Dikke groene winterporei van Hoei. Kg.: 76 00; 250 gr.: 21 00** 1 20 2 50 4 00 10 00
Prachtige plaatselijke variëteit. Sedert een halve eeuw door ons veredeld is deze de volmaakste winterporei geworden. Vroeg geteeld ontwikkelt zij een zeer langen, zeer dikken stengel, die bestand is tegen de felste koude. Later geplant overwintert zij heel wel en wordt steeds dikker tot in Mei zonder in 't zaad te schieten. Is, met de volgende, de beste wintervariëteit.
- 477 Dikke groene winterporei van Luik** 1 90 4 00 7 00 —
Ook een prachtige variëteit onzer streek, voortdurend door verdienstelijke tuinders veredeld. Bereikt reuzige afmetingen en toch is zij volkomen bestand tegen de strengste koude. Lange, dikke stengel en zooals de voorgaande van uitstekende hoedanigheid. Deze twee variëteiten teelt men in gansch Zuid-België.



RADIJZEN

Zaai vroege radijzen in Maart tusschen wortelen en ajuinen. Verzeke U een voortdurende opbrengst door een 2^{de} zaaiing begin April en een 3^{de} einde April. Zaai zomerradijzen begin Mei, Juni en Juli: oogst gansch den Zomer. Zaai eindelijk lange winterradijzen einde Mei, en rond half Juni. Oogst in October en bewaar voor den Winter gelijk wortelen.

1. RADIJZEN OM TE FORCEEREN.

	Zakje	15 gr.	30 gr.	100 gr.
544 Ronde, rose, zeer fijne voor broeiraam.	1 00	1 80	3 00	7 50
545 Ronde, karmijnroode, zeer fijne voor broeiraam	1 00	1 80	3 00	7 50

2. VROEGE RADIJZEN.

		Zakje	15 gr.	30 gr.	100 gr.
548 Ronde, rose	250 gr.: 14 00	1 00	1 60	2 80	6 50
549 Ronde, rose met witte punt.	250 gr.: 12 00	1 00	1 60	2 50	6 00
550 Ronde, scharlakenroode.	250 gr.: 12 00	1 00	1 60	2 50	6 00
552 Ronde, witte		1 00	1 60	2 80	6 50
553 Halflange, rose		1 00	1 60	2 80	6 50

3. ZOMERRADIJZEN.

		Zakje	15 gr.	30 gr.	100 gr.
556 Ronde, gele, rossige		1 00	1 80	3 00	7 50
557 Lange IJkegel		1 00	1 60	2 80	6 50
558 Halflange, rose Chineesche		1 00	1 60	2 80	6 50

4. WINTERRADIJZEN (RAMENAS).

		Zakje	15 gr.	30 gr.	100 gr.
559 Ronde, zwarte (Ramenas)		1 00	1 60	2 80	6 50
560 Lange, zwarte (Ramenas)		1 00	1 60	2 80	6 50
561 Lange, grijze (Ramenas) van Laon.		1 00	1 80	3 00	7 50

RAPEN.**1. TUINRAPEN.**

		Zakje	15 gr.	30 gr.	100 gr.
389 Extra-vroege, ronde, roode van Milaan.	Uiterst vroeg. Best geschikt om te forceeren. Uitmuntend vleesch.	2 00	3 70	6 50	16 00
390 Vroege, platronde, roode, heelbladige	Zeer vroeg. Malsch, lekker vleesch. Schiet niet snel in 't zaad.	1 00	2 00	3 50	9 00
393 Halflange van Vertus, ras Marteau.	Malsch, lekker. Snel gevormd. Oogsten zoodra zij 10 cm. lang is.	1 40	2 50	4 30	11 00
395 Ronde, gele, goudbal	Halfvroeg. Geel, week vleesch, met fijnen, licht bitteren smaak.	1 40	2 50	4 30	11 00

2. VELDRAPEN.

		Zakje	15 gr.	30 gr.	100 gr.
397 Ronde, dikke, witte, roode hals, v. Norfolk. K. 46 00; 250 gr. 14 00		1 00	1 60	2 80	6 50
398 Lange, witte, groene hals, uit Elzas. Kg.: 56 00; 250 gr.: 16 00		1 00	1 80	3 00	7 50
399 Lange, witte, roode hals, uit Palts. Kg.: 56 00; 250 gr.: 16 00		1 00	1 80	3 00	7 50



RHABARBER.

- 568 **Mitchell's Royal Albert**
 Zeer vroeg. Zeer groote, roodgevekte, uitstekende bladstelen.
- 570 **Queen Victoria**
 Dikke, lange bladstelen van goede hoedanigheid. Bloeit weinig.

Salade: zie Latuw.

Scarol: zie Andijvie (Ongekrulde).

SCHORSENEEREN.

- | | Zakje | 15 gr. | 30 gr. | 100 gr. |
|---|-------|--------|--------|---------|
| 576 Witte of Salsifis
Gladde wortelen. Schorseener der vaste gronden. | 1 40 | 2 50 | 4 00 | — |
| 584 Zwarte
Dik, uitstekend. Kostbare groente voor wintervoorraad. Schorseeneren worden einde April gezaaid en van October af geoogst. | 1 90 | 3 50 | 5 40 | 14 00 |
| 586 Russische Reuzenschorseener
Lang, glad, extra. Veredeling van de voorgaande. | 2 20 | 4 30 | 7 50 | — |

SELDERIJ.

N° 91. — Volle goudgele seldery.

Zeer vraatzuchtig, eischt veel water en een frisschen, voedzamen, vooral potaschhoudenden grond. Men zal overvloedig begieten met onze geconcentreerde meststof (zie blz. 41).

Bevochtigt de jonge planten, alvorens ze te verpoten, in eene oplossing van Bordeauxsche pap om ze tegen den roest te vrijwaren. (zie blz. 41).

Snijseldery. — Zaai in Maart en verplant in Mei. Van Juni-Juli af, zult U de bladeren beginnen te oogsten. Snijd ze af boven den wortelhaals en begiet telkens om een nieuw uitschieten te bevorderen. De struikseldery is tamelijk goed bestand tegen koude. U kunt ook in October eenige planten in potten uitplanen om ze binnenshuis te bewaren voor den Winter.

Bleekseldery. — U kunt er het gansche jaar hebben.

Maak een warme broeilaag gereed zooals aangeduid is blz. 3. Zaai er bleekseldery in Januari en verpoot ze, zoo mogelijk, een eerste maal op broeibed; plant ze in vollen grond einde Maart. Bind drie weken alvorens te oogsten de bladeren samen en omwikkel ze met een weinig stroo of liever met pakpapier om ze te laten wit worden. Zulks is volstrekt noodzakelijk.

Doe einde Maart een tweede zaailing, die tevens de voor-naamste is. De planten, einde Mei verpoot, zal men oogsten van Augustus af en zullen ook dienen als wintervoorraad. De planten, die men wil laten overwinteren zal men niet ter plaatse laten wit worden. Doe ze in October uit met een weinig aarde, om ze naast elkander op den bodem van een 30 cm. diepe groeve te verplanten, waarna U ze op de twee derden van hun hoogte met droge aarde bedekt. Leg er, als het dreigt te vriezen, een stroodek op, maar neem het weer af, als de warmtegraad het toelaat. Na drie weken zult U beginnen te oogsten.

Laatste zaailing in Juni. Verpoot in Augustus en bedek ze met een raam in den Winter. Oogst in Maart-April.

1. SNIJSELDERY (BLADSELDERY).

- | | Zakje | 10 gr. | 15 gr. | 30 gr. |
|---|-------|--------|--------|--------|
| 87 Gewone, met dunne scheuten
Welriekende bladeren. Smakelijk toeckruid voor groentesoep. | 1 00 | 1 60 | 2 20 | 4 40 |

2. BLEEKSELDERY.

- | | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|
| 90 Volle, witte, korte, vroege, met dikke stelen
Zonder wortelscheuten. Dikke stelen, die men laat wit worden. | 1 40 | 2 80 | 3 70 | 7 40 |
| 91 Volle, witte, goudgele verbeterde Chemin
Natuurlijk witte stelen. De beste. Men moet ze niet laten wit worden, hoewel dit er den smaak aanmerkelijk van verfijnt. | 3 50 | 12 00 | 16 00 | 32 00 |
| 92 Volle, witte, Amerikaansche
Breede stelen. Wordt zeer malsch als men ze van licht beroofd. | 2 00 | 5 00 | 7 00 | 14 00 |
| 93 Volle, goudgele, met rose stelen
Bleekrose stelen. Een der beste voor herfstteelt. | 2 50 | 6 50 | 9 00 | 18 00 |
| 94 Volle, violette van Tours
Gehard en kloek. Zeer bestand tegen koude en vochtigheid. | 1 40 | 2 80 | 3 70 | 7 40 |

3. KNOLSELDERY.

- | | | | | |
|---|------|------|------|-------|
| 95 Knolseldery van Erfurt
Zeer vroeg. Ronde, gladde, middelmatig dikke, lekkere wortel. | 1 50 | 4 00 | 5 40 | 10 80 |
| 96 — reuzige van Praag
Ronde, groote, weinig vertakte wortel, van goede hoedanigheid. | 1 40 | 3 50 | 4 60 | 9 20 |

SJALOT.

- 265 Sjalot, gewone (bollen) . Kg.: 7 00; 500 gr.: 4 00; 250 gr.: 2 50
Plant vanaf Februari om te oogsten in Juli-Augustus.

SNIJBIET.

- 478 Snijbiet, gewone blonde
Talrijke, breede, gegolfde, schoon blondgroene bladeren.
- 479 — met witte ribben
Breede, zeer groote, lange, vleezige, smakelijke bladstelen. De meest opbrengende en beste snijbiet met bladrib.
- 480 — roodribbige uit Chili.
Zeer breede, karmozijnroode bladsteel en bladrib. Donkergroene bladeren. Niet zeer fijn van smaak, maar zeer sierlijk.

SPINAZIE.

Zaai: 1. Einde Februari: oogst in Mei; 2. Van 15" tot 20" Augustus: oogst in den Herfst; 3. Begin September: oogst in Winter en Lente.

In den Zomer schiet spinazie in 't zaad. Vervang ze door tuinmelde (n° 9), ijskruid (n° 286), snijbiet (n° 478), Nieuw-Zeelandsche spinazie (n° 589).

- 268 Spinazie, Hollandsche.
269 — monsterachtige van Viroflay.
Kloek en gehard. Reuzige bladeren.
- 270 — traagopschietende
272 — Triomf
Groot, donkergroen, gebaard, vleezig blad.
- 274 — Engelsche, met stekelig zaad.
Schiet niet snel in 't zaad. Zaai in de Lente.

- 432 Engelsche winterspinazie (Zurkelspinazie of Patiëntie)
Zeer bestand tegen vorst. Heeft een smaak tusschen zuring en spinazie; deze laatste vervangt zij in den Winter.


- 589 Nieuw-Zeelandsche spinazie
Vervangt de spinazie in den Zomer. Zaai in potten in Maart.

— Suikerij: zie Cichorei.

Zakje	15 gr.	30 gr.	100 gr.
—	—	—	1 50
1 00	1 40	2 20	5 40
1 00	1 60	2 80	6 50
1 20	2 00	3 50	—

15 gr.	30 gr.	100 gr.	250 gr.	500 gr.	Kilogr.
1 00	1 40	3 00	6 00	11 00	19 00
1 00	1 40	3 00	6 00	11 00	19 00
1 00	1 40	3 50	7 00	12 00	21 00
1 00	1 40	3 50	7 00	12 00	21 00
1 00	1 40	3 50	7 00	12 00	21 00

Zakje	15 gr.	30 gr.	100 gr.
1 60	3 50	5 40	—
1 40	2 20	3 70	—



N° 557. — Lange ijskegel zomerradijs.

N° 604. — Tomaat Perdrigeon.

TOMATEN.

Worden gezaaid begin Maart en verplant einde Mei. Zie teelt blz. 62.

	Zakje	15gr.	30gr.	100gr.
595 Roode, dikke, vroege	1 40	4 60	8 00	—
Zeer vroeg. Middelmattig dikke, geribde. Veel opbrengend.				
599 Chemin, roode vroege	2 50	9 50	16 00	—
Vroeg, kloek, uitstekend. Dikke, gladde vrucht. Aanbevolen.				
601 Koningin der vroege	2 00	8 00	14 00	—
Kloek, veel opbrengend, bestand tegen ziekte. Gladde vrucht.				
603 Roode, zeer vroege voor vollen grond	2 00	8 00	14 00	—
Goede, vroege kloeke variëteit. Schoone, weinig geribde vrucht.				
604 Perdrigeon	2 50	9 50	16 00	—
Zeer groote, vuurroode weinig geribde vrucht met vast, fijn vleesch. Brengt het meest op. Het best bestand tegen ziekte				
606 Wonder van de Markt	2 50	9 50	16 00	—
Kloek en gehard. Veel opbrengend. Veel gevraagd in den handel.				
608 Mikado, scharlakenroode	2 20	9 00	15 00	—
Te telen onder glas. Zeer groot, schoon rood, uitstekend.				


VELDSALADE.

Deze wordt begin Juli met volle hand in een ajuinbed gezaaid om van September-October af een zeer lekkere salade te verschaffen. Een tweede zaailing einde September zal U een onafgebroken opbrengst verschaffen tot in Maart-April. Deze groente komt bijzonder wel van pas in den Winter.

362 Groene, verbeterde, rondbladige	1 00	2 00	3 50	8 00
Korte, breede, rondachtige rechtopgroeijende bladeren. Extra.				
365 Hollandsche, met dik zaad.	1 60	2 80	4 60	12 00
Breede, dichtgroeijende, langwerpige, dikke, malsche bladeren.				
366 Volhart, groene of groene van Louviers	1 40	2 50	4 00	10 00
Korte rondachtige bladeren die in het midden een soort van goed volle, zeer malsche krop vormen. Zeer goed, veel opbrengend, bestand tegen koude, laat zich goed verzenden.				
368 Met geel hart of goudgele (gevlekte).	2 80	5 00	8 50	21 00
Vooral geteeld ten onzent. Zeer merkwaardig en mooi. In de Lente vormt zij een rozet met goudgele vlekken. Zeer smakelijk.				
369 Italiaansche, met latuwbladeren	2 00	3 70	6 50	16 00
Kloeke plant met dik, zeer breed, gegolfd, goudgeel blad. Zeer bestand tegen koude. Overvloedige opbrengst.				

WORTELEN.

1. — In Februari-Maart. — Zaai korte wortelen in goede standplaats en bedek met lichte aarde. U zult einde Mei oogsten. Houdt U niet van korte wortelen, zoo kunt U in Maart halflange wortelen zaaien, die einde Juni-Juli hun opbrengst zullen leveren.



N^o 71. — Halflange wortel van Hoei.

2. — In April en einde Mei. — Leg twee achtereenvolgende zaai-bedden aan met halflange of lange wortelen voor den wintervoorraad. Trek in October-November de planten uit; snijd de bladeren met den wortelhals af en laat de wortelen drogen. Berg ze dan in een luchtigen kelder of in een plaats, waar het niet vriest. Daar zult U ze bewaren voor den Winter door ze met zandachtige teelaarde te mengen. U kunt ze ook in silo's leggen, waar U ze heel wel zult bewaren.

3. — Van 15 tot 31 Juli. — Zaai nog halflange wortelen maar trek ze niet vóór den Winter uit. Zoodra het begint te vriezen, bedek de planten met doode bladeren, met stroo, enz., en laat ze in den grond. Vanaf Maart-April, wanneer de wortelen in kelders en silo's beginnen te rimpelen, zult U het genoeg hebben uitmuntende verse wortelen te oogsten.

EENIGE WENKEN.

Om goede gladde en rechte wortelen te hebben, moet U de aarde wel bewerken en verkruijmen alvorens te zaaien.

Tamelijk dik zaaien. Men dunt uit bij het oogsten, naarmate de planten de dikte van een pink bereiken. De halflange wortelen moeten op 5 cm. afstand uitgedund worden, de lange op 6/8 cm. om tot hun volledige ontwikkeling te kunnen geraken.

Het gebeurt misschien, dat uw wortelbedden, na goed opgeschoten te zijn, plotseling op plaatsen vernietigd worden en slechts stukken rijen vormen met groote ledige plekken. Dat is het werk van een microscopische spin, de «theridion», die de jonge zaai-bedden aantast. Er is weinig noodig om haar verwoezingen te beletten: trappel bij het verschijnen van de eerste scheutjes uw rijen op hun gansche lengte vast of begiet ze met een oplossing van roet in water.

1. WORTELEN.

		Zakje	15 gr.	30 gr.	100 gr.
65	Wortel, roode, zeer korte, uiterst vroege broei Kleine, bolvormige wortel. Vooral geschikt om te forceeren. Uitdunnen om zeer jong te gebruiken.	1 90	4 30	7 50	—
68	— roode, korte, vroege Hollandsche of Bellot Tolvormig. Vervroegde teelt en eerste zaaiingen in vollen grond.	1 80	3 70	6 50	16 00
69	— roode, halflange, stomppuntige van Guérande Een weinig langer en veel dikker. De diameter kan tot 10 cm. bereiken. Zeer malsch, rood vleesch; bleeker midden.	1 20	2 50	4 30	11 00
70	— roode halflange van Nantes. . Kg.: 64 00; 250 gr.: 18 00 Dik, zonder hart, uitstekend. Een der goede soorten voor kleine tuinen. Aanbevelenswaardig voor wintervoorraad.	1 00	2 00	3 50	8 00
71	— roode, halflange van Nantes, zonder hart; verbeterde van Hoei Kg.: 96 00; 250 gr.: 26 00 Merkelijke verbetering van de voorgaande. Geheel zonder hart, lang, lekker, veel opbrengend. De beste tuinwortel. Zaaien in Maart-April om einde Juni te oogsten; of begin Mei om in den Herfst te oogsten. Haar fijne smaak doet ze dikwijls verkiezen boven lange wortelen voor den wintervoorraad.	1 40	3 00	5 00	12 00
72	— roode, halflange, zonder hart, verbeterde van Carentan. Rolvormig, glad, zeer rood, middelmatig dik maar volmaakt van vorm; fijne, zeer lekkere prachtwortel.	1 60	3 50	5 40	14 00
73	— roode, halflange van Chantenay. K. 80 00; 250 gr.: 23 00 Zeer dik, stomppuntig, verlengde wortel van Guérande. Zeer rood vleesch met wat bleeker midden.	1 20	2 50	4 30	11 00
75	— roode, lange, stomppuntige, zonder hart Lange, rolvormige, zonder hart, rood vleesch, goede smaak. Veel opbrengend. De beste voor wintervoorraad. Zaaien begin Mei om in October-November te oogsten.	1 60	3 50	5 40	14 00
77	— roode, lange van Sint-Valery. Kg.: 64 00; 250 gr.: 18 00 Zeer gehard en uiterst veel opbrengend. Paart de verdiensten der tuinwortelen met die der rassen voor teelt in 't groot.	1 00	2 00	3 50	8 00

2. VELDWORTELEN.

De veldwortelen zijn uitmuntend voor konijnen en vee.

78	Wortel, roode, lange met groenen hals. 250 gr.: 16 00	1 00	1 80	3 00	7 50
79	— gele, stomppuntige van de Doubs. 250 gr.: 16 00	1 00	1 80	3 00	7 50
81	— witte, met groenen hals, verbeterde K.: 46 00; 250 gr. 14 00	1 00	1 60	2 80	6 50

ZURING.

Zuring verbetert den smaak van groentesoep en dient om tal van spijzen toe te bereiden. Zij wordt gemengd met inmaakmoes, die in den Winter wel van pas komt.

Zaai ze in Maart om gansch den Zomer, in den Herfst en zelfs 's Winters te oogsten. Al is zij doorlevend, toch is het goed ze ieder jaar opnieuw te zaaien om een overvloedige opbrengst te bekomen.

Pluk zuring altijd gelijk spinazie, blad vóór blad, en laat de middelste blaadjes zich ontwikkelen, die de opbrengst zullen doen voortduren.

Hierbij: N° 430. — Zuring van Belleville.



430	Breedbladige van Belleville	Zakje	15 gr.	30 gr.
	Schoone, breede, geblaarde, zuiver groene bladeren. Veel opbrengend. Verreweg de meest verspreide, vooral voor teelt in 't groot.	1 40	2 50	4 30

TABAK.

609	Havane.	Zakje	10 gr.	30 gr.
610	Maryland.	1 50	4 00	—
611	Obourg.	2 00	6 00	—
612	Petit Grammont.	1 50	4 00	—
613	Semois.	1 50	4 00	—
		2 00	6 00	—

ZADEN VAN GENEESKRACHTIGE EN TOEKRUIDPLANTEN.



N° 633. — Gewone tijm.

De meeste dezer planten worden geoogst, als ze in bloei staan. Men moet ze in de schaduw, maar op den kortsten tijd mogelijk laten drogen. Als ze goed droog zijn, wikkelt men ze in papier of doet men ze in luchtdicht sluitende doozen, die men in een droge kamer plaatst. Aldus kan men ze verscheidene jaren bewaren.

Aftreksel van alsem is wormverdrijvend, anijszaden bevorderen de spijsvertering; bernagie is waterafdrijvend en zweetverwekkend, dille eetlustwekkend; hysop, citroen-melisse en rozemarijn prikkelen de maag, salie is zenuwsterkend.

Eindelijk worden vele dezer planten als toekruid gebruikt en zij zijn onmisbaar om tal van fijne gerechten te kruiden, waaraan zij een aangenaam prikkelenden smaak geven.

	Zakje		Zakje
614 Alsem	4 00	622 Lavendel	3 00
616 Anijs, groene	1 40	623 Marjolein, éénjarige	1 40
617 Bazielkruid (Basilicum)	1 50	624 — doorlevende	3 50
618 Bernagie	1 40	626 Peper, lange, roode Spaansche	2 00
630 Boonenkruid, gewoon of éénjarig.	1 40	627 — zachte Spaansche	3 00
631 — doorlevend	3 00	628 Rozemarijn	3 00
625 Citroen-melisse	3 00	632 Salie	2 00
620 Dille	1 20	633 Tijm, gewone	3 50
621 Hysop	3 50	634 — winter	3 50
619 Karwij	1 20	629 Wijnruit	2 00

SORTEERINGEN VAN GROENTEZADEN.

Vele personen, die over een moestuin beschikken, hebben slechts een oppervlakkige kennis van groenteteelt. Deze zullen in deze sorteringen de nuttigste en meest gebruikte groentesoorten vereenigd vinden. Daar de sorteringen vooruit ingepakt zijn, zijn ze ondeelbaar en kunnen wij er geen verandering aan toebrengen. Natuurlijk kunnen onze klanten er andere artikelen uit den catalogus doen bijvoegen.

636 Voor kleinen tuin: 16 soorten en variëteiten fr. 32 00

405 Ajuin 15 gr.	99 Kervel 30 gr.	535 Postelein zakje	260 Tuinkers. 15 gr.
295 Boon 100 »	284 Labboon 250 »	471 Prei »	365 Veldsla zakje
313 — 100 »	321 Latuw 15 »	550 Radijs 15 gr.	71 Wortel 15 gr.
496 Erwt 250 »	337 — zakje	269 Spinazie 30 »	430 Zuring zakje

637 Voor middelmatig grooten tuin: 32 soorten en variëteiten fr. 75 00

405 Ajuin 15 gr.	436 Erwt 250 gr.	439 Peterselie 15 gr.	95 Selderij zakje
420 — 15 »	496 — 250 »	535 Postelein zakje	479 Snijbiet 15 gr.
122 Andijvie(gekr.) zakje	510 — 250 »	471 Prei 15 gr.	269 Spinazie 100 »
125 — (ongekr.) »	99 Kervel 30 »	476 — zakje	260 Tuinkers. 15 »
235 Augurk. 15 »	284 Labboon 250 »	390 Raap 15 gr.	365 Veldsla 15 »
295 Boon 100 gr.	321 Latuw 15 »	550 Radijs 15 »	68 Wortel zakje
313 — 250 »	338 — 15 »	560 — 15 »	71 — 15 gr.
134 Cichorei 15 gr.	340 — zakje	584 Schorseneer 15 »	430 Zuring zakje

638 Voor grooten tuin: 44 soorten en variëteiten fr. 128 00

450 Ajuin 30 gr.	134 Cichorei 30 gr.	321 Latuw 15 gr.	560 Radijs 15 gr.
410 — 15 »	483 Erwt 250 »	328 — zakje	584 Schorseneer 15 »
420 — 15 »	486 — 250 »	334 — 15 gr.	91 Selderij zakje
122 Andijvie(gekr.) 15 »	500 — 250 »	338 — 15 »	95 — »
125 — (ongekr.) 15 »	510 — 250 »	340 — zakje	479 Snijbiet 15 gr.
235 Augurk. 15 »	99 Kervel 100 »	439 Peterselie 15 gr.	269 Spinazie 100 »
31 Beetwortel. 15 »	146 Kool zakje	535 Postelein 15 »	260 Tuinkers. 30 »
295 Boon 100 »	158 — »	471 Prei 30 »	365 Veldsla 30 »
300 — 250 »	166 — »	476 — 15 »	68 Wortel 15 »
313 — 250 »	175 — »	390 Raap 15 »	71 — 30 »
318 — 100 »	284 Labboon 250 gr.	550 Radijs 30 »	430 Zuring zakje



EEN NIEUW HULPMIDDEL VOOR DE HUISVROUW

INGEMAAKTE

GROENTEN.

Hebt U reeds gedacht aan het bijkomstig nut, dat U uit uw tuin kunt trekken door het inmaken van groenten. Dit zal U toelaten den oogst gansch het jaar te doen voortduren en U in den Winter dikwijls kostelijke aankopen besparen. Zulks moet U voorzien van Januari af, want U zult een lot of wat grootere hoeveelheid moeten zaaien van de groenten, waarvan U een deel zult willen innemen en de variëteiten moeten kiezen, die hiervoor bijzonder geschikt zijn. Ziehier dus enkele aanduidingen.

MOES.

Maak in onder dezen vorm hetzij afzonderlijk, hetzij gemengd: zuring, spinazie, kervel, postelein. Zulk mengsel maakt hét ons mogelijk in eenige minuten een uitmuntende groentesoep te bereiden. Deze zal nog veel beter en meer gebonden zijn indien U bij het klaarmaken van het moes er wat erwten bijgevoegd hebt. Vergeet ook niet tomatenmoes, zoo onmisbaar voor velerlei sausen en smakelijke groentesoep.

Laat uw groenten langen tijd in zoutwater koken, en vervolgens door een zeef gaan; laat het moes dan op een zacht vuurtje stoven tot het goed dik is. Laat het daarna lauw worden en vul er gewone bokalen mede, die U, als ze koud geworden zijn, met een laag gesmolten vet zult dichtmaken. Deze bokalen zult U op een droge plaats wegzetten.

Het is vooral de lentezaaiing die de inmaakgroenten verschaft. Bezaai dus begin Maart een goed stuk grond met gekrulde kervel, monsterachtige spinazie van Viroflay, breedbladige zuring van Belleville, en zaai wat Perdrigeon-tomaten in kistjes om zeer vroeg pootplanten te hebben. Zaai vervolgens, in goede ligging, einde Maart, de lage erwten «De onovertroffene», en begin Mei de goudgele postelein. Zoo zult U zeer vroege oogsten bekomen.

GEDROOGDE GROENTEN.

Boonen met draad en erwten met rond zaad, die men op de plant laat rijp worden, leveren uitmuntende droge zaden, die op allerhande manier benuttigd worden. Zaai dus te dien einde eenige goede variëteiten om een overvloedigen oogst te bekomen. Zaai bovendien, om zeer gemakkelijk groene en malsche zaden te hebben, den 15^e Mei, de lage flageoletboon Chevrier en de hooge doperwten Senator. Pluk de peulen, als ze reeds vol maar nog groen zijn; laat ze drie minuten koken in zoutwater en vervolgens in de schaduw op horden drogen, om ze vervolgens op eene droge plaats te bewaren. Haal, als U ze gaat gebruiken, de boonen uit de peulen en laat ze eenigen tijd in koud water weken. Aldus zullen ze malsch en smakelijk zijn.

Om gansch het jaar een keur van uitmuntende en kostbare aromatische planten te hebben, denk er aan een hoekje van uw tuin vrij te laten om een weinig venkel, marjolein, boonenkruid, salie en tijm te zaaien (zie blz. 24). Niet alleen zult U er den ganschen Zomer van oogsten, maar U zult er een deel van in de schaduw zoo snel mogelijk laten drogen en dit in zakjes bewaren voor den Winter. Laat op dezelfde wijze een weinig peterselle en snijselferdig drogen, waarmede U in den Winter uw groentesoepen lekker zult kunnen kruiden.

HET IN ZOUT LEGGEN.

U zult vooral op deze wijze inleggen: jonge peulen van labboonen, boonen zonder draad en peulerwten die men geheel laat, knollen van selderij in 3 cm. dikke sneden en witte kabuiskool, die uitstekende zuurkool zal verschaffen.

Vul potten met elk van deze rauwe groenten in lagen van 3 cm., onderling door een zoutlaag gescheiden. Eindig met een zoutlaag en druk het geheel onder een bord, waarop U een zuiveren steen legt. Giet na acht dagen de gevormde pekels uit den pot en vul hem met verse. (De pekels is goed als een rauw ei er in bovendienrijft.)

Tomaten legt men geheel in; men doet ze eenvoudig in een pot, dien men boordevol met pekels vult; deze pekels moet noodzakelijkerwijze na acht dagen éénmaal vernieuwd worden. Wat kervel betreft, het is voldoende ze in zout te rollen en goed vast te drukken in een pot, onder een bord, waarop men een steen legt.

Als men deze groenten gaat gebruiken, is het eenigste middel om ze te ontdoen van het overvloedige zout, ze eenige uren te laten weken in koud water, dat men dikwijls vernieuwt of beter nog ze eenigen tijd onder een koude waterstraal te plaatsen. Kook ze vooral niet onmiddellijk, want daardoor zou het zout zich vastzetten, dat zich anders in het koud water zou opgelost hebben.

Vergeet ook niet van 15^e Februari af, gewone dikke labboonen in kistjes te zaaien, die, aldus vervroegd, niet door bladluizen zullen aangetast worden. Zaai begin Maart de reuzige raapselderij van Praag in kistjes en de witte kabuiskool Quintaal in vollen grond in goede ligging, om ze einde Mei te verpoten. Zaai een tamelijk groote hoeveelheid staakprinsessenboonen en peulerwten en zorg er voor genoeg kervel en tomaten te hebben.

STERILISATIE.

Eindelijk is het volmaakste en practische middel het bewaren in luchtdichte bokalen V.S.L., die men eenigen tijd in kokend water laat steriliseeren. Deze bokalen V.S.L., door de beroemde kristalfabrieken van Val-Saint-Lambert vervaardigd en door ijzerkramers en handelaars in glaswerk verkocht, verwezenlijken het maximum van duurzaamheid en weerstand tegen hitte; zij zullen U toelaten gemakkelijk groenten te bewaren, die hun goeden smaak zullen behouden zoodanig, dat men ze niet van verse groenten zal kunnen onderscheiden. De inhoud van 1/4 liter tot 5 liter, laat toe ze te gebruiken zoowel voor kleine huishoudens als voor groote gestichten en hun zeer gematigde prijs stelt ze in het bereik van alle beursen.

Gebruik ze om zeer fijne groenten te bewaren, waarvan het seizoen altijd te kort schijnt: asperges, jonge wortelen, selderijstelen, paddenstoelen, bloemkool, erwten, jonge peulen van boonen, van labboonen en van erwten, tomaten, enz., waarvan U het gebruik gansch het jaar zult doen voortduren.

De kristalfabrieken van Val-Saint-Lambert zijn zoo vriendelijk geweest ons een aantal hunner brochures ter hand te stellen met de noodige inlichtingen voor het verduurzamen van alle spijzen. Zoudt U wenschen er een in uw bezit te hebben, wees dan zoo goed het ons te laten weten; wij zullen ons haasten ze U kosteloos toe te sturen.

Wat den ketel betreft, noodig om er uw bokalen in te laten koken, U kunt heel wel een eenvoudigen breeden en hoogen kookketel gebruiken, waarin U van onderen een laag hooi zult leggen, opdat de bodem der bokalen niet rechtstreeks blootgesteld zij aan een te groote hitte. Een kleine glazen thermometer zal U toelaten van tijd tot tijd den warmtegraad van het water vast te stellen. Er bestaan natuurlijk in den handel bijzondere ketels, die zelfs door verscheidene huisgezinnen gemeenschappelijk zouden kunnen gekocht worden, maar, zooals wij hierboven getoond hebben, is zulks niet noodzakelijk.

Het is nu uw zaak te bepalen, welke hoeveelheid van elke groente U moet zaaien om U dezen bijkomstigen oogst te verzekeren. De variëteiten, waaraan de voorkeur dient gegeven te worden, zijn: de halflange wortel van Hoel, de volle goudgele selderij Chemin, de bloemkool Lenormand, de gewone dikke labboon, de staakprinsessenboon zonder draad, de hooge erwten Senator en de tomaat Perdrigeon. Deze zijn de lekkerste en de meest opbrengende.

En welk genoegen zal het dan voor U zijn in het hartje van den Winter overvloedig afwisseling te kunnen brengen in uw maaltijden, uw gezin een gezonde en weinig kostelijke voeding te verzekeren en, onafhankelijk van de temperatuur, het uur of het aantal gasten, in eenige oogenblikken een smakelijken maaltijd te kunnen bereiden.



Personen, die gaarne veel bloemen kweeken zullen op blz. 62 kostbare aanduidingen vinden over de te kiezen soorten, de manier van ze te schikken en de zorgen die men er aan moet besteden. De hieronder volgende aanwijzingen zijn bijzonder bestemd voor hen, die maar over weinig plaats beschikken om bloemen te telen.

DE BLOEMEN VAN DEN KLEINEN LIEFHEBBER.

De liefhebber, die slechts eenige bloemen wenschte te kweeken, vindt het soms heel moeilijk zijn keus te doen. Wij zullen hem hierbij behulpzaam zijn.

Om de boordbedden van zijn kleinen tuin te versieren en eenige ruikers te kunnen maken, zal hij eenige overblijvende planten telen, die een groot aantal jaren leven en als grondslag zullen dienen voor de bloemenversiering. Daartusschen zal hij elk jaar eenige éénjarige planten zaaien, die meer kleur en verscheidenheid zullen bijbrengen.

OVERBLIJVENDE PLANTEN. — Ziehier een keus van zeer goede soorten, naar verdienste gerangschikt: Overblijvende Delphinium (n° 1176), Overblijvende Phlox (n° 1168), Campanula persicifolia (n° 882), Overblijvende lupinus (n° 1037), Achillea Ptarmica (n° 796), Oostersche Papaver (n° 1113), Erigeron speciosus (n° 943), Gypsophila (n° 991).

De volgende zijn lage planten dienstig voor bloemranden: Pluimanjelier (n° 1089) in de zon; Primula (n° 1195) in halfschaduw; Viooltje (n° 1315) in de schaduw.

Teelt. — Zaai de zaden in April op een van teelaarde voorzien bloembed. Verpoot, als de planten eenige bladeren hebben, op 25 cm. afstand en plant ter plaats in de Lente van het tweede jaar. Bloeitijd: eerste of tweede jaar. Papavers en Lupinen zaait men bij voorkeur op de plaats zelf, waar ze moeten groeien.

Als de bossen een te grooten omvang krijgen, moet men ze in Maart splitsen. Neem de buitenste deelen van den bos en verplant ze op een andere standplaats.

EENJARIGE PLANTEN. — De kleine liefhebber zal zijn keus beperken tot de zes beste soorten, die naar orde van verdienste gerangschikt zijn: Aster (n° 1210 tot 1223), Zomerviolier (n° 960 tot 967), Antirrhinum (n° 1062, 1064), Chineesche anjelier (n° 1081, 1083, 1085), Phlox Drummondii (n° 1160, 1161, 1165), Helichrysum (n° 1010, 1013). Deze laatste, vóór het ontkiemen der knoppen afgesneden en in de schaduw gedroogd, kan men den ganschen Winter bewaren en zal dienen tot het vervaardigen van droge bloemtullen.

Teelt. — Zaai rond 15^e April op beschut bloembed van teelaarde voorzien. Verpoot, als de planten eenige bladeren hebben, op 15 cm. afstand en plant ze een weinig later ter plaats. Men kan ze ook ter plaats zaaien en na het opkomen uitdunnen, maar planten en bloemen zijn minder schoon.

Om vroeger van den bloei te genieten zaait men onder raam rond 20^e Maart. Plaats op den grond tegen een muur of een haag, die als schutsel zullen dienen, een bodemloze kist, die U vult met teelaarde of lichte grond. Zaai en bedek het geheel met eene glasruit. Verpoot na het opkomen de planten in den tuin, op kweekbed of ter plaatse.

LENTEBLOEMEN. — Om van de maand April af bloemen te hebben, moet men in Juli in den hof de volgende soorten planten: Viola's (n° 1115 tot 1133), Bellis (n° 1105 tot 1107), en Myosotis (n° 1070 tot 1074). Verplant na het uitkomen der zaden op 10 cm. afstand en verpoot ter plaats in October na het uitbloeien der éénjarige zomerbloemen.

KLIMPLANTEN. — Zij zijn nuttig om onze muren en priëlen, enz., te versieren. De schoonste en het gemakkelijkst om te kweeken zijn: de Tropaeolum majus (n° 894), de Tropaeolum Lobbianum (n° 896), de Phaseolus multiflorus (n° 995), en de Ipomea (n° 1015). Zaai ter plaats rond 15^e April. Bind in den Zomer de zich ontwikkelende stengels op.

Zaai, om vroeger bloemen te hebben, rond 20^e Maart in potten 3 of 4 zaden per pot; plaats ze onder raam of van binnen op een vensterbank.



N° 907. — Herbloeiende zomerviolier Excelsior.



N° 1085. — Chineesche Anjelier Heddwigii.



BLOEMTUINKALENDER

De letters op het einde van elken regel in de naamlijst der bloemzaden (van blz. 30 tot blz. 38) verwijzen naar de paragrafen van den hierna volgende zaai kalender. In de naamlijst hebben wij ook naast elke plant aangestipt, of zij éénjarig, tweejarig, doorlevend ofwel een knolgewas is. Deze aanduidingen zullen U toelaten onmiddellijk te zien, in welke onderverdeling van de paragraaf U de plant zult terugvinden, waarin U belang stelt.

De éénjarige bloemen zaait men van Januari tot in Mei op warme broeilaag, op kweekbed of ter plaats. Zij bloeien in het jaar zelf der zaailing en worden door de vorst vernietigd.

De twejarige worden gezaaid van April tot in September, verspeend en daarna in October of in Maart-April verplant en geven hun bloemen in de Lente of in den Zomer.

De doorlevende zaait men over 't algemeen in de Lente; men kweekt ze heel den Zomer op kweekbed en plant ze ter plaatse in den Herfst of in de Lente. Zij leven jaren lang. Enige bloeien reeds in het jaar der zaailing, terwijl andere eerst het tweede jaar hun volkomen ontwikkeling bereiken. De knolgewassen worden onder glas gezaaid in Januari-Februari, in teilen verspeend, daarna ter plaatse geplant in potten of in den tuin volgens de soorten. Na het uitbloeien laat men den grond uitdrogen, men doet de bollen uit, bewaart ze op een droge plaats in den Winter en laat ze opnieuw groeien in Maart.

ZAAIING ONDER GLAS.

Men zaait onder glas op twee manieren: 1. In een broeikas of in een regelmatig verwarmd vertrek; 2. Op warm broeibed.

Zaailing in een broeikas of in een vertrek. — Zaai in kistjes, potten, teilen, die goed gedraineerd en tot op 1 cm. van den rand met teelaarde gevuld zijn. Deze teelaarde zult U bereid hebben door in een hoek van den hof bladeren en allerlei afval op te hoopen, die U met mest, aarde en kalk of assche vermengt en daarna goed laat verteren. Zaai dun, bedek de zaden met eenige millimeters aarde, behalve de zeer fijne, die men eenvoudig door een lichte drukking aan den grond doet kleven. Begiet zachtjes, bedek de kistjes met een glasruit en plaats ze, bij gebrek aan broeikas, in een goed verlichte en verwarmde veranda of op een vensterbank in de keuken. Draag er zorg voor, dat de lucht in deze plaatsen altijd tamelijk warm zij, zelfs 's nachts. Droog iederen morgen de glasruit af om de vochtigheid te doen verdwijnen. Houd den grond goed frisch. Neem de ruit weg, zoodra de eerste scheutjes verschijnen. Verspeen in kistjes, die U in het vertrek laat, of in den hof tegen een muur in goed beschutte standplaats zet, wel zorg dragende te voor den nacht binnen te brengen of met zakken te bedekken. Als de planten een zekere ontwikkeling zullen bereikt hebben, zult U ze op lauwe broeilaag verplanten of zelfs onder een koud raam, dat U eenige dagen dicht en belommerd houdt om de wederaangroeiing te verzekeren.

ZAAIING OP WARM BROEIBED.

Om een warm broeibed (15° tot 18°) te bekomen, spreid op den grond een laag verschen paardenmest uit, met één derde droge bladeren gemengd, in Januari ter dikte van 70 cm.; in Februari, 60 cm.; en in Maart, 50 cm.

Leg op deze laag een planken ongeveer 30 cm. hoog raam, en laat de laag rondom 30 cm. uitkomen. Bedek het raam met een ruit. Een week later, als de broeilaag haar vuur gegeven heeft, vul het raam met lichte, goed vastgedrukte aarde tot 8 cm. van den rand. Als deze verwarmd is, zaai dun, uit volle hand, zorg dragende de zaden niet te diep te leggen. Den grond lichtjes vastdrukken, begieten en de ruiten met stroodekken bedekken. Leg van Januari tot Maart, rond den broeibak, een 30 cm. dikke mestlaag die U van tijd tot tijd mengelt en hernieuwt om de inwendige warmte te onderhouden. Neem, als de eerste scheutjes verschijnen, het stroodek weg over dag maar leg het 's nachts terug zoolang het koud blijft. Verlucht langzamerhand. Wanneer de planten eenige bladeren hebben, verpoot ze op lauwe broeilaag of wel onder een koud schutsel dat U eenige dagen gesloten en belommerd houdt om de herneming te verzekeren.

Een lauwe laag is een broeilaag, die minder dik is en meer bladeren bevat. De warmtegraad is er minder hoog (12° a 15°), maar bestendiger.

ZAAIING ONDER SCHUTSEL.

Dit is zaaien onder koud raam of onder een voldoende beschutting. Kies een plaats uit beveiligd tegen de noordenwinden. Vermeng de aarde met bladeren en allerlei afval. Begiet overvloedig, zoo mogelijk met aalt. Plaats op het aldus verbeterde gedeelte een raam met glasruiten, zooals er een vereischt wordt voor warme broeilaag. Vul het met teelaarde, zaai vervolgens en teel als op warme broeilaag. Verspeen onder koud raam of op beschut boordbed en plant eindelijk ter plaatse.

Zoo U geen raam hebt, bezaai dan begin April op beschut boordbed kleine gedeelten, die U met een grooten omgekeerden pot of liever met een glazen klok bedekt. Neem, als de scheuten verschijnen, over dag de klokken af maar zet ze terug voor den nacht zoolang vorst te vreezen is.

ZAAIING OP KREEKBED.

Dit is zaaien in vollen grond op een plekje, waar de planten voorloopig groeien, in afwachting van ter plaats geplant te worden. Daarvoor kiest men gewoonlijk een hoekje uit van den tuin, waar de grond, met teelaarde vermengd, de ontwikkeling der jonge plantjes bevordert. Zaai in den Zomer in halfommer en bedek met een goede laag stroomest.

ZAAIING TER PLAATSE.

Dit is zaaien op de plaats zelf, waar de planten hun leven zullen doorbrengen. Dun, na het opkomen, verscheidene malen uit.

A. Planten die in de Lente bloeien.**TWEEJARIGE PLANTEN: TE ZAAIEN IN:**

Mei-Juni, op kweekbed: muurbloemen, violier allionil, winterviolieren.
 Juli-Augustus, op kweekbed: bellis, myosotis alpestris en Victoria, silena, viola's.

DOORLEVENDE PLANTEN: TE ZAAIEN IN:

April, onder schutsel: Alyssum, aubriëtia.
 Juli, op kweekbed: primula veris en Japansche primula, viooltje.
 Juli-Augustus, op kweekbed: myosotis palustris, viola van Munby.

B. Planten die in 't begin v. d. Zomer bloeien.**TWEEJARIGE PLANTEN: TE ZAAIEN IN:**

April-Mei, op kweekbed: Agrostemma coronaria, campanula medium, digitalis, lunaria, trosanjeller.
 Juni-Juli, op kweekbed: althaea rosea.

DOORLEVENDE PLANTEN: TE ZAAIEN IN:

April-Mei, op kweekbed: aquilegia, heuchera, niet herbloeiende pluimanjeller.
 Juli-Augustus, op kweekbed: IJslandsche papaver.

C. Planten die in den Zomer bloeien.**1. Voor perken, boordbedden, snijbloemen.****EENJARIGE PLANTEN: TE ZAAIEN IN:**

Januari-Februari, onder glas: begonia semperflorens, tuinanjellieren.

Maart, onder glas: ageratum, antirrhinum, celosia cristata en plumosa, chrysanthemum coronarium en carinatum, cosmos, heliotropium, lobelia erinus, nicotiana, pentstemon, perilla, petunia, phlox Drummondii, salvia, statice, verbenas, zomer-violier.

einde Maart, onder schutsel: asters, balsamien, Chineesche anjellieren, coreopsis, dimorphotheca, helianthus, gaillardia, kochia, mimulus, nemesia, tagetes.

April, op kweekbed: chrysanthemum coronarium en carinatum, clarkia, gaura, godetia, scabiosa.

April-Mei, ter plaatse: adonis, agrostemma hemelroosje, asperula, calendula, campanula speculum, centaurea, chrysanthemum coronarium en carinatum, clarkia, convolvulus tricolor, coreopsis, delphinium der tuinen en der velden, dimorphotheca, dracocephalum, eschscholtzia, godetia, helichrysum, hesperis mahon, leptosiphon, linum, éénjarige lupinus, malope, mirabilis jalapa, nemophila, nigella, papaver somniferum en tulpvormige, portulaca, pronkerwt, salpiglossis, schizanthus, thlaspi, tropaeolum majus nanum. Eénjarige bloemzaden in mengsel. Japansche gazon.

TWEEJARIGE PLANTEN: TE ZAAIEN IN:

Mei-Juni, op kweekbed: anchusa italica, tuinanjellieren en herbloeiende pluimanjellieren.

Juni-Juli, op kweekbed: Althaea rosea.

DOORLEVENDE PLANTEN: TE ZAAIEN IN:

Maart-April, onder glas of onder schutsel: erigeron, doorlevende phlox, gnaphalium, herbloeiende rozelaar, tritoma, valeriana.

Maart-April, onder glas of onder schutsel: bloeien het eerste jaar: overblijvende aster, chrysanthemum (Indische en Japansche der bergen), overblijvende delphinium, lychnis chalcedonica.

April-Maart, op kweekbed: achillea, aconitum, campanula, Indische chrysanthemum, doorlevende gaillardia, hesperis matronalis, lobelia cardinalis, lychnis chalcedonica, doorlevende lupinus, Oostersche papaver, potentilla, doorlevende pronkerwt, rudbeckia, thalictrum, veronica.

September, onder schutsel: helleborus niger, valeriana.

KNOLGEWASSEN: TE ZAAIEN IN:

Januari-Februari, onder glas: knolbegonia.

Maart, onder glas: canna, dahlia.

2. Boordplanten.**EENJARIGE PLANTEN: TE ZAAIEN IN:**

Maart, onder glas: lage antirrhinum, zeeцинерaria.
 einde Maart, onder glas of onder schutsel: ageratum, lage asters, lage Phlox Drummondii, Tagetes Eerekruijs, lage Zinnia.

April, ter plaatse: alyssum maritimum, asperula calendula, leptosiphon, lage mirabilis jalapa, nemophila, nigella, phacelia, portulaca, lage pronkerwt.

April-Mei, op kweekbed: pyrethrum.

DOORLEVENDE PLANTEN: TE ZAAIEN IN:

Maart-April, op kweekbed: viooltje.

D. Planten met groote ontwikkeling.**EENJARIGE PLANTEN: TE ZAAIEN IN:**

Maart, onder glas: ricinus.

einde Maart, onder schutsel: amaranth (driekleurige en caudatus), kochia.

April-Mei, ter plaatse: zea.

DOORLEVENDE PLANTEN: TE ZAAIEN IN:

Februari-Maart, onder glas: gynerium (pampasgras).

KNOLGEWASSEN: TE ZAAIEN IN:

Januari, onder glas: musa.

Maart, onder glas: canna, dahlia's.

E. Klimplanten.**EENJARIGE PLANTEN: TE ZAAIEN IN:**

Februari-Maart, onder glas in potten: cobaea, mina. Maart, onder glas in potten: loasa, maurandia, thunbergia.

Maart-April, in potten of onder schutsel: Japansche hop, momordica.

April-Mei, ter plaatse: ipomaea, kolokwint, phaseolus, doorlevende pronkerwt, tropaeolum.

DOORLEVENDE PLANTEN: TE ZAAIEN IN:

April-Mei, op kweekbed: doorlevende pronkerwt.

F. Potplanten.**EENJARIGE PLANTEN: TE ZAAIEN IN:**

Januari-Februari, onder glas: begonia semperflorens.

Februari-Maart, onder glas: coleus, impatiens, mimosa pudica, torenia.

Maart, onder glas of onder schutsel: lage antirrhinum, asters, kochia, lobelia erinus, mimulus, schizanthus.

April, in potten: adonis, godetia, nemophila, lage tropaeolum.

Augustus-September, in potten: calendula, pronkerwt om te forceeren, reseda, schizanthus.

TWEEJARIGE PLANTEN: TE ZAAIEN IN:

Mei-Juni, op kweekbed: campanula medium, muurbloemen, winterviolieren.

Juli, onder belommerd schutsel: calceolaria, Chineesche primula's, hybridische cineraria's.

DOORLEVENDE PLANTEN: TE ZAAIEN IN:

Februari, onder glas: asparagus, chrysanthemum (Indische, Japansche en Japansche der bergen), geranium, heliotropium, herbloeiende rozelaar, streptocarpus.

April-Mei, in potten: companula, pyramidalis, linaria. Juli, onder belommerd schutsel: primula obconica en malacoides.

Augustus, in tellen: cyclamen.

September-October: helleborus niger.

KNOLGEWASSEN: TE ZAAIEN IN:

Januari-Februari, onder glas: gloxina, knolbegonia's.

G. Planten voor droge winterbloemtuilen.**EENJARIGE PLANTEN: TE ZAAIEN IN:**

April, ter plaatse: acroclinium, ammobium, gomphrena, sierlijke gypsophila, helichrysum, rhodanthe, siergrassen behalve gynerium en stipa, statice.

TWEEJARIGE PLANTEN: TE ZAAIEN IN:

April-Mei, op kweekbed: lunaria.

DOORLEVENDE PLANTEN: TE ZAAIEN IN:

Februari-Maart, onder glas: eryngium, gynerium, stipa.

April-Mei, op kweekbed: gypsophila paniculata.

H. Honiggevende planten voor bijen.**EENJARIGE PLANTEN: TE ZAAIEN IN:**

April, ter plaatse: asperula, dracocephalum, gemengde zaden van honiggevende planten.

TWEEJARIGE PLANTEN: TE ZAAIEN IN:

April-Mei, op kweekbed: anchusa italica.

BLOEMZADEN

De letters op het einde der regels verwijzen naar de overeenkomstige paragrafen van den zaakalender, blz. 29. Onze klanten zullen er het gebruik van elke plant, den datum en de wijze van zaailing, alsook den bloeitijd aangeduid vinden.

De afkortingen: 1j., 2j., xj., knolg., hierna gebruikt beteekenen onderscheidenlijk: éénjarig, tweejarig, doorlevend, knolgewas. De letter H duidt de hoogte aan.

		Zakje	2 gr.	10 gr.
786	<i>Achillea Ptarmica</i> The Pearl. xj. H. 0 ^m 30. Witte tuiltjes.	C	2 00	—
798	<i>Aconitum Napellus</i> . xj. H. 1 ^m 20. Lange donkerpaarsblauwe aren.	C	2 00	—
800	<i>Acroclinium</i> , rooskleurige dubbele. 1j. H. 0 ^m 35. Droge bloemen	G	1 50	2 50
804	<i>Adonis autumnalis</i> , Kooltjevuur. 1j. 0 ^m 50. Dikke roode bloemen.	CF	1 00	—
—	Afrikaan: zie <i>Tagetes</i>	—	—	—
806	<i>Ageratum</i> , Mexikaansche Swanley Blue. 1j. 0 ^m 60. Blauwe tuiltjes.	C	1 50	—
807	— Mexikaansche Imperial, lage, blauwe. 1j. H. 0 ^m 20. Boorden.	C	2 00	4 00
926	<i>Agrostemma</i> , Hemelroosje. 1j. H. 0 ^m 50. Mooi rose bloembossen.	C	1 20	—
927	— coronaria, gemengd. xj. H. 0 ^m 70. Talrijke lieve bloemen.	BC	1 00	—
—	Akelei: zie <i>Aquilegia</i>	—	—	—
1240	<i>Althaea rosea</i> Chater's, dubbele, prachtig mengsel. 2j. H. 2 m.	BC	3 50	—
812	<i>Alyssum maritimum</i> , Zilverkorfje. 1j. H. 0 ^m 25. Wit, geurig.	C	1 20	—
813	— saxatile, Goudkorfje, gedrongen. xj. H. 0 ^m 15. Goudgeel	A	2 00	—
816	<i>Amarantus tricolor splendens</i> . 1j. Bontbladig, sierplant	D	1 20	—
818	— caudatus, Kattestaart. 1j. H. 0 ^m 80. Overhangende aren.	D	1 20	—
828	<i>Ammobium</i> , gevleugelde. 1j. H. 0 ^m 50. Droge, witte bloemen.	G	1 00	—
974	<i>Anchusa Italica</i> , Ossetong. 2j. H. 1 ^m 50. Blauwbebloemde twijgen.	CH	2 50	—

ANJELIEREN (ANJERS) — DIANTHUS.**1. Chineesche Anjeliere — *Dianthus sinensis* (éénjarig).**

1081	Anjelier, Chineesche, dubbele, gemengd. 0 ^m 30. Getand, bontgevl.	C	1 20	3 00	12 00
1083	— Chineesche, enkele koninklijke, Heddewigii, gemengd. 0 ^m 30.	C	2 00	—	—
1096	— Chineesche, grootbl. dubbele Heddewigii. 0 ^m 30. Uitgetand.	C	2 50	7 50	—

2. Trosanjeliere of Duizendschoonen — *D. barbatus* (2j.).

1086	Trosanjelier, gemengd. H. 0 ^m 40. Enkele gevlekte bloemen.	B	1 00	—	5 40
1087	— dubbele, gemengd. H. 0 ^m 40. Dichte tuilen. Levendig gekleurd	B	1 50	3 00	12 00

3. Plum- of grasanjeliere — *Dianthus plumarius* (xj.).

1089	Pluimanjelier, dubbele, gemengd. 0 ^m 30. Gevlekt, geurig. Boorden.	B	3 00	9 00	36 00
1090	— Fransche, dubb. herbloeiende, grootbloemige, gemengd. 0 ^m 30.				
	Als tweejarige geteeld. Uitgetand. Levendige kleuren	B	4 00	—	—

4. Tuinanjeliere — *Dianthus caryophyllus* (1j. of 2j.).

1091	Tuinanjelier, dubbele, gemengd. H. 0 ^m 50. Geurig. Zeer gehard.	CF	3 00	—	—
1092	— dubbele, gemengd. Fantazie. 0 ^m 50. Gespikkeld, gemarmerd.	CF	3 00	—	—
1094	— Vlaamsche, extra. H. 0 ^m 50. Breede tweekleurige strepen.	CF	4 00	—	—
1096	— lage dubbele, gemengd, herbloeiende met ijzerstengel. 0 ^m 25.				
	Levendige kleuren. Stijve stengels. Mildbloeiend. Potplant.	CF	4 00	—	—
1098	Margariet, halfhooze dubbele herbloeiende, gemengd. 0 ^m 40.				
	Breed, met franje, éénkl. Bloeit 6 m. na zaailing. Gehard.	CF	3 00	7 50	28 00
1099	— Margariet, reuzige herbloeiende met Malmaison-bloem. 0 ^m 50.				
	Reuzige éénkleurige bloemen. Bloeit 6 m. na zaailing.	CF	3 00	7 50	30 00
1100	altijddurende reuzige dubbele (ras Chabaud), gemengd. 0 ^m 50.				
	Dikke geurige bloemen. Stijve stengels. Mildbloeiend	CF	5 00	12 00	—
1101	— altijddurende reuzige dubbele (ras Chabaud), witte. 0 ^m 50	CF	5 00	—	—
1102	— altijddurende reuzige dubbele (ras Guillaud), gemengd. 0 ^m 50.				
	Dikke, schoon getinte bloemen. Bloeit voortdurend.	CF	5 00	—	—
1103	— altijddurende grootbl. uit het Zuiden, Reus van Nizza. 0 ^m 50.				
	Anjelier die in den Winter uit het Zuiden komt (40 zaden).	CF	6 00	—	—
1062	<i>Antirrhinum</i> , Leeuwebek, grootbloem., schoon mengsel. 1j. 0 ^m 80.	C	1 50	5 00	20 00
1063	— grootbloemige zuiver witte. 1j. H. 0 ^m 80. Witte aren.	C	2 00	—	—
1064	— lage, Tom Thumb, schoon mengsel. 1j. 0 ^m 20. Schitterend.	CF	2 50	—	—
829	<i>Aquilegia vulgaris</i> , hybrid. dubbele, gemengd. xj. 0 ^m 90. Vele tinten.	B	1 20	—	—
830	— chrysantha, dubbele. xj. H. 1 ^m 20. Heldergele bloemen.	B	4 00	—	—

			Zakje	2 gr.	10 gr.
—	Aschkruid: zie Cineraria	—	—	—	—
831	Asparagus, lage vederachtige. xj. Schoone kamerplant (20 zaden)	F	2 50	—	—
832	— Sprengeri. xj. Overhangende kamerplant (20 zaden)	F	2 50	—	—
833	Asperula azurea setosa. 1j. H. 0 ^m 35. Lichtblauwe bloembossen.	CH	1 50	—	—
835	Aster, overblijvende, prachtkeur. xj. H. 0 ^m 80. Maluwkleurig.	C	2 00	9 00	—
1210	— halflage Komeet, prachtig mengsel. 1j. H. 0 ^m 35. Vroeg	CF	2 50	—	—
1211	— lage Chrysanthbloemige, gemengd. 1j. H. 0 ^m 25. Breed	CF	3 50	9 00	39 00
1212	— lage Nec plus ultra, gemengd. 1j. H. 0 ^m 25. Groote bloem.	CF	3 50	—	—
1213	— hooge spitszuilvormige dubbele, gemengd. 1j. H. 0 ^m 60.	CF	2 00	4 00	10 00
1214	— hooge spitszuilvormige dubbele, Pioen, Perfection. 1j. 0 ^m 60.	CF	3 50	—	—
1215	— hooge, Reuzenkomeet, gemengd. 1j. H. 0 ^m 25. Verward.	CF	2 50	—	—
1216	— hooge gekroonde met wit midden, gemengd. 1j. H. 0 ^m 60	CF	3 00	—	—
1219	— hooge, Mammoth, prachtig mengsel. 1j. H. 0 ^m 30. Reuzig.	CF	3 50	9 00	39 00
1221	— hooge, Struisveder, witte. 1j. H. 0 ^m 60. Bevallig	CF	3 00	9 00	36 00
1223	— hooge, Unicum, electrick, in mengsel. 0 ^m 60. Straalvormig.	CF	3 00	9 00	36 00
De lage Astervariëteiten zijn vooral geschikt voor korfjes, potten, enz. De hooge variëteiten, sieraad voor alle tuinen, vormen prachtige bloem- perken, tuilen, enz.					
837	Aubriëtia, purperkleurige. xj. 0 ^m 80. Dicht. Violette bl. Rotswerk.	A	3 00	—	—
845	Balsamien, dubbele, schoon mengsel. 1j. 0 ^m 50. Bebloemde stengel.	C	1 50	—	—
846	— Camellia, extra-dubbele, gemengd. H. 0 ^m 50. Reuzige bloem.	C	2 00	—	—
—	Balsemappel: zie Momordica balsamina	—	—	—	—
—	Banaanboom: zie Musa ensete	—	—	—	—
851	Begonia Vernon, altijdbloeiende, donkerpurpere. 1j. 0 ^m 40. Pur- perkl. bossen met roode bloemen bedekt. Lange bloeitijd.	CF	2 50	—	—
853	— gracilis, altijdbloeiende rose. 1j. H. 0 ^m 20. Roze perken.	CF	3 50	—	—
854	— gracilis, Luminosa altijdbloeiende scharlakenroode. 1j. 0 ^m 20. Bossen roode bloemen op donkergroen gebladerte	CF	4 00	—	—
856	— Knolbegonia, hybridische enkele, in schoon mengsel. Knolg. H. 0 ^m 40. Breede kleurige bloemen. Voor lommer.	CF	4 00	—	—
861	— Knolbegonia, hybr. dubb. in prachtig mengsel. Knolg. 0 ^m 40. Dubbele bloemen. Prachtig koloriet. Ook voor lommer.	CF	3 00	—	—
1105	Bellis perennis, grootbloemige dubbele, gemengd. xj. 0 ^m 15. Pompons	A	2 00	9 00	—
1106	— perennis, dubb. monsterachtige roode. xj. 0 ^m 15. Helderrood.	A	4 00	14 00	—
1107	— perennis, dubb. monsterachtige witte. xj. 0 ^m 15. Zuiver wit.	A	4 00	—	—
—	Bloemriet: zie Canna.	—	—	—	—
—	Boon, Spaansche of Sierboon: zie Phaseolus	—	—	—	—
875	Calceolaria hybrid. in sch. mengsel. 2j. H. 0 ^m 50. Vreemde bloem.	F	8 00	—	—



N° 1100. — Tuinanjelier ras Chabaud.

N° 1103. — Tuinanjelier Reus van Nizza

			Zakje	2 gr.	10 gr.
1280	<i>Calendula officinalis</i> , dubbele Prins van Oranje. 1j. H. 0 ^m 30. . . .	CF	1 20	—	—
879	<i>Campanula speculum</i> , Venusspiegel, enkele, gemengd. 1j. H. 0 ^m 30. . .	C	1 20	—	—
880	— <i>medium</i> , grootbloemige <i>Calycanthemum</i> , gemengd. 2j. 0 ^m 60 . . .	BF	2 00	—	—
882	— met perzikbladeren, gemengd. xj. H. 0 ^m 50. Bevallig.	C	2 50	—	—
885	— piramidevormige blauwe. xj. H. 1 ^m 50. Lange blauwe aren. . . .	CF	1 50	—	—
886	— piramidevormige witte. xj. H. 1 ^m 50. Lange witte aren. . . .	CF	2 00	—	—
887	<i>Canna</i> , Bloemriet, grootbloemige, ras Crozy, in mengsel. Knolg. H. 1 m. à 1 ^m 50. Pracht. planten met schitterende bloemen. . .	CD	3 50	—	—
820	<i>Celosia cristata</i> , Hanekam, gemengd. 1j. H. 0 ^m 50. Bonte kammen. .	C	2 50	—	—
821	— <i>cristata</i> , Hanekam, lage, monsterachtige. 1j. H. 0 ^m 25. . . .	C	3 50	—	—
900	— <i>plumosa</i> , Pluimhanekam, <i>Thompsonii magnifica</i> , gevar. 1j. H. 0 ^m 60. Prachtig mengsel. Schitterende pluimbossen. . .	C	2 00	—	—
901	<i>Centaurea cyanus</i> , dubbele Tuinkorenbloem, gemengd. 1j. H. 1 m. .	C	1 20	—	—
903	— <i>imperialis</i> , grootbloemige, gemengd. 1j. 0 ^m 60. Fijn koloriet .	C	1 50	—	—
—	<i>Cheiranthus</i> : zie <i>Violier</i>	—	—	—	—
905	<i>Chrysanthemum coronarium</i> , dubbele, gemengd. 1j. H. 0 ^m 70 . . .	C	1 20	—	—
906	— <i>carinatum</i> , hybrid. van Burridge. 1j. 0 ^m 60. Enkele bloem. . .	C	1 50	—	—
907	— Indische, dubbele vroege. xj. 0 ^m 70. Mooie kleine pompons. . .	CF	3 00	—	—
908	— Indische, hybrid. halfdubbele. xj. 0 ^m 70. Heldere kleuren. . .	CF	3 00	—	—
909	— Japansche grootbloemige. xj. Prachtige herfstpotplant . . .	F	4 00	—	—
910	— Japansche der bergen. xj. Talrijke mooie enkele bloemen. . .	CF	2 50	—	—
911	<i>Cineraria</i> , hybridische grootbloemige. 2j. 0 ^m 50. Pracht. potplant. .	F	5 00	—	—
912	— hybridische met dubbele bloem. 2j. 0 ^m 50. Dikke bloemen. . .	F	8 00	—	—
914	— hybridische rijkbloeiende, stervormige, prachtig mengsel. 2j. H. 0 ^m 80. Bevallige lichte bloemtuilen. Fijn koloriet. . . .	F	3 00	—	—
916	— zilverwitte, <i>Zeecineraria</i> . 1j. H. 0 ^m 60. Wit gebladerte. . . .	C	1 20	—	—
917	<i>Clarkia</i> sierlijke dubbele, gemengd. 1j. H. 0 ^m 40. Bebloemde twijgen. .	C	1 20	—	—
919	<i>Cobaea</i> , klimmende. 1j. Bereikt 8 m. Groote paarse bloemen. . .	E	3 00	—	—
922	<i>Coleus</i> in schoon mengsel. 1j. H. 0 ^m 50. Bontbladige sierpotplant .	F	3 00	—	—
923	— hybridische met reuzig blad, gemengd. 1j. Reuzige bladeren .	F	8 00	—	—
864	<i>Convolvulus tricolor</i> in mengsel. 1j. H. 0 ^m 35. Mildbloeiend. . . .	C	1 20	—	3 20
928	<i>Coreopsis</i> , hybridische, gemengd. 1j. H. 0 ^m 80. Gele margarieten. .	C	1 20	—	—
929	<i>Cosmos</i> , hybrid. grootbloemige, gemengd. 1j. H. 1 ^m 20. Margarieten .	C	1 20	—	—
932	<i>Cyclamen</i> , Perzische reuzige, schoon mengsel. xj. 0 ^m 20 (20 zaden). .	F	5 00	—	—
933	— Perzische reuzige grootbloemige franjevormige <i>Papilio</i> . xj. H. 0 ^m 20. Merkwaardige gegolfde bloemen (20 zaden)	F	8 00	—	—
—	Dagschoone: zie <i>Convolvulus tricolor</i>	—	—	—	—



N° 1223. — Aster Unicum.

N° 1219. — Aster Mammouth.

		Zakje	2 gr.	10 gr.
934	Dahlia, enkele lage gedrongen gevlekte, gemengd. Knolg. H. 0 ^m 60. CD	1 50	—	—
935	— enkele Stella (nieuw), gemengd. Knolg. H. 1 ^m 20. Sterbloem. CD	2 50	—	—
936	— halfdubbele reuzige, gemengd. Knolg. H. 1 ^m 50. Breede bloem. CD	3 50	—	—
937	— dubbele, gemengd. Knolg. H. 1 ^m 50. Vaste bolronde bloemen CD	5 00	—	—
938	— dubbele met Cactusbloem, gemengd. 1 ^m 50. Schoonste ras. CD	6 00	—	—
1170	Delphinium, dubbele lage der tuinen. 1j. H. 0 ^m 40. Dichte aren. C	1 50	—	—
1171	— hooge dubbele der tuinen. 1j. H. 1 m. Mooie lange aren. C	1 20	—	—
1173	— dubbele gevlekte driekl. der velden. 1j. H. 1 m. Lichte aren. C	2 00	—	—
1176	— doorlev. grootbloemige Chineesche. xj. H. 1 ^m 20. Prachtig. C	2 50	—	—
939	Digitalis, purperkleurige, Gloxiniafloem. 2j. 1 ^m 30. Schoone aren. B	1 50	—	—
941	Dimorphotheeca, hybridische. 1j. 0 ^m 25. Gaat toe vóór den regen. C	2 50	—	—
—	Distel: zie Eryngium	—	—	—
—	Drakenkopskruid: zie Dracocephalum	—	—	—
942	Dracocephalum, Moldavische. 1j. 0 ^m 60. Blauw of wit, geurig. CH	1 20	—	—
—	Duizendblad: zie Achillea Ptarmica	—	—	—
—	Duizendschoon: zie Trosanjelier	—	—	—
—	Eereprijs: zie Veronica	—	—	—
—	Edelweiss: zie Gnaphalium	—	—	—
943	Erigeron speciosus, hybridische. xj. 0 ^m 30. Lilakleur. margarieten. C	2 00	—	—
944	Eryngium, reuzige, blauwe Distel. xj. H. 0 ^m 60. Stekelige bloem. G	1 50	—	—
945	Eschscholtzia, Californische, gemengd. 1j. 0 ^m 50. Breede enkele bl. C	1 50	—	—
—	Fluweeltje: zie Tagetes	—	—	—
—	Fijnstraal: zie Erigeron	—	—	—
950	Gaillardia picta Lorenziana, dubbele, gemengd. 1j. 0 ^m 50. Kleurig. C	1 50	—	—
951	— doorlevende, grootbloem., schoon mengs. xj. 0 ^m 80. Prachtig. C	1 50	2 80	11 00
—	Ganzerik: zie Potentilla.	—	—	—
953	Gaura Lindheimeri. 1j. H. 1 ^m 20. Bevallige witbebloemde twijgen. C	1 50	—	—
—	Geranium: zie Pelargonium	—	—	—
—	Gipskruid: zie Gypsophila	—	—	—
979	Gloxinia, hybrid. grootbloemige. Knolg. 0 ^m 20. Prachtige potplant. F	6 00	—	—
980	Gnaphalium der Alpen, Edelweiss. 1j. H. 0 ^m 15. Wollige bloem. C	3 50	—	—
825	Gomphrena, amarantachtige. 1j. H. 0 ^m 30. Droge paarse bloem. G	1 20	—	—
982	Godetia Whitneyi, lage, Lady Albemarle. 1j. 0 ^m 35. Purperkleurig. CF	1 50	—	—
986	— halflage, schoon mengsel. 1j. 0 ^m 60. Bevallig. mildbloeiend. CF	1 50	—	—
—	Goudkorfje: zie Alyssum saxatile	—	—	—
—	Goudsbloem: zie Calendula	—	—	—
990	Gypsophila, sierlijke grootbloemige, zuiver wit. 1j. H. 0 ^m 50. Licht. G	1 00	—	3 00
991	— paniculata. xj. H. 1 m. Wonderlichte witte risten	1 50	—	9 00



N° 907. — Indische.

N° 909. — Japansche grootbloemige.
CHRYSANTHEMUM.

N° 910. — Japansche der bergen.

		Zakje	2 gr.	10 gr.
—	Haagbloem: zie <i>Nemophila insignis</i>	—	—	—
—	Hanekam: zie <i>Celosia cristata</i>	—	—	—
1276	<i>Helianthus cucumerifolius</i> , gedraaide bloemblad. 1j. 1 ^m 20. Geel. CH	1 50	—	—
1010	<i>Helichrysum bracteatum</i> , monsterachtige dubbele prachtig mengsel. 1j. H. 1 m. Stroobloem. Talrijke mooie kleuren. . . . CG	1 50	—	—
1013	— <i>bracteatum</i> , monsteracht. dubb. lage pracht. mengsel. 0 ^m 25 CG	2 00	—	—
1000	<i>Heliotropium</i> , schoon mengsel. xj., 1j. in vollen grond. H. 0 ^m 60. CF	2 50	—	—
1002	<i>Helleborus niger</i> , Kerstroos. xj. H. 0 ^m 30. Bloeit onder de sneeuw. CF	2 00	—	—
—	Hemelroosje: zie <i>Agrostemma</i>	—	—	—
1016	<i>Hesperis matronalis</i> , lage zuiver witte. xj. H. 0 ^m 50. Gr. risten. C	2 00	—	—
1017	— van Mahon, gevar. 1j. 0 ^m 25. Mooie bloembossen. Gehard. C	1 00	2 00	—
1004	<i>Heuchera</i> , bloedroode schitterende. xj. H. 0 ^m 35. Lichte trossen. B	3 50	—	—
1006	Hop, Japansche. 1j. Klimplant. Tot 5 m. hoog. Groeit snel. . . E	1 20	—	—
1007	— Japansche, bontbladige. 1j. Tot 5 m. hoog. Sierplant. . . E	1 50	—	—
—	IJskruid: zie <i>Mesembrianthemum crystallinum</i>	—	—	—
—	IJzerkruid: zie <i>Verbena</i>	—	—	—
1014	<i>Impatiens Sultani</i> , hybrid. 1j. 0 ^m 50. Kleurig. Prachtige potplant. F	5 00	—	—
1015	<i>Ipomaea volubilis</i> , Trechterwinde. 1j. Klimplant. H. 3 m. Bevall. E	1 20	—	3 50
—	Judaspenning: zie <i>Lunaria</i>	—	—	—
—	Juffertje in 't groen: zie <i>Nigella damascena</i>	—	—	—
—	Kapucijn: zie <i>Tropaeolum</i>	—	—	—
—	Kattestaart: zie <i>Amarantus caudatus</i> en <i>tricolor</i>	—	—	—
—	Kerstroos: zie <i>Helleborus niger</i>	—	—	—
—	Klaproos: zie <i>Papaver</i>	—	—	—
—	Klokjesbloem: zie <i>Campanula</i>	—	—	—
1018	<i>Kochia trichophylla</i> . 1j. H. 1 m. Lichte ovale struik. . . CDF	1 00	—	—
—	Koekoeksbloem: zie <i>Lychnis Chalcedonica</i>	—	—	—
925	Kolokwint in mengsel. 1j. Klimplant. H. 4 m. Siervruchten. . . E	1 20	—	—
—	Kooltjevuur: zie <i>Adonis autumnalis</i>	—	—	—
—	Korenbloem: zie <i>Centaurea</i>	—	—	—
—	Kruidje-roer-mij-niet: zie <i>Mimosa pudica</i>	—	—	—
—	Lathyrus: zie Pronkerwt	—	—	—
—	Leeuwebek: zie <i>Antirrhinum</i>	—	—	—
1020	<i>Leptosiphon</i> , hybrid., gemengd. 1j. H. 0 ^m 10. Talrijke kleurige bl. C	1 50	—	—
—	Limoenkruid: zie <i>Statice</i>	—	—	—
1023	<i>Linaria cymbalaria</i> . 1j. Kruipplant. Fijne mooie muurplant. . . F	2 00	—	—
1021	<i>Linum</i> , grootbloemige roode. 1j. 0 ^m 30. Talrijke vuurroode bloemen C	1 20	—	3 50
1024	<i>Loasa</i> , oranjekl. 1j. Klimpl. 2 m. Groeit snel. Merkwaardige bl. E	1 50	—	—
1025	<i>Lobelia erinus</i> , blauwe. 1j. H. 0 ^m 15. Mooie bloemige boorden. CF	1 50	4 00	—
1026	— <i>erinus</i> , blauwe Crystal Palace. 1j. 0 ^m 15. Roodbruine blad. CF	2 00	9 00	—
1027	— <i>erinus</i> , blauwe lage, gedrongen met wit oog. 1j. H. 0 ^m 15. CF	2 50	—	—
1029	— <i>cardinalis</i> Queen Victoria. xj. H. 0 ^m 80. Prachtplant met roodbruin gebladerte. Vuurroode bloemaren . . . C	5 00	—	—
1033	<i>Lunaria</i> , tweejarige, Judaspenning. H. 0 ^m 80. Droge tuilen. . . BG	2 00	—	—



N° 932. — Perzische Cyclamen.

N° 911. — Grootbloemige Cineraria.

			Zakje	2 gr.	10 gr.
1035	Lupinus, éénjarige in schoon mengsel. H. 0 ^m 80. Mooie veelkl. aren.	C	1 20	—	4 60
1037	— doorlevende polyphyllus gemengd H. 1 ^m 20. Prachtige aren	C	1 50	—	—
1040	Lychnis Chalcedonica (Koekoeksbloem), roode. xj. H. 0 ^m 90	C	1 50	—	—
—	Lijmkruid: zie Silene pendula	—	—	—	—
—	Madeliefje: zie Bellis	—	—	—	—
—	Mais, Japansche: zie Zea	—	—	—	—
1046	Malope, grootbloemige, gemengd. 1j. 1 m. Breede purperkl. bloem.	C	1 20	—	—
1047	Maurandia in schoon mengsel. 1j. Klimpl. 4 m. Paarse bloemen.	E	2 50	—	—
—	Maskerbloem: zie Mimulus	—	—	—	—
—	Mesembrianthemum crystallinum, IJskruid: zie nr 286, blz. 13.	C	—	—	—
1264	Mimosa pudica. 1j. H. 0 ^m 40. Slaat samen bij aanraking.	F	1 50	—	—
1054	Mimulus, koperkleurig hybrid. grootbloem., gemengd. 1j. H. 0 ^m 25.	CF	4 00	—	—
1056	Mina lobata. 1j. Klimpl. 5 m. Welig. Bevallige oranjekl. aren.	E	4 00	—	—
869	Mirabilis Jalapa, gemengd. 1j. H. 0 ^m 80. Geurig. Bloeit 's nachts.	C	1 50	—	—
870	— Jalapa, lage bontbladige, gemengd. 1j. H. 0 ^m 35. Sierplant	C	2 00	—	—
1057	Momordica balsamina, Wonderappel. 1j. Klimplant. H. 2 m.	E	2 50	—	—
—	Monnikskap: zie Aconitum	—	—	—	—
1067	Musa ensete, Banaanboom. Knolg. 1 ^m 50. Reuzig blad (10 zaden).	D	3 00	—	—
—	Muurleeuwenbek: zie Linaria	—	—	—	—
1070	Myosotis alpestris, blauwe. 2j. H. 0 ^m 30. Bevallige lentebloemen.	A	1 20	2 80	11 00
1071	— alpestris, witte. 2j. H. 0 ^m 30. Witte bloemen.	A	2 00	—	—
1072	— alpestris, rose. 2j. H. 0 ^m 30. Rose bloemen.	A	2 00	—	—
1073	— Victoria, gedrongen, blauwe. 2j. H. 0 ^m 20. Zeer dichte bosjes.	A	3 00	—	—
1074	— palustris, Echte Vergeet-mij-niet. xj. 0 ^m 25. Breede bloemen.	A	2 50	—	—
—	Nachtschoone: zie Mirabilis jalapa	—	—	—	—
—	Nachtviolier: zie Hesperis matronalis	—	—	—	—
1076	Nemesia strumosa, grootbloem. lage gedrongen. 1j. H. 0 ^m 20. Schitt.	C	2 00	—	—
1078	Nemophila insignis, blauwe. 1j. H. 0 ^m 20. Breede hemelblauwe bl.	CF	1 50	—	—
1285	Nicotiana affinis, witte welriekende grootbloemige. 1j. H. 0 ^m 75.	C	1 20	—	—
1286	— affinis, hybridische grootbloemige veelkleurige. 1j. H. 0 ^m 75.	C	1 50	—	—
1079	Nigella damascena, dubb. lage. 1j. H. 0 ^m 30. Blauwe bl. Licht gebl.	CH	1 20	—	—
—	Oost-Indische Kers: zie Tropaeolum	—	—	—	—
—	Ossetong: zie Anchusa italica	—	—	—	—
—	Paaschbloempje: zie Bellis	—	—	—	—
—	Pantoffeltje: zie Calceolaria	—	—	—	—
1110	Papaver somniferum, dubb. franjev., gemengd. 1j. 1 m. Volle bl.	C	1 00	—	3 50
1111	— glaucum. 1j. H. 0 ^m 50. Schoone tulpvormige roode bloem.	C	1 50	—	—
1112	— IJlandsche grootbloemige, gevar. xj. 0 ^m 30. Levendige kl.	B	2 00	—	—
1113	— Oostersche hybr. grootbloem. donkerroode. xj. 1 ^m 20. Reuzig.	C	2 50	—	—
—	Paterskap: zie Aconitum	—	—	—	—
954	Pelargonium zonale en inquinans, in schoon mengsel. xj.	C	4 00	—	—
1134	Pentstemon, hybrid. grootbloemige, gemengd. 1j. 0 ^m 60. Roode aren	C	2 50	12 00	—
—	Pensee: zie Viola	—	—	—	—
1135	Perilla van Nanking. 1j. H. 0 ^m 70. Donkerpurperkl. sierbladeren.	C	1 20	—	—
1140	Petunia, hybrid. in schoon mengsel. 1j. H. 0 ^m 50. Talrijke tinten.	C	1 50	3 50	14 00
1141	— hybrid. grootbloemige prachtkeur. 1j. 0 ^m 40. Breede bloemen	C	6 00	—	—
1142	— hybrid. grootbl., franjevormige, gemengd. 1j. 0 ^m 40. Geplooid.	C	5 00	—	—
1144	— hybrid. grootbloemige dubbele franjevormige, gemengd. 1j. 0 ^m 40. Reuzige, dubbele, gegolfde, fijn uitgetande bloem.	CF	8 00	—	—
1155	Phacelia, klokbloemachtige. 1j. H. 0 ^m 15. Talrijke blauwe klokjes.	CH	1 50	—	—
995	Phaseolus multiflorus, gemengd. 1j. Klimpl. Mildbloeiend (20 gr.)	E	1 50	—	—
1160	Phlox Drummondii, schoon mengsel. 1j. 0 ^m 40. Veelkleurige tuilen.	C	1 20	3 00	12 00
1161	— Drummondii, grootbloem. extra keur. H. 0 ^m 40. Breede tuilen.	C	1 50	3 50	—
1165	— Drummondii, lage, gedrongen, sch. mengsel. 1j. 0 ^m 20. Dicht.	C	3 00	—	—
1168	— doorlevende hybrid. schoon mengsel. xj. H. 1 m. Prachtig.	C	4 00	—	—
—	Pluimhanekam: zie Celosia plumosa.	—	—	—	—
1188	Portulaca, grootbl., gemengd. 1j. 0 ^m 20. Schitt. tapijt in volle zon.	C	1 20	2 50	10 00
1190	— grootbloemige, dubbele, prachtig mengsel. 1j. H. 0 ^m 20.	C	2 50	—	—
1187	Potentilla, hybrid. grootbl. dubbele, gemengd. xj. 0 ^m 60. Koperkl.	C	2 50	—	—

			Zakje	2 gr.	10 gr.
1195	<i>Primula veris</i> , extra keur. xj. H. 0 ^m 20. Mooie tuilen. Gehard . . .	A	4 00	—	—
1196	— <i>acaulis</i> , hybridische grootbloemige. xj. 0 ^m 10. Nieuwe tinten.	A	6 00	—	—
1197	— <i>Japansche</i> , gemengd. H. 0 ^m 60. Bebloemde stengels. . . .	A	2 50	—	—
1198	— <i>Chineesche</i> , franjevormige, eerste keur. 2j. 0 ^m 25 (25 zaden).	F	3 50	—	—
1199	— <i>Chineesche</i> , dubb. franjev. eerste keur. 2j. 0 ^m 25 (20 zaden).	F	8 00	—	—
1204	— <i>obconica</i> , reuzige, prachtig mengsel. xj. H. 0 ^m 30. Lichter.	F	5 00	—	—
1205	— <i>malacoides</i> . xj. H. 0 ^m 35. Zeer lichte tuilen. Lilakleurig . .	F	2 50	—	—
De broeikas- en kamerprimula's (1198 tot 1205) zijn de hoogst geschatte als sierplanten voor den Winter. Zij zijn gemakkelijk te kweken en vergen weinig zorgen.					
1180	<i>Pronkerwt</i> , prachtig mengsel. 1j. Klimplant. 1 ^m 50. Oude typen.	CE	1 00	—	3 00
1181	— om te forceeren, gemengd. 1j. Bl. binnenshuis met Kerstmis.	F	2 50	—	6 50
1182	— <i>Spencer</i> , met reuzige gegolfde bloem, prachtig mengsel. 1j. Klimplant. H. 1 ^m 50. Prachtige tinten. Reuzig.	CE	2 00	—	4 00
—	— <i>Spencer</i> , met reuzige gegolfde bloem, afzonderlijke variëteiten. Nieuwigheden voor 1932 en verzameling van schoone variëteiten, zie bladz. 39.		—	—	—
De pronkerwten zijn gemakkelijk te kweken en zijn vooral nuttig als sierplanten voor balkons, tuinen, enz. Met ons mengsel van het Spencer-ras zal men schoone, groote gegolfde bloemen bekomen, waarlijk zonder weerga wat rijkdom van kleuren betreft. Zie blz. 39, onze verzameling pronkerwten in afzonderlijke variëteiten.					
1183	<i>Pronkerwt</i> , lage Cupidon, gemengd. 1j. H. 0 ^m 20. Mildbloeiend . . .	C	2 00	—	6 00
1184	— doorlevende, gemengd. Klimplant. 1 ^m 50. Purperkleur. tuilen.	CE	3 00	—	14 00
1207	<i>Pyrethrum parthenium</i> , goudgele lage. 1j. H. 0 ^m 20. Mooie boorden.	C	1 20	3 00	12 00
1208	— <i>parthenium</i> , goudgele met uitgetande bladeren <i>Perfection</i> .	C	3 00	—	—
1225	<i>Reseda</i> , welriekende, grootbloem. 1j. H. 0 ^m 30. Blondgroene aren.	FH	1 50	—	5 40
1226	— <i>Victoria</i> , grootbloem. glanzendroode. 1j. 0 ^m 30. Schitterend.	FH	2 00	—	—
1227	— <i>Goliath</i> , grootbloem. koperkleurig roode. 1j. H. 0 ^m 30. Reuzig.	FH	3 00	—	—
1228	— <i>Gabriele Imperial</i> . 1j. H. 0 ^m 30. Zeer dichte roode aar. . .	FH	2 00	—	—
1229	— <i>Machet</i> , verbeterde. 1j. Piramidevormig. Dikke roode aar.	FH	2 00	—	—
1233	<i>Rhodanthe Manglesii</i> , dubbele. 1j. H. 0 ^m 30. Rose, droge bloem. .	CG	1 20	—	—
1235	<i>Ricinus</i> , bloedroode. 1j. 2 m. Reuzige plant. Bloedroode bladeren.	D	2 00	—	—
1236	— van Zanzibar, gemengd. 1j. 3 m. Reuzige gevlekte bladeren.	D	2 00	—	—
—	Ridderspoor: zie <i>Delphinium</i>	—	—	—	—
1242	Rozelaar, lage herbloeiende rijkbl., gemengd. xj. 0 ^m 40. Potplant.	CF	3 50	—	—
1244	<i>Rudbeckia</i> , purperkl. grootbloemige. xj. 1 m. Roode margariet. .	C	3 00	—	—
1245	— <i>speciosa</i> . xj. H. 0 ^m 40. Gele margariet met zwart midden. .	C	3 00	—	—
—	Ruwkruid: zie <i>Asperula</i>	—	—	—	—
—	Salie: zie <i>Salvia</i>	—	—	—	—
1246	<i>Salpiglossis</i> , grootbloemige, sch. mengsel. 1j. 0 ^m 70. Trompetvormig.	C	2 00	—	—
1247	<i>Salvia splendens</i> , Salie. 1j. H. 0 ^m 50. Prachtige vuurroode aren. .	C	2 50	7 50	—
1249	<i>Scabiosa</i> , lage dubbele, gemengd. 1j. H. 0 ^m 35. Pompons	CH	1 50	—	—
—	Scheefbloem: zie <i>Thlaspi</i>	—	—	—	—
—	Schildzaad: zie <i>Alyssum</i>	—	—	—	—
1254	<i>Schizanthus</i> , schoon mengsel. 1j. H. 0 ^m 70. Struik met lichte bl.	CF	1 20	—	—
1273	<i>Silene pendula</i> , lage, gedrongen, roode. 1j. H. 0 ^m 10. Bloembossen.	A	2 00	—	6 50
—	Schoone-bij-dage: zie <i>Convolvulus tricolor</i>	—	—	—	—
—	Schurftkruid: zie <i>Scabiosa</i>	—	—	—	—
—	Slaapbol: zie <i>Papaver somniferum</i>	—	—	—	—
—	Slaapmutsje: zie <i>Eschscholtzia</i>	—	—	—	—
—	Sleutelbloem: zie <i>Primula</i>	—	—	—	—
—	Springzaad: zie <i>Impatiens</i>	—	—	—	—
1281	<i>Statice</i> , éénjarige, sch. mengsel. 1j. 0 ^m 50. Sierkruid voor ruikers.	CG	1 20	—	—
—	Stokroos: zie <i>Althaea</i>	—	—	—	—
1283	<i>Streptocarpus kewensis</i> , hybrid. grootbl., gemengd. xj. 0 ^m 20. Potpl.	F	5 00	—	—
—	Stroobloem: zie <i>Acroclinium</i> , <i>Ammobium</i> , <i>Gomphrena</i> , <i>Helichrysum</i> , <i>Rhodanthe</i>	—	—	—	—
—	Tabak (siertabak): zie <i>Nicotiana</i>	—	—	—	—
1287	<i>Tagetes patula</i> , hooge dubb., Afrikaan of Fluweelbloem, gemengd. 1j. H. 0 ^m 60. Bevall. oranje- en goudkeverkleurige pompons.	C	1 50	—	—
1288	— <i>patula</i> , lage, Eerekruis. 1j. H. 0 ^m 25. Mooi gevlekte bloem. .	C	2 00	—	—
1289	— <i>erecta</i> , dubbele, gemengd. 1j. 1 m. Dikke gele pompons . .	C	1 50	—	—
1290	— <i>signata pumila</i> , lage, 1j. H. 0 ^m 25. Oranjekleurige bossen.	C	2 00	—	—

		Zakje	2 gr.	10 gr.
—	Taschkruid: zie <i>Thlaspi</i> .	—	—	—
1291	<i>Thalictrum dipterocarpum</i> . xj. 1 m. Bevallige lilakleurige risten.	C 3 00	—	—
1292	<i>Thlaspi</i> , witte. 1j. H. 0 ^m 25. Witte dichte geurige bloembossen.	C 1 20	—	—
1295	<i>Thunbergia</i> , gevleugelde, gemengd. 1j. Klimpl. 1 ^m 50. Gele bloem.	E 2 50	—	—
1296	<i>Torenia Fournieri</i> . 1j. H. 0 ^m 20. Potplant met blauwe, schoone bl.	F 1 50	—	—
—	Trechterwinde: zie <i>Hesperis matronalis</i> en <i>Ipomaea</i> .	—	—	—
1297	<i>Tritoma uvaria</i> , grootbloem. xj. H. 1 ^m 20. Lange oranjekl. aren.	C 2 50	—	—
—	Trompettong: zie <i>Salpiglossis</i> .	—	—	—
889	<i>Tropaeolum majus</i> , lage, Tom Thumb, gemengd. 1j. 0 ^m 35. Mildbl.	CF 1 50	—	3 20
892	— majus, lage, Empress of India. 1j. 0 ^m 35. Vuurroode bloem.	CF 2 00	—	5 00
894	— majus, hooge, gemengd. 1j. Klimpl. Tot 2 m. h. Kleurige bl.	E 1 20	—	3 00
895	— Canariense. 1j. Tot 3 m. hoog. Kleine, gele, mooie bloem.	E 2 00	—	—
896	— hybrid. Lobbianum, gemengd. 1j. Tot 5 m. h. Mildbloeiend.	E 1 20	—	3 50
—	Tuinbalsem: zie <i>Ageratum</i> .	—	—	—
1300	<i>Valeriana</i> , gemengd. xj. H. 1 m. Roode of rose tuilen.	C 1 50	—	—
—	Venusspiegel: zie <i>Campanula speculum</i> .	—	—	—
1308	<i>Verbena crinoides</i> , violetkleurige. 1j. 0 ^m 40. Talrijke mooie tuilen.	CF 2 00	—	—
1310	— hybrid. grootbloem. extra keur. 1j. H. 0 ^m 40. Mooie tinten.	CF 2 50	6 00	—
1312	— venosa. 1j. 0 ^m 35. Talr. paarse tuilen. Voor drogen grond.	CF 2 00	—	—
—	Vergeet-mij-niet: zie <i>Myosotis</i> .	—	—	—
1305	<i>Veronica</i> , doorlevende, schoon mengsel. 1 ^m 20. Lange, blauwe aren.	C 2 00	—	—
—	Vingerhoedskruid: zie <i>Digitalis</i> .	—	—	—
1114	<i>Viola cornuta</i> , grootbloem. blauwe, Admiration. 2j. 0 ^m 20. Mildbl.	A 3 00	9 00	38 00
1115	— cornuta, Parijsche, violetkl. 2j. H. 0 ^m 15. Mooie bloempjes.	A 3 00	9 00	38 00
1116	— lutea, grootbloemige gele. 2j. H. 0 ^m 20. Eénkleurig, bevallig.	A 3 00	9 00	38 00
1117	— van Munby. xj. H. 0 ^m 15. Talrijke blauwe bl. met wit oog.	A 3 50	—	—
1118	— grootbloem. Candidissima, Sneeuwconingin, zuiver wit. 2j.	A 3 00	—	—
1119	— grootbloemige Faust. 2j. 0 ^m 20. Zwarte, zonderlinge bloem.	A 3 00	—	—
1120	— grootbloemige zuiver gele. 2j. H. 0 ^m 20. Schoone kleur.	A 3 00	9 00	38 00
1122	— grootbloemige lila-rose, Mauve Queen. 2j. H. 0 ^m 20.	A 3 00	—	—
1123	— grootbloemige Kardinaal. 2j. H. 0 ^m 20. Glanzend rood.	A 4 00	12 00	—
1125	— grootbloemige helderblauw. 2j. H. 0 ^m 20. Teere tint.	A 3 00	9 00	38 00
1126	— grootbloemige, Lord Beaconsfield, half-rouw. Paars en wit.	A 3 00	—	—
1128	— grootbloemige, gemengd. Engelsche pensee, 2j. H. 0 ^m 20.	A 1 50	6 00	—
1129	— grootbloemige gestreepte en gemarmerde. 2j. H. 0 ^m 20. Mooi.	A 3 00	—	—
1131	— grootbloemige, Trimardeau, met groote vlekken, gemengd.	A 4 00	—	—
1132	— grootbloemige, Bugnot, gemengd. 2j. H. 0 ^m 20. Koperkleurig.	A 5 00	17 00	—
1133	— grootbloemige Parijsche, 1 ^{ste} klas mengsel. 2j. H. 0 ^m 20.	A 5 00	17 00	68 00
1315	— odorata, Violtje der vier jaargetijden. xj. H. 0 ^m 10. Geurig.	AC 3 50	—	—

N^o 1133. — Grootbloemige Parijsche Viola.

VIOLIEREN — CHEIRANTHUS.

1. Zomer- of Zes weken Violieren — *Cheiranthus annuus* (1j.).

Behalve n° 960 stammen de volgende zomerviolieren van potplanten af:

			Zakje	2 gr.	10 gr.
960	Zomerviolier, schoon mengsel. H. 0 ^m 30. Voor vollen grond. . .	C	2 00	7 50	—
961	— grootbloemige dubbele, prachtig mengsel. 0 ^m 40. Extra keur. C	3 00	11 00	—	—
962	— Victoria, donkere bloedroode. H. 0 ^m 35. Dubbel, prachtig. C	3 00	—	—	—
963	— Victoria, zuiver witte. H. 0 ^m 35. Dubbel, hooggeschat. . .	C	3 50	—	—
965	— reuzige, Perfection. H. 0 ^m 50. Zeer mooie. Nieuwe tinten. .	C	3 50	—	—
966	— herbloeiende grootbloemige dubbele. H. 0 ^m 60. Snijbloem. .	C	3 00	—	—
967	— herbloeiende reuzige, Excelsior, witte. H. 0 ^m 60. Prachtig. .	C	5 00	—	—

2. Winterviolieren — *Cheiranthus* (tweejarig).

970	Winterviolier, grootbloemige, gemengd. H. 0 ^m 50. Lentebloemen .	AF	4 00	—	—
971	— vroege van Nizza. 0 ^m 50. Potten en bloemperken in April. AF	4 00	—	—	—

3. Gele Muurbloemen — *Cheiranthus Cheiri* (tweej.).

975	Muurbloem, gele, gemengd. 0 ^m 70. Welriekende lentebloemen . .	AF	1 50	—	9 00
977	— gele dubbele, gemengd. H. 0 ^m 50. Dikkere bloemen. Mooie kl. AF	4 00	—	—	—

4. Hybridische Violieren — *Cheiranthus hybridus* (tweej.).

978	Violier, hybridische Allionii, oranjekleurig. H. 0 ^m 40. Schitterend. A	1 50	3 00	—	—
—	Vlambloem: zie Phlox	—	—	—	—
—	Vlaskruid: zie Linaria	—	—	—	—
—	Vlasplant: zie Linum	—	—	—	—
—	Vuurpijl: zie Tritoma.	—	—	—	—
—	Wonderbloem: zie Mirabilis jalapa	—	—	—	—
—	Wonderboom: zie Ricinus	—	—	—	—
—	Zandbloem: zie ammobium alatum	—	—	—	—
1045	Zea, Japansche, met bontgestreepte blad. 1j. H. 1 m. Lintvormig D	1 50	—	—	—
1320	Zinnia elegans, dubbele extra, gemengd. 1j. 0 ^m 70. Breede pompons C	1 50	—	7 50	—
1321	— elegans, dubbele lage, gemengd. 1j. 0 ^m 30. Meer dichtgroeïend C	2 00	—	9 00	—
1322	— elegans, dubbele gestreepte, gemengd. 1j. 0 ^m 70. Gevlekt . . C	2 00	—	9 00	—
1323	— elegans, dubbele, reuzige, gemengd. 1j. H. 0 ^m 70. Breed . . C	3 00	—	20 00	—
1325	— Mexikaansche, dubbele, gemengd. 1j. 0 ^m 40. Oranjekleurig C	3 00	—	—	—
—	Zilverkorfje: zie Alyssum maritimum.	—	—	—	—
—	Zomer-Cupressus: zie Kochia trichophylla.	—	—	—	—
—	Zonnebloem: zie Helianthus	—	—	—	—
1330	Zaden van éénjarige bloemen in schoon mengsel	C	1 20	—	5 40
1331	— van honiggevende planten. Schoon mengsel voor bijen. . H	1 20	—	5 40	—
1332	Japansch gazon. Mengsel éénjarige bloem en lage grasplanten . .	C	1 50	—	6 50

SIERGRASSEN.

De siergrassen vormen schoone droge tuilen, die zeer nuttig zijn voor het opsmukken van kamers gedurende den Winter. Deze ruikers kunnen of wel bestaan enkel uit grasplanten, of wel gemaakt zijn met stroobloemen, rhodantes, statioes, lampionplanten, enz. Men snijdt de pas ontloken bloemen af en laat ze drogen boven de nog gloeiende assche van droog hout in open licht verbrand.

1335	Agrostis nebulosa, Struisgras. 1j. H. 0 ^m 35. Uiterst licht	G	1 50	—	—
1340	Briza maxima, Trilgras, grootbloemig. 1j. H. 0 ^m 40. Bevertjes. . .	G	1 20	—	—
1342	Coix Lacryma, Jobstranen. 1j. H. 0 ^m 90. Parelvormige vruchten. G	1 00	—	—	—
1345	Gynerium argenteum, Pampasgras, x.j. 2 m. Zilverkl. pluimbossen. DG	1 50	—	—	—
1346	Hordeum Jubatum. Gerst met kwispelvorm. aar. 1j. 0 ^m 60. Sierpl. G	2 00	—	—	—
1347	Lagurus ovatus, Hazestaart. 1j. H. 0 ^m 40. Eivormig, wollig bloeisel. G	1 50	—	—	—
1351	Pennisetum Ruppellianum. 1j. 1 m. Bevallige violetkleurige aren. G	2 50	—	—	—
1355	Stipa pennata, Vedergras. xj. 0 ^m 50. Dunne zilverkleurige aren. G	4 00	—	—	—

REUKERWTEN IN AFZONDERLIJKE VARIËTEITEN.


Voor reukerwteliefhebbers hebben wij eenige schoone nieuwigheden gekozen onder de merkwaardigste van het jaar. Vervolgens hebben wij een ideale lijst van reukerwten opgemaakt met in elke kleurschakeering de variëteit uit te kiezen, die door de « National Sweet Pea Society » als de beste aanzien wordt. Deze verzameling vereenigt de 30 voornaamste kleurschakeeringen, elk door haar volmaakste specimen vertegenwoordigt.

NIEUWIGHEDEN VOOR 1932.

1490	Ambition , schoon diep lavendelblauw, donkerder bij de basis	9 00
1491	Amy Johnson , vaalrose met zalmkleurige schaduwen	9 00
1492	Derby Day , glanzend en fluweelachtig, rijk karmozijnrood	9 00
1493	Kathleen Wiltshire , licht lavendelblauw met satijnachtigen weerschijs	13 50
1494	Mayfair , witte grond met rijke zalmkleurig rose tinten	9 00
1495	Patriot , roomkleurig met lichte zuiver rose tinten	9 00

VERZAMELING VAN SCHOONE VARIËTEITEN.

1525	De 30 volgende variëteiten, keur van schitterende tinten. De verzameling	fr.	88 00
1527	Amethyst (1931) , licht amethistkleurig blauw. Zeer breed	Zakje	5 00
1528	Ascot (1929) , schoon lichtrose		2 50
1529	Avalanche , sneeuw wit		2 50
1532	Beatall (1930) , lichtjes zalmkleurig glanzend rose		2 50
1534	Beauty (1931) , blozend rose		4 00
1540	Captain Blood (1931) , lichtjes koperkleurig bloedrood		5 00
1544	Chieftain , zuiver maluwkleurig		2 50
1550	Damask Rose (1931) , zuiver rose met karmijnrooden weerschijs		5 00
1556	Flaming June (1929) , bleek scharlaken		2 50
1557	Flamingo (1929) , geraniumrood		2 50
1560	Fortune , diep donkerblauw		2 50
1572	Huntsman (1928) , scharlaken		2 50
1576	International (1929) , rozig paars		3 00
1578	Ivory Picture , heerlijk ivoorkl.		2 50
1581	Jack Hobbs (1928) , roomkleurig met glanzend rose gemarmerd		2 50
1582	Laddie (1931) , roomkleurig met abrikooskleurige schaduwen	Zakje	5 00
1584	Lilac Queen , rozig lila		5 00
1586	Mammoth , oranjeleurig scharlaken		2 50
1589	Mrs A. Searles (1928) , morgenroodkleurig getint kersrood		2 50
1595	Olympia (1928) , zuiver purperkleurig		3 00
1597	Orange Picture , zuiver oranjeleurig		3 00
1600	Pinkie (1928) , zuiver rose		2 50
1601	Porcelain , bleek lavendelkleurig		3 00
1602	Powerscourt , zuiver lavendelkleurig		2 50
1607	Royal Pink , oranjeleurig rose		2 50
1618	Splendour , bleek kastanjerood		2 50
1623	Sybil Henshaw , karmozijnrood		3 00
1631	The Sultan , kastanjezwart		3 00
1644	What Joy , allerliefst roomkleurig		2 50
1646	Youth , wit met rose rand		2 50



Pronkerwtten van onze verzameling.

VERZAMELINGEN VAN BLOEMZADEN.

Deze verzamelingen bieden, voor elke bloem, 4, 8 of 12 heel verschillende en zeer schitterende tinten. Zij zullen toelaten mooie tegenstellingen te scheppen en schoone effecten te bekomen met de verschillende kleuren-gamma's.

	4 var.	8 var.	12 var.
1700 Antirrhinum, grootbloemige	4 00	7 00	10 00
1730 Aster, Pioenbloemig Perfection	6 00	11 00	16 00
1735 — dwerg-Chrysanthemum	6 00	11 00	16 00
1695 Helichrysum, dubbele, monsterachtige	4 00	7 00	—
1705 Papaver, der tuinen, dubbele (Tuinslaapbol)	4 00	7 00	—
1677 Tropaeolum majus (Groote Kapucijn)	4 00	7 00	10 00
1679 — majus nanum (Lage Kapucijn)	4 00	7 00	10 00
1704 Tuinanjelier, altijdddurende dubbele (ras Guillaud)	6 00	11 00	—
1709 Viola, Engelsche (Pensee)	5 00	9 00	13 00
1745 Zinnia, dubbele, sierlijke	5 00	9 00	13 00
1685 Zomerviolier, grootbloemige	8 00	15 00	22 00

SORTEERINGEN VAN EENJARIGE BLOEMZADEN.

Ziehier drie sorteeringen, die de voornaamste soorten bevatten, die men kan zaaien, naarmate men over weinig of veel plaats beschikt. Al deze soorten, onder de meest bloemdragende en meest geharde gekozen, zullen uw bloemperken versieren en U een overvloed van schitterende bloemen verschaffen.

Deze sorteeringen, van te voren ingepakt, zijn onverdeelbaar, en wij zullen er geen verandering kunnen aanbrengen. Natuurlijk kunt U er andere artikelen uit den catalogus laten bijvoegen.

1750 Voor kleinen tuin: 14 soorten en variëteiten fr. 27 00

BLOEMPERKEN	SNIJBLOEMEN	DROGE TULEN
1081 Anjelier, Chineesche.	1085 Anjelier Heddeewigii.	1171 Delphinium, éénj.
1064 Antirrhinum, lage.	1062 Antirrhinum, hooge.	1225 Reseda.
1165 Phlox Drummondii.	1219 Aster, Chineesche.	1320 Zinnia.
1288 Tagetes Eerekruis.	906 Chrysanthem. carin.	961 Zomerviolier.
		1010 Helichrysum.
		1281 Statice, éénjarige.

1752 Voor middelmatig grooten tuin: 27 soorten en variëteiten fr. 46 00

BLOEMPERKEN	SNIJBLOEMEN	DROGE TULEN
1081 Anjelier, Chineesche.	1085 Anjelier Heddeewigii.	945 Eschscholtzia.
1064 Antirrhinum, lage.	1062 Antirrhinum, hooge.	990 Gypsophila, sierl.
1210 Aster, lage.	1219 Aster, Chineesche.	1276 Helianthus.
1285 Nicotiana, witte.	903 Centaurea imperial.	1182 Pronkerwt.
1165 Phlox Drummondii.	1280 Calendula.	1225 Reseda.
1288 Tagetes Eerekruis.	906 Chrysanthem. carin.	1320 Zinnia.
889 Tropaeolum, lage.	917 Clarkia.	961 Zomerviolier.
	1171 Delphinium, éénj.	
		1335 Agrostis (siergras).
		1340 Briza (siergras).
		1010 Helichrysum.
		1233 Rhodanthe.
		1281 Statice, éénjarige.

1754 Voor grooten tuin: 51 soorten en variëteiten fr. 80 00

BLOEMPERKEN	SNIJBLOEMEN	DROGE TULEN
807 Ageratum, blauwe.	804 Adonis.	953 Gaura Lindheim.
1081 Anjelier, Chineesche.	1085 Anjelier Heddeewigii.	982 Godetia Whitneyi.
1064 Antirrhinum, lage.	1062 Antirrhinum, hooge.	990 Gypsophila, sierl.
1210 Aster, lage.	1219 Aster, Chineesche.	1276 Helianthus.
845 Balsamien Camellia.	1280 Calendula.	1021 Linum, grootbloem.
1026 Lobelia erinus.	901 Centaurea cyanus.	1035 Lupinus, éénjarig.
1285 Nicotiana, witte.	903 — imperialis.	1079 Nigella damascena.
1165 Phlox Drummondii.	905 Chrysanthem. cor.	1110 Papaver somnifer.
1188 Portulaca.	906 — carinatum.	1182 Pronkerwt.
1183 Pronkerwt.	917 Clarkia.	1225 Reseda.
1288 Tagetes Eerekruis.	927 Coreopsis.	1246 Salpiglossis.
1290 — signata.	1171 Delphinium, éénj.	1249 Scabiosa.
889 Tropaeolum, lage.	945 Eschscholtzia.	1254 Schizanthus.
1321 Zinnia.	950 Gaillardia picta.	1320 Zinnia.
		961 Zomerviolier.
		800 Acroclinium.
		1335 Agrostis (siergras).
		828 Ammobium alatum.
		1340 Briza (siergras).
		825 Gomphrena.
		1010 Helichrysum.
		1233 Rhodanthe.
		1281 Statice, éénjarige.



INSECTENDOODENDE STOFFEN

Oplosbare carbolineum. — Insectendoodende stof voor den Winter. — De groote vernier van de wollige bloedluis, waartegen deze stof zelfs in den Zomer aangewend wordt. Het ministerie van landbouw beveelt ze ook aan tegen andere bladluizen; de kermes, peregal, roode spin, de cochenille van den pereboom, roest van bezieboomjes, kanker. Wordt ook gebruikt tegen bladrollers, de meeste rupsen, bloemenvreters, schurft, monilia.

Gebruiksaanwijzing: Bestuivingen en insmeringen in den Winter, vooral van 1^{en} tot 15^{en} Maart.

Dosis: 5 a 7 %.

Prijs: de kan van 1 kg.

fr. 9.00

de kan van 5 kg.

fr. 35.00

Réol. — Zomer insectdoodend vocht, zeer krachtig. Vernietigt de meest weerstandbiedende insecten; thrips, groene bladluizen, galérues, enz. Zonder gevaar voor planten, bloemen en vruchten. Volkomen onschadelijk voor mensch en dieren. Verkocht in verzegelde ampullen. Gebruikswijze: Een zeer verdunde oplossing voor besproeiing, bestuiving of indompeling van de aangetaste planten.

Prijs: Doozen met 6 amp. van 2 cc. toelatende 2 l. insectdoodend vloeistof te bereiden fr. 16.00

» 6 amp. » 5 cc. » 5 l. » » » fr. 25.00

» 6 amp. » 10 cc. » 10 l. » » » fr. 35.00

Tabaksstof. — Krachtig middel om zoowel bladluis als aardvloo te vernielen.

Gebruiksaanwijzing: Uitstrooien 's morgens bij dauwweide of beter na een bestuiving met Réol of met goed zeepwater.

Prijs: Het kg., fr. 1.50; de 5 kg., fr. 6.00

Molpoeder. — Fijn stof om de mollen te vergifigen. Zekere uitslag en uiterst gemakkelijk aan te wenden. Een gebruiksaanwijzing is bij elk fleschje gevoegd . . . Het fleschje, fr. 15.00

ZWAMZIEKTEN BESTRIJDENDE STOFFEN

Bordeauxsche pap in poedervorm. — Bestrijdt met goed gevolg: den meeldauw van den wijnstok, de ziekten van aardappelen en tomaten en het schurft der fruitboomen.

Gebruiksaanwijzing: Giet langzaam 1 1/2 a 2 kg. pap in 100 l. water en roer intusschen het mengsel om met een stok. Besproei door middel van bestuiver, spuit of borstel.

Prijs: Het kg., fr. 7.00

Nicotinehoudende zwarte solfer. — Tegen het oidium van den wijnstok, de witziekte van erwten, rozelaar en chrysanthemums.

Gebruiksaanwijzing: Bepoeier achtereenvolgens bij stil en droog weder met solfer met 2 of 3 dagen tusschenpoos.

Prijs: Het kg., fr. 4.00; 5 kg., fr. 17.00

ALLERLEI

Houten etiketten voor boomen, met ijzerdraad . . . Het duizend, fr. 40.00; het honderd, fr. 4.50

Houten steetiketten (puntig) . . . » » fr. 36.00; » » fr. 4.00

Zware zinken etiketten, met verzinkten ijzerdraad . . . » » fr. 100.00; » » fr. 12.00

Inkt voor zinken etiketten, onuitwischaar Het fleschje, fr. 4.00

Koud entwas, allerbeste hoedanigheid:

De doos van 100 gr., fr. 4.00; de doos van 200 gr., fr. 7.00; de doos van 500 gr., fr. 15.00

Verstuiver « Idéal », die toelaat met een liter vloeistof meer dan 100 verstuivingen te doen en op een afstand van verscheidene meter een ware wolk te doen ontstaan, die overal binnendringt. Gebruikt voor het verstuiven van insectendoodende stoffen, voor het witten met kalk en het verven met carbolineum van hekken, enz.

Prijs: Verstuiver, 2 liter, vernikkeld koper, met een verlengstuk van geelkoper en een tweede van bulgzaam koper, dat men kan ombuigen om moeilijk bereikbare plaatsen te besproeien fr. 150.00

Spuit voor het besproeien met insectendoodende stoffen . . . fr. 65.00

Japansche raffia, extra om als bindsel te gebruiken: 100 k., fr. 1800.00; k., fr. 20.00; 100 gr., fr. 3.00

GECONCENTREERDE MESTSTOF VOOR BEGIETINGEN.

Gewaarborgde percentverhouding: Ammoniakale stikstof: 8; Nitrisc stikstof: 5; Phosphoorzuur, citroenzure oplossing: 9; Zuivere potasch: 10; Mangaan: 0,15; Zinkoxyde: 0,02.

Gebruiksaanwijzing: Potplanten om de 10 dagen begieten met een oplossing van 2 gr. in een liter water; vermeng 4 gr. met één kg. teelaarde om te verpotten of de bovenlaag te vernieuwen (een potje, dat 2 gr. kan inhouden bevindt zich in elke doos).

Bovendien mag men als algemeenen regel aannemen dat zoo men de groeikracht van een kweekplant wil vermeerderen b. v. van een groente, een bloem, een boom of een rozelaar, het nuttig is ze van tijd tot tijd met een oplossing van 2 gr. dezer bijzonder werkzame meststof te begieten.

Prijs: de doos van 100 gr. (voor 50 l. water) fr. 3.00

» 250 gr. » 125 l. » fr. 5.00

» 500 gr. » 250 l. » fr. 7.00

» 1 kg. » 500 l. » fr. 10.00

» 2 1/2 kg. » 1.250 l. » fr. 17.00



HET ZAAIEN BIJ AANLEG VAN WEIDEN EN GRASPERKEN.

Men zaait: 1. bij voorkeur in April-Mei; 2. ook echter van half Augustus tot einde September, alhoewel, in dit geval, de groote koude noodlottig is voor het zaaisel, tenzij men het lichtjes toedekt met langen mest. Na het zaaien zal men inharken of ineggen en dan goed toetrappen of goed rollen. Daar zware zaden altijd neiging hebben om op den bodem van den zak te vallen, zal men het mengsel goed omwerken. Om tijdelijke weiden aan te leggen zaait men somtijds buiten de graszaden ook 5 kg. gele Spaansche klaver of 3 kg. witte klaver (koekoekklaver) per hectare.

Voor weiden om af te maaien of af te grazen kan men ook per hectare bijvoegen: 3 a 5 kg. violette klaver of 15 a 20 kg. Spaansche klaver met dubbele snede. Voor de bestendige weiden zaait men somtijds na het gras 3 a 5 kg. violette klaver of 2 a 5 kg. koekoekklaver.

Het gebeurt ook, dat men bij het aanleggen van siergraspleinen, na het gras 1 kg. per hectare witte koekoekklaver uitstrooit.

DE TE GEBRUIKEN MESTSTOFFEN.

Aanleg. — Door bewerking, 500 a 600 kg. per are goed verteederd stalmest in den grond brengen. Vóór het eggen eene mengeling van 3 kg. ammoniaksulfaat, 7 kg. superphosphaat en 2 kg. potaschsulfaat per are uitstrooien.

Onderhoud. — Rond Februari-Maart, na de weide geëgd te hebben, een mengeling van 2 1/2 kg. sodanitraat, 3 kg. superfosfaat en 1 kg. potaschsulfaat per are uitstrooien.

Gedurende den Zomer de graspleinen, eens per maand, met onze gemengde meststof (blz. 41) besproeien, niet riekende noch gevaarlijke meststof, die in waarde met aalt gelijkstaat.

HET ZAAIEN VAN GRASZADEN ONDER HAVER.

Voor teelt in 't groot zaait men gewoonlijk, terzelfder tijd als de graszaden, haver, die een bijkomstigen oogst zal opleveren. Over zulke handelwijze kan men redetwisten, vooral als het er om gaat een blijvende weide aan te leggen. Zeker zal, indien de Zomer droog is, de haver de jonge grasplanten beschutten, maar zij zal er ook vele verstikken. Ook zal het onmogelijk zijn de weide de noodige meststoffen te geven, indien men de haver vóór den oogst niet wil zien tegen den grond slaan en alzoo de beste jonge grasplanten verstikken.

Bijgevolg, indien men er toe overgaat graszaden onder haver te zaaien, zal men moeten aannemen, dat het nutteloos is, zoo men waarlijk een goede weide wil bekomen, er aan te denken terzelfder tijd een vollen oogst haver te hebben. De weide zou slechts met de eerste beetten moeten gezaaid worden; men zal dus wachten dat de grond goed verwarmd is, zonder te aarzelen den uitersten datum voor de haver te overschrijden. Nochtans zal men deze zeer dun zaaien na den grond met meer zorg dan naar gewoonte te hebben voorbereid. Daarna zal men rollen om vervolgens de zaden uit te strooien, wel zorg dragende ze zeer dikwijls te mengen. Dan egt men zeer lichtjes om het zaad een weinig te bedekken zonder voren te maken, waarna men den grond met de rol goed plat legt.

Aldus zal men vermijden de voedzaamste grasplanten te verliezen, waarvan het zaad zoo duur gekost heeft.

ONZE VIER MENGSELS VAN EERSTE HOEDANIGHEID.

Ons doel is niet mengsels te maken die wij goedkoop kunnen afzetten, maar wel iets te bereiden van allereerste keus. Vele mengsels in den handel verkocht, zijn van geringe hoedanigheid, hetzij men ze maakt van graszaden van tweede keus, hetzij men tijdelijke soorten gebruikt, of wel blijvende van een bedenkelijke zuiverheid. Onze mengsels, integendeel, bevatten eerstens eene zekere hoeveelheid zaden van grassen met snellen groei, daarbij een mengsel van de beste blijvende soorten, die de plaats der eerste zullen innemen.

Wij verzoeken onze klanten ons de hoedanigheid van den te bezaaien grond te willen aanduiden:

1. Is hij droog, middelmatig droog of vochtig? 2. Is hij kleiachtig, aangespoeld, kalkachtig, droog, zandachtig, licht of zwaar? 3. Is het een vlakke, een helling? Is hij beschaduwde? enz.

1. MENGSELS VAN EERSTE HOEDANIGHEID.

	100 kg.	Kilogr.	500 gr.	250 gr.	Hoeveel. te zaaien per hect.
1759 Mengsel voor tijdelijke weiden (één of twee jaar) . .	740	8 00	4 60	2 80	60
1764 — voor blijvende weiden om af te maaien en om af te grazen.	1000	11 00	6 00	3 50	70
1770 — voor blijvende weiden; alleen om af te grazen .	1000	11 00	6 00	3 50	70
1775 — voor lustgrasperken, fijne graspleinen, grasta- pijten, sportterreinen	1200	13 00	7 00	3 70	120

2. MENGSEL VAN GEWONE HOEDANIGHEID.

1777 Mengsel voor weiden om af te maaien en af te grazen, goede kiemkracht	740	8 00	4 60	2 80	100
---	-----	------	------	------	-----

GRASZADEN VOOR WEIDEN EN SIERGRASPLEINEN.

	100 kg.	Kilogr.	Hoeveelh. te zaaien per heet.
1826 Beemdlangbloem (<i>Festuca pratensis</i>), doorl. Laat. Voor frisschen gr.	1100	12 00	12
1814 Dravik der weiden (<i>Bromus pratensis</i>), doorl. Voor z. slechten gr.	1100	12 00	10
1815 — zachte (<i>Bromus mollis</i>), doorl. Voor dorren grond.	340	3 70	60
1840 Honiggras, wollig (<i>Holcus lanatus</i>), doorl. Voor zand- en turfgrond.	340	3 70	50
1822 Kamgras (<i>Cynosurus cristatus</i>). Zeer goed om af te grazen.	2000	21 00	28
1824 Kropaar (<i>Dactylis glomerata</i>), doorl. Het best om af te maaien.	1000	11 00	50
1852 Pacey's gras, zeer fijn, extra. Voor fijne grasperken en grastapijten.	700	7 50	100
1850 Raaigras, Eng. (<i>Lolium perenne</i>). Laag, om te maaien en te grazen.	600	6 50	60
1851 — Engelsch, 1 ^{ste} keus. Extra zuiver, goed gezift, prachtig.	600	6 50	60
1854 — Italiaansch (<i>Lolium Italicum</i>), tweej. Te maaien, gr. opbr.	600	6 50	60
1838 — Fransch (Langhaver) <i>Avena elatior</i> , doorl. Bestand tegen hitte	2100	23 00	100
1835 Reukgras van Puël, éénj. Malsch, kort, vroeg. Voor drogen grond.	1000	11 00	40
1830 Schapen (zwenk) gras (<i>Festuca ovina</i>), doorl. Voor drogen grond.	1800	19 00	40
1811 Struisgras (<i>Agrostis stolonifera</i>), doorl. Laat. Voor frisschen grond.	3000	33 00	60
1832 Timotheegras, Doddegras (<i>Phleum pratense</i>), doorl. Tijdel. grasland.	920	10 00	18
1845 Veldbeemdgras (<i>Poa pratensis</i>), doorl. Te maaien en te grazen.	2000	21 00	20
1858 Weidevossenstaart (<i>Alopecurus pratensis</i>), doorl. Belomm. vocht. gr.	3400	37 00	25
1829 Zwenkgras, hard (<i>Festuca duriuscula</i>), doorl. Voor frisschen grond	1400	15 00	12

BEETEN.

Om een goede opbrengst te bekomen, werk gedurende den Winter 300 a 400 kg. mest per are in. Bij het omwerken van den grond in de Lente gebruikt men 6 a 8 kg. superfosfaat en 2 of 3 kg. zwavelzure potasch per are. Veertien dagen vóór het zaaien strooit men 5 kg. sodanitraat uit, die men goed inegt. Moest er gebrek aan stikstof zijn gedurende den groei, dan zal men vóór men den grond loshakt 1 kg. sodanitraat per are toedienen.

De voederbeeten zijn vraatzuchtige planten, die groote hoeveelheden meststoffen kunnen verdragen en die, zoo men kweekt met inachtneming onzer aanwijzingen, verbazende opbrengsten zullen opleveren.

1. VOEDERBEETEN (Mangelwortels).

	100 kg.	Kilogr.	500gr.	250gr.
1939 Mammouth, lange, roode, reuzige. Boven den grond	920	10 00	5 40	3 00
1941 Eckendorfer, roode, eivormige, reuzige. Boven den gr. Gehard.	1000	11 00	6 00	3 20
1942 — gele, eivormige, reuzige. Blijft lang goed	1000	11 00	6 00	3 20
1945 Vauriac, gele, reuzige. Zeer groot. Gemakkelijk te rooien	1000	11 00	6 00	3 20
1949 Groenkraag, lange, witte. Vaste, frissche gronden	920	10 00	5 40	3 00

2. HALFSUIKERBEETEN.


1951 Rozakraag, reuzige, halfsuiker. Voederbeet	920	10 00	5 40	3 00
1952 Groenkraag, witte, reuzige, halfsuiker. Voederbeet	920	10 00	5 40	3 00

3. SUIKERBEETEN.

1955 Suikerbeet, keur van Zahn. De beste	820	9 00	5 00	3 00
--	-----	------	------	------

ZADEN AAN VOORDEELIGE PRIJZEN. (Veranderlijke prijzen).

	100 kg.	Kilogr.	Hoeveelh. te zaaien per heet.
1997 Bastaardklaver, groene, doorl. Voederpl. voor vochtigen, kouden gr.	1400	15 00	10
1982 Boekweit, éénjarig. Groene voederpl. Zeer goed voor den Zomer.	340	3 70	70
1959 Hopklaver (gele, Spaansche kl.) tweej. Luzerne van schralen grond.	920	10 00	20
2004 Lentewikke, gewone. Groene voederplant in Mei-Juni.	340	3 70	200
1961 Luzerne, Provencer, 1 ^{ste} kwal., dik zaad, zonder warkruid.	1500	16 00	20
1969 Mostaard, witte, éénj. Groene voederplant. Zeer goede groene mest.	740	8 00	15
1981 Spaansche tweesnedenklaver, doorl. Schrale gr. mest, voederplant.	740	8 00	150
2000 Topklaver, roode (Fransche klaver). Voederplant. Groene mest.	740	8 00	25
1991 Violette klaver, 1 ^{ste} kwalit., dik zaad. Voornaamste voederplant, groen of droog.	1600	17 00	25
1994 Witte klaver, lage, doorl. Uitmuntend om af te grazen.	2600	27 00	12




1. VOORJAARSBLOEMBOLLEN.

Leverbaar van November tot in April.

	Hond.	Tien	Vijf	Stuk
2500 Anemoon, enkele, gemengd	28 00	3 20	1 80	—
2501 — dubbele, gemengd, eerste keus	36 00	4 00	2 20	—
2502 — Hortensis, dubbele, levendig rood	56 00	6 00	3 20	—
2503 — dubbele, chrysantbloemige, in schoon mengsel	36 00	4 00	2 20	—
De anemonen bloeien in Juni; men moet ze planten vóór 15 ^e Maart.				
2510 Bolbegonia, enkele, grootbloemige, gemengd	44 00	5 00	2 80	—
— enkele, grootbloemige, in afzonderl. kleuren, hieronder:	48 00	5 40	3 00	1 00
2511 levend. rood. 2513 wit. 2515 oranjekeurig.	—	—	—	—
2512 rose. 2514 geel. 2516 koperkeurig.	—	—	—	—
2517 Bolbegonia, enkele, met groote kamvormige bloem, gemengd.	60 00	6 50	3 50	1 00
2518 — « Papilio » enkele, grootbloemige, gemengd	60 00	6 50	3 50	1 00
2528 — dubbele, grootbloemige, gemengd	48 00	5 40	3 00	1 00
— dubbele, grootbloemige, in afzond. kleuren, hieronder:	56 00	6 00	3 20	1 00
2529 levend. rood. 2531 wit. 2533 oranjekeurig.	—	—	—	—
2530 rose. 2532 geel. 2534 koperkeurig.	—	—	—	—
2535 Bolbegonia, dubbele, met gr. kamvormige bloem, gemengd.	68 00	7 50	4 00	1 10
2536 — « Papilio », dubbele, grootbloemige, gemengd.	64 00	7 00	3 70	1 00
2537 — dubbele, met franjevormige groote bloem, gemengd.	60 00	6 50	3 50	1 00
2540 Gladiolus hybridische Gandavensis, zeer schoon mengsel	36 00	4 00	2 20	—
2541 — hybridische Lemoinei, extra keus. Gevlekte bloem.	36 00	4 00	2 20	—
2542 — hybr. Childsi, Amerikaansch ras, met dikke bloem	36 00	4 00	2 20	—
2543 — hybridische Brenchleyensis, scharlaken, zeer schoon.	36 00	4 00	2 20	—
— — grootbloemige, in afzonderlijke variëteiten hierna:	48 00	5 40	3 00	1 00
2544 Anmut, zalmkleur. rose. 2558 Maarschalk Foch, tee-	—	—	—	—
2546 Baron Hulot, wijnkleur- der rose.	—	—	—	—
— rig lichtpaars. 2559 Master Wietse, wijn-	—	—	—	—
2548 Empress of India, gra- moerkeurig.	—	—	—	—
— naatkeurig. 2561 Mr Mark, staalgrijs.	—	—	—	—
2550 Golden West, oranjekeurig. 2563 Sapho, bleekdorblad-	—	—	—	—
2552 Jacoba van Beieren, kleurig.	—	—	—	—
— saffloerrose. 2565 White Giant, zuiver wit.	—	—	—	—
2554 Liebesfeuer, klaproos- 2567 Yellow Hammer, leven-	—	—	—	—
— rood. dig geel.	—	—	—	—
2556 Loveliness, roomkeurig. 2568 Yvonne, rozig wit.	—	—	—	—
Allerprachtigste bloemperken. Heerlijke snijbloem. Plant in April-Mei.				
2570 Gloxinia, in schoon mengsel, extra keus	60 00	6 50	3 50	1 00
Pot gloxinia-bollen in Februari in heigrond. Verpot één- of tweemaal en U zult van Juli tot September prachtige broeikasplanten en zelfs kamerplanten hebben.				
2576 Lelie, witte, zeer welriekende bloemen in Juni	—	19 00	10 00	2 50
2579 — getijgerde, met dubbele bloem, extra	—	27 00	15 00	3 50
Prachtige sierplanten, die in allen goeden tuingrond gedijen. (Zie onze plaat met getijgerde lelie op den omslag van dezen catalogus.) Plant op een diepte van 15 cm. Bloeitijd in Juni. Men kan de bollen drie of vier jaren in den grond laten zonder ze te verdeelen.				
2582 Montbretia crocosmiaeflora, zeer levendig oranjekeurigrood.	24 00	2 80	1 60	—
2585 — crocosmiaeflora, goudgele	28 00	3 20	1 80	—
Voor boordbedden en snijbloemen. Planten van einde Maart tot einde Mei.				
2590 Ranonkel, Aziatische, overheerlijke, dubbele, in sch. mengsel	20 00	2 20	1 30	—
Zie ook Canna's, Dahlia's en Irissen, blz. 60.				

2. NAJAARSBLOEMBOLLEN, TE PLANTEN VOOR DEN WINTER.

De prachtige lentebloemen, die men crocus, hyacint, jonquille, lelietje-van-dalen, narcis, sneeuwkllokje en tulp noemt, moet men planten in October-November. De bollen zijn dus alleen leverbaar van September tot einde November. De klanten, die er verlangen, worden verzocht ons rond dit tijdstip onze bijzondere prijzen te vragen.



WELKE BOOMEN MOET MEN IN EEN KLEINEN TUIN PLANTEN?


Onder de boomen, die niet te veel plaats innemen, moet men de meest opbrengende kiezen.

Indien U over een muur beschikt, zoo kunt U tegen den oost- of den westkant abrikoze-, perzik- en pereboomen opleiden. Voor den zuidkant zult U vooral de voorkeur geven aan eenige uitstekende peer-soorten, die na Nieuwjaar malsch worden en deze bevoorrechte standplaats eischen. Aan den noordkant zult U frambozen-, aalbesse- en kruisbessetruiken of noordkersen (griotten) kweeken.

De hooge muren zullen van onder met laagstammige, van boven met hoogstammige leiboomen bedekt zijn. Langs de paden zult U pereboomen planten, die U zult vormen als vlakkigende snoeren of vooral als leiboomen tegen latwerk. Deze snoeren en leiboomen moet men bij voorkeur de noord-zuidrichting geven.

Voor vrijgroeielende pereboomen zult U verkiezen: den piramidevorm met een tusschenwijdte van 4 a 5 m., den spilvorm met een tusschenruimte van 2 m., of den vaasvorm op den onderlingen afstand van 3 a 4 m. De appelboomen kweekt men gewoonlijk als struiken geënt op paradijsappel en met een tusschenwijdte van 3 a 4 m.; kerse- en pruimeboomen, als hoogstammen of struiken. Op plaatsen aan noordenwind blootgesteld kweekt men noordkersen (griotten) en plant men eenige aalbesse-, kruisbessetruiken.

Wilt U eindelijk een hoekje van uw hof aan de blikken onttrekken, plant dan een rij hazelaars, die U niet alleen een dicht en sierlijk gebladerte, maar ook nog een der beste najaarsvruchten zullen verschaffen.



BESTELLING.

Duid aan of U hoogstammen of laagstammig verlangt. Behoudens tegenaanwijzing zullen wij de niet meer voorhanden variëteiten vervangen door andere even verdienstelijke, die rond denzelfden tijd rijp worden. Zoo ook zullen wij de niet als leiboomen beschikbare variëteiten leveren in goede twee- of driejarige zettingen, die gemakkelijker als latboomen zullen kunnen gevormd worden. Eindelijk zullen de variëteiten, uiverkocht als struiken, als snoeren geleverd worden.

ONTVANGST EN PLANTING.

Het opnieuw wortel schieten der planten zal hoofdzakelijk afhangen van de zorgen, welke men er aan zal besteed hebben bij hun aankomst. Men zal er zich onmiddellijk mede bezighouden en ze beschutten tegen windtochten, zon of koude.

Indien zendingen door de koude verrast werden, zal men ze, zonder ze uit te pakken, voor eenige dagen in een kelder brengen. Als de koude aanhoudt, zal men uitpakken, de planten overgieten en het wortelgestel en zelfs de takken goed vochtig houden bij middel van nat gemaakte zakken.

Is de schors der planten gerimpeld of zelfs gebarsten door een langdurige reis, dan worden de planten in de schaduw bijna gansch ingegraven en men houdt ze goed vochtig.

Indien men door den regen belet wordt, boomen en struiken bij hun aankomst te planten, zal men ze voorloopig ingraven (of inkullen). De groeve moet diep en breed genoeg zijn om verwarring en kwetsing der wortels te voorkomen.

Vóór de planting wordt de grond, op een diepte van 60 cm. en op ten minste 1^o50x1^o50 omgespit. Op den bodem werkt men een laag compost in. Daarbij voegt men mest, phosphoorzuur- en potaschhoudende meststoffen en zoo mogelijk wolafval. Merk wel op dat kalk onontbeerlijk is voor steenvruchten alsook stalmest. Maar meststoffen en stalmest mogen nooit rechtstreeks in aanraking met de wortels komen.

Deze worden opgeknapt, dat wil zeggen, men snijdt de uiteinden met een scherp snoeimes af om de ontwikkeling van nieuwe haarwortels te bevorderen. Men moddert ze in met een mengsel van twee derden leem en één derde koedrek, waarbij men water gevoegd heeft om een tamelijk dikke brij te vormen. Plaats de boomen op een kleine verhevenheid, zoodat de griffel boven den grond zij. Draag er zorg voor, terwijl U de wortels toedekt, de plant lichtjes te schudden om goed al de ledige ruimten te vullen en trap daarna den grond zorgvuldig vast.

Heeft de planting plaats vóór den Winter, beschut dan den voet der boomen met een laag stroomest, die U in de Lente verwijderd, daar zij de verwarming van den grond zou belemmeren.

Spread rond 1^o Mei een nieuwe laag stroomest uit, die ditmaal zal dienen om den grond frisch te houden.

WEDERAANGROEIING.

Bij het leveren van boomen, struiken, plantsoenen dragen wij er de grootste zorg voor slechts planten te leveren van allereerste hoedanigheid, levenskrachtig, met een goed ontwikkeld wortelgestel en derwijze ingepakt, dat zij gemakkelijk zonder schade kunnen vervoerd worden.

Het is ons echter onmogelijk er de wederaangroeiing van te waarborgen, want in elke verplanting is er natuurlijk een risico: de inspanning, die voor de wederaangroeiing van de plant gevegd wordt, is aanmerkelijk en daarin slaagt zij niet altijd.

Ook zouden wij U niet genoeg kunnen aanraden de hierboven aangeduide raadgevingen, alsmede de boven elk hoofdstuk opgegeven bijzondere wenken stipt te volgen. Aldus zult U het percent verlies, dat iedere planting onvermijdelijk vergezelt, tot een minimum herleiden.

AALBESSEBOOMPJES.		Tien	Stuk	AALBESSESTRUIKEN.		Tien	Stuk
Kers, roode, extra	—	—	9 00	Hollandsche, witte	20 00	2 50	
Witte, doorschijnende	—	—	9 00	Kers, roode, extra	20 00	2 50	
AALBESSESTRUIKEN.				Knight, roode	20 00	2 50	
Cassis Royal, zwarte	20 00	2 50		Rode van Versailles	20 00	2 50	
Hollandsche, roode	20 00	2 50		Witte, groote, doorschijnende	20 00	2 50	

ABRIKOZEBOOMEN.

Laagstammen: struiken: fr. 12 00; leiboomen: fr. 16 00. Hoogstammen: fr. 30 00.

Koninklijke, dikke, z. goede vrucht; z. vruchtbaar; voor liefhebber en markt
Perzik van Nancy. Dikke, uitstekende vrucht voor liefhebber en markt; extra.
Van den Kanselier (Du Chancelier). Dik, gekleurd, 1^{ste} kwaliteit. Vruchtbaar
Vroege van Esperen. Middelmatis dik; sappig, zeer goed. Kloek; voor liefhebb.

Tijdstip van
rijpwording

begin Aug.
half Aug.
einde Juli
einde Juli

HOOGSTAMMIGE APPELBOOMEN.

Beschikbaar met sterke stammen. Het stuk: fr. 18 00.

Bismarck. Zeer dikke vrucht met goeden smaak. Uiterst vruchtbaar
Boomgaard Calville, Quoestresse. Middelmatis dik, zeer goed. Voor handel
Bon Pommier nouveau, Defourny. Dik, zeer goed. Kloek; zeer vruchtbaar
Brabantsche, grijze. Nogal dikke vrucht, extra. Kloek; vruchtbaar
Cellini. Dik, uitstekend. Kloek, vruchtbaar, zeer aanbevelenswaardig
Court-pendu. Middelmatis dik, uitstekend. Kloek, nogal vruchtbaar; v. handel
Dubbele bellefleur. Dikke, zoete, goede vrucht; zeer groote boom.
Enkele bellefleur. Nogal klein, maar houdt zich lang goed. Zeer vruchtbaar
Fransche Posson. Zeer dik, zeer zwaar, goed v. appelmoes. Kloek en vruchtbaar
Jaak Lebel. Zeer dik, zeer goed. Uiterst vruchtbaar, zeer gehard
Keuleman (Gueule de Mouton). Nogal dik, goed; reuzig, zeer vruchtbare boom
Klaarappel, witte (Transparente jaune). Middelmatis dik, lekker. Vruchtbaar
— van Croncels (Transparente de Croncels). Tamelijk dik, uitstekend. Kloek, vruchtbaar
Renet Descardre, Dik, uiterst goed. Buitengewoon vruchtbaar; extra
— Fransche, court-pendu van Doornik. Dik, uitmuntend. Zeer vruchtbaar
— van Chénée, Dik, uitmuntend, goed om te bewaren. Kloek, zeer vruchtbaar
Schoone van Boskoop (Belle de Boskoop). Nogal dik, mooi, lekker. Z. vruchtbaar
Sterappel (Reinette étoilée). Mooi, rood, middelmatis dik, lekker. Z. vruchtbaar
Winterbellefleur. Nogal dik, goed vooral voor appelmoes. Kloek, vruchtbaar

Oct.-Januari
Oct.-Januari
Dec.-Januari
Nov.-Febr.
October
Januari-Juni
Dec.-April
Jan.-April
Dec.-Mei
Oct.-Nov.
Dec.-April
Juli
Aug.-Sept.
Dec.-Maart
Jan.-Maart
Dec.-Maart
Dec.-Febr.
Oct.-Dec.
Dec.-Juni

LAAGSTAMMIGE APPELBOOMEN.

De op paradijsappel gegriffelde appelboom biedt grotere voordeelen dan de op zoetappel gegriffelde. In vruchtbaren grond geplant laat hij toe snoeren, spijvormen maar bijzonder prachtige struikjes te vormen die, in plaats van veel hout te vormen, kort en gedrongen blijven en reeds van de eerste jaren af allerschoonste vruchten dragen. Al de hieronder vermelde variëteiten zijn beschikbaar geënt op paradijsstam.

De struik is de beste vorm voor appelaar op paradijsappel. Het snoeien is zeer eenvoudig. De vruchttwijgen worden op 3 a 4 oogen gesnoeid en de verlenging der takken op 25 a 30 centimeter.

De zoetappel past nochtans het best voor droge, arme of kalkachtige gronden; daarom griffelen wij op zoetappel, de variëteiten voorafgegaan door de letter D.

Snoeren gegriffeld op paradijsappel: fr. 6 00; op zoetappel: fr. 6 00.

Struiken gegriffeld op paradijsappel, fr. 12 00; op zoetappel, fr. 12 00.

Bellefleur, gele, Linneous pippin. Nogal dik, zeer goed. Kloek, vruchtbaar
D Bismarck. Zeer dik, zeer goed. Buitengewoon vruchtbaar, extra.
D Borowski. Dik, malsch, zeer goed. Tamelijk kloek, zeer vruchtbaar
D Cellini, Dik, uitstekend. Kloek, vruchtbaar, zeer aanbevelenswaardig.
D De Koningin (The Queen). Uitmuntend. Uiterst vruchtbaar, zeer gewild
D Gravenstein. Dik, lekker. Zeer kloek en vruchtbaar; extra.
D Keizer Alexander. Zeer dik, zeer goed. Vruchtbaar, voor handel.
D Klaarappel, witte (Transparente jaune). Z. dik, lekker; z. vruchtbaar; extra.
— van Croncels (Transparente de Croncels). Lekker. Vruchtbaar. Handel
London pippin, Koningscalville. Nogal dik, uitstekend. Vruchtbaar. Leiboom.
Renet Beaumann, Dik, goed. Kloek, zeer vruchtbaar.
— Descardre. Dik. Buitengewoon goed. Uiterst vruchtbaar, zond. weerga
— Koningin der Renetten van Engeland. Zeer fijn. Kloek en vruchtbaar
— Koninklijke van Engeland. Zeer dik, extra goed. Kloek, z. vruchtbaar
— Landsberger. Dik, zeer goed. Vruchtbaar, zeer aanbevelenswaardig
— van Canada. Zeer dik, zeer goed. Zeer vruchtbaar, voor handel
— van Caux. Tamelijk dik, zeer goed. Kloek, zeer vruchtbaar
D — van Chénée, Dik, lekker. Kloek, vruchtbaar. Blijft lang goed, extra.
D Schoone van Boskoop. Mooi, zeer fijn. Zeer vruchtbaar, voor handel, extra
D Winter Calville, witte geribde. Z. dik, extra fijn. Leib. slechts in 't Zuiden
D Zonder gelijke van Peasgood (Sans pareille). Zeer dik, gekleurd, zeer goed, zeer vruchtbaar

Tijdstip van
rijpwording

Dec.-Maart
Oct.-Januari
Aug.-Sept.
October
Nov.-Dec.
Nov.-Januari
Octover-Nov.
Juli
Aug.-Sept.
Febr.-Maart
Dec.-Januari
Dec.-Maart
Oct.-Dec.
October
Dec.-Febr.
Dec.-Februari
Maart-April
Dec.-Maart
Dec.-Febr.
Dec.-Maart
Nov.-Dec.

FRAMBOZENSTRUIKEN.

Met roode vruchten	Tien stuks: fr. 16 00
Met gele vruchten	Tien stuks: fr. 16 00

HAZELAARS

Aveline of Lambertsnoot, dikke, uitmuntende, zeer vroege vrucht	fr. 4 60
Bergeri, dikke, langwerpige, zeer goede vrucht. Halfvroeg	fr. 4 60
Met purpere bladeren en vruchten. Van allereerste hoedanigheid. Vruchtbaar	fr. 6 50

KASTANJEBOOMEN MET EETBARE VRUCHTEN

Met groote vruchten van Lyon	Hoogstammen: fr. 30 00
--	------------------------

KERSEBOOMEN.

Laagstammen: fr. 12 00; hoogstammen: fr. 22 00.

Eisdensche, Bastaarddikke (Abbesse de Mouland). Nogal dik, zwart, zeer goed	einde Juli
Kers Lemercier. Dikke, zurige, zeer goede vrucht.	einde Juli
— vroege of late. Zeer dik, uitmuntend. Zeer vruchtbaar, zonder weerga.	half Juni
— Spaansche of zoete, Early Rivers. Dik, rozig, z. goed. Vrucht b.; de vroegste	begin Juni
— (kriek) Zure van Tihange, van Portugal. Nogal dik, rood, z. goed. Vrucht b.	Augustus
Knapkers, roode Spaansche. Zeer dikke, rozige, lekkere, knappende vrucht.	Juli
— zwarte, dikke, zeer goede vrucht, van 1 ^{ste} hoedanigheid	Juli
Noordkriek (Morel). Dikke, zurige, zeer sappige vrucht; extra om in te maken.	
Zeer vruchtbaar, zeer goede leiboom voor standplaats in 't Noorden	Aug.-Sept.

KRUIS- OF STEKELBESSESTRUIKEN.

Groote lange witte.	Tien stuks, fr. 30 00; stuk, fr. 3 50
Monsterachtige, Amerikaansche	Tien stuks, fr. 30 00; stuk, fr. 3 50
Wynham Industry	Tien stuks, fr. 30 00; stuk, fr. 3 50

KWEEPEREBOOMEN.


Van Portugal, voor inmaak, enz.	Laagstammen, fr. 12 00
---	------------------------

MISPELBOOMEN.

Met zeer groote vruchten	Laagstammen, fr. 14 00; Hoogstammen, fr. 25 00
------------------------------------	--

NOTEBOOMEN.

Vruchtbare van Chatenay, brengt uiterst snel op	fr. 20 00
---	-----------



PEREBOOMEN.

Laagstammen: snoeren, fr. 6 00; struiken en piramiden van 2 of 3 jaar, fr. 11 00; leiboomen, 1 verdieping, fr. 15 00. — **Hoogstammen:** leiboom en boomgaard, fr. 20 00.

De variëteiten onder de rubriek « Hoogstammen: Leiboom en Boomgaard », zijn de eenige die als hoogstammen beschikbaar zijn.

1. — LAAGSTAMMIGE PEREBOOMEN.

Piramiden en struiken. — Onder de rubriek « Piram. » zijn de goede laagstammige variëteiten aangegeven, die als piramiden of struiken gekweekt worden.

« Leib. Z. » — In deze kolom hebben wij de late variëteiten genoemd, die als leiboomen alleen goeden uitslag geven, in volgende standplaats: Oost-Zuid-Oost, Zuid-Oost, Zuid, Zuid-Zuid-West. Natuurlijk zullen, aldus geplaatst, alle variëteiten van leiboomen de beste uitslagen geven.

« Leib. O. » — In deze kolom komen de variëteiten voor, aan welke de Zuiderligging niet volstrekt noodzakelijk is. Leiboomen voor het Westen aangegeven zullen er ook zeer goede uitslagen geven.

« Leib. W. » — Dit zijn de variëteiten, die goed zijn voor Zuid-West en West-Noord-West.

Lei-vruchtboomen voor het Noorden. — Alleen de drie soorten: Bon Chrétien William, Durondeau en Louise Bonne d'Avranches zullen redelijke vruchten opbrengen in het Noord-Oost en Noord-West. Aan de vlak op het Noorden gelegen muren, moet men noordkersen, aal- en kruisbesstruiken, enz., planten.

Vrij staand latwerk. — Tegen vrij staand latwerk kan men alleen de variëteiten zetten aangegeven in de kolommen « Leib. O. » en « Leib. W. ». Voor de variëteiten « Leib. O. » moet men eene warme plaats voorbehouden. De peren « Leib. Z. » passen niet voor vrij staand latwerk.

2. — HOOGSTAMMIGE PEREBOOMEN.

Leiboomen. — In de kolom « Leib. » verschijnen de variëteiten, die wij als hoogstammige leiboomen kweeken, om hooge muren en gevels te versieren. Het is voldoende te zien welke ligging er in de kolom der laagstammen voor aangegeven is.

Boomgaard (Waaiboomen). — Eindelijk zijn de boomen, vermeld onder de rubriek « Boomgaard », de beste als hoogstammige waaiboomen, en zijn in sterke exemplaren voorradig.

VARIËTEITEN	DIKTE VAN DE VRUCHT	HOEDA- NIGHEID	TIJDS- TIP VAN RIJP- WORDING	GROEI- KRACHT	TE KWEEKEN ALS: LAAGSTAMMEN				ALS HOOG- STAMMEN	
					Pir.	Leib. Z.	Leib. O.	Leib. W.	Leib.	Boom- gaard
Alexandrine Drouillard	tam. d.	z. goed	Nov.	tam. kl.	z. g ^{ood}	—	—	goed	—	—
Bergamat van Esperen	tam. d.	smelt. zoet	Mrt.-Juni	kloek	wein. z. g ^{ood}	—	—	—	z. g ^{ood}	—
Bon Chrétien William	dik	muskus-p	Augustus	kloek	extra	—	—	extra	extra	z. g ^{ood}
Boterpeer d'Hardenpont	dik	z. fijn	Dec.-Jan.	kloek	—	extra	—	—	extra	—
» Diel.	z. dik	half fijn	Nov.-Dec.	z. kloek	ta ^m .g.	extra	extra	—	extra	—
» Dubbel Philippen	dik	goed	September	kloek	goed	—	—	goed	—	z. g ^{ood}
» Dumont	dik	fijn, zoet	Oct.-Nov.	kloek	goed	—	—	goed	—	—
» Giffart	middelm.	z. sappig	beg. Aug.	kloek	goed	—	—	ta ^m .g.	—	—
» Hardy	dik	uitmunt.	October	z. kloek	z. g ^{ood}	goed	goed	—	—	goed
» van Amanlis	tam. d.	z. goed	September	z. kloek	ta ^m .g.	—	—	z. g ^{ood}	z. g ^{ood}	z. g ^{ood}
Catillac, Gros Gillot	z. dik	stooftpeer	Nov.-Dec.	kloek	—	—	—	—	—	z. g ^{ood}
Charles Ernest	dik	fijn sappig	Nov.	z. kloek	goed	—	z. g ^{ood}	—	—	—
Clapp's Gunsteling (Fav.)	dik	z. fijn	Aug.-Sept.	tam. kl.	z. g ^{ood}	—	—	goed	—	—
Colmar Dumortier	tam. d.	z. fijn	Februari	tam. kl.	goed	ta ^m .g.	—	—	—	—
Colorée van Juli	tam. d.	half fijn	Juli-Aug.	tam. kl.	ta ^m .g.	—	—	—	—	—
Doyenné, Winterdoyenné	z. dik	z. dik	Jan.-Mei	tam. kl.	—	goed	—	—	—	—
» du Comice	dik	uitstek.	Nov.-Dec.	z. kloek	z. g ^{ood}	—	z. g ^{ood}	ta ^m .g.	—	—
Durondeau van Tongeren	dik	welsmak.	October	kloek	extra	—	extra	z. g ^{ood}	extra	z. g ^{ood}
Gravin van Parijs	dik	z. goed	Dec.-Jan.	kloek	goed	—	goed	—	—	—
Hertogin van Angoulême	tam. d.	goed	Oct.-Nov.	tam. kl.	extra	—	—	goed	—	—
Jozefine van Mechelen	tam. d.	z. fijn	Jan.-April	kloek	ta ^m .g.	z. g ^{ood}	—	—	z. g ^{ood}	—
Jules d'Airoles	tam. d.	zeer fijn	Dec.-Jan.	kloek	z. g ^{ood}	z. g ^{ood}	goed	—	z. g ^{ood}	—
Kalebaspeer (à la Reine)	tam. d.	goed	September	z. kloek	—	—	—	—	—	extra
Legipont	tam. d.	z. goed	Nov.	tam. kl.	—	—	—	—	—	extra
Le Lectier	dik	z. goed	Dec.-Jan.	z. kloek	ta ^m .g.	z. g ^{ood}	—	—	goed	—
Louise Bonne d'Avranches	tam. d.	uitstek.	Sept.-Oct.	kloek	extra	—	—	extra	z. g ^{ood}	z. g ^{ood}
Marie Guisse	dik	sapp. goed	Feb.-Maart	tam. kl.	—	goed	—	—	—	—
Nec plus Meurice	dik	z. goed	Nov.-Jan.	tam. kl.	z. g ^{ood}	—	goed	—	—	—
Nouvelle Fulvie	tam. d.	z. fijn	Dec.-Jan.	tam. kl.	—	extra	—	—	extra	—
Passe Colmar	tam. d.	uitstek.	Dec.-Feb.	kloek	ta ^m .g.	extra	—	—	—	—
Passe Crassane	tam. d.	welsmak.	Jan.-Maart	niet z. kl.	—	extra	extra	—	extra	—
Président Drouard	dik	z. goed	Jan.-Maart	kloek	goed	z. g ^{ood}	—	—	—	—
Raadsheer aan 't Hof (Conseller à la Cour)	dik	sapp. goed	October	z. kloek	goed	—	—	goed	—	goed
St Remigius.	dik	stooftpeer	Decemb.	kloek	—	—	—	—	—	extra
Soldat Laboureur.	tam. d.	zoet, goed	Oct.-Nov.	kloek	goed	—	—	goed	—	—
Triomf van Weenen	dik	welsmak.	Aug.-Sept.	tam. kl.	z. g ^{ood}	—	—	—	—	—
Williams Hertogin	z. dik	goed	Oct.-Nov.	z. kloek	goed	—	—	goed	—	—
Zéphirin Grégoire	tam. d.	uitstek.	Nov.-Dec.	tam. kl.	goed	—	—	goed	—	—
Zomerpresentpeer	tam. d.	sappig	Augustus	tam. kl.	—	—	—	—	—	goed

PERZIKBOOMEN.

Laagstammen: heesters, fr. 10 00; leiboomen, fr. 16 00. Hoogstammen: fr. 30 00.

Alleen de variëteiten voorafgegaan door een T zijn beschikbaar als hoogstammige.

- Alexander**, vroege. Welsmakend. Kleine heesters en leiboomen
- T Amsden**, Nogal dik, gekleurd, uitstekend. Vruchtbaar. Voor handel
- Belle Beauce**, groote late mignonne. Dik, lekker. Vruchtbaar. Voor markt.
- Bloedperzik Lord Napier**. Dik, zeer goed. Voor markt. Leiboom, heester
- **Galopin**. Zeer goed. Kloek, Voor den handel.
- **roode Mont-Saint-Jean**. Dik, uitstekend. Vruchtbaar. Goede heester.
- De Overwinnaar (Le Vainqueur)**. Dik, gekleurd, lekker. De vroegste
- Early Rivers**. Tamelijk dik, welsmakend, zeer goed. Kloek, z. vruchtbaar
- Goede Werkman (Bon Ouvrier)**. Nogal dik, gekleurd, z. goed. Z. vruchtbaar
- T Koningin der Boomgaarden**. Dik, lekker. Z. vruchtbar. V. handel. Waaiboom
- Magdalena**, roode. Dik, zeer goed. Kloek, vruchtbaar
- Meiroode**. Middelmattig dik, zeer gekleurd, zeer goed. Nogal kloek
- Mignonne**, groote, vroege. Z. dik, extra. Zeer vruchtbaar. Handel. Heester

PRUIMEBOOMEN.

Laagstammen: fr. 12 00; hoogstammen: fr. 20 00.

- Abrikoospruim (Passe-abricot)**. Nogal dik, rond, violetkl. Zeer goed. Z. vroeg
- Bakpruim**, enkele. Tamelijk dik, violet-rood. Zeer vruchtbaar. Zeer gewild
- **dubbele**. Langwerpig, donkerviolet, uitstekend. Bestendig vruchtbaar.
- Bitterpruim**. Rond, violetrood, zeer vroeg. Uiterst vruchtbaar
- Gulden drop**. Dik, langwerpig, goudgeel, zeer goed. Kloek, zeer vruchtbaar
- Kirker's Plum**. Dik, rond, violetpurper, extra. Kloek en vruchtbaar
- Koningspruim (Reine-Claude) van Altham**. Dik, rozig. Kloek, z. vruchtbar. Handel
- **goudgele, gespikkelde**. Goudgeel, uitstekend. Zeer vruchtbaar. Extra
- **violette**. Nogal dik, donkerviolet, zeer goed. Zeer vruchtbaar
- Schoone van Leuven**. Violet, zeer dik, zeer vroeg. Zeer kloek, zeer gewild.
- Victoria**. Dik, purperrood, nogal goed. Tamelijk kloek; uiterst vruchtbaar

WIJNSTOKKEN (DRUIVELAARS).

Niet leverbaar in Frankrijk. — Het stuk: fr. 10 00.

Wijnstokken voor broeikas:

- Frankenthal**. Zwart. Groote langwerpige tros. Zeer vruchtbaar
- Alphonse Lavallée**. Zwart, goed. Zeer groote tros, zeer dikke druif
- Chasselas de Fontainebleau**. Goudgeel, lekker. Langwerp. tros. Kloek; vruchtbar.
- Foster's White Seedling**. Wit. Zeer groote tros. Kloek; vruchtbaar
- Muskaatdruif van Alexandrië**. Wit. Gr. goudgele tros; z. dikke druif; vruchtbar.
- Dikke Colman**. Blauwachtig zwart. Groote langwerpige tros. Vertraagde teelt.
- Zwarte Alicante (Black Alicante)**. Donkerzwarte. Vertraagde teelt; de laatste.

Wijnstokken voor open lucht:

- Saint-Laurent**. Zwart. Korte, dichte tros; extra.
- Chasselas de Fontainebleau**. Goudgeel, lekker. Langwerp. tros. Kloek; vruchtbar.
- Vroege van Malingre**. Goudgeel. Tamelijk groote tros. Nogal kloek; z. vruchtbar.

Tijdstip van rijpwording

Juli
half Juli
half Sept.
einde Aug.
begin Sept.
begin Sept.
einde Juli-Aug.
einde Juli
begin Oct.
half Sept.
begin Sept.
begin Juli
begin Aug.

Augustus
September
begin Sept.
Juli
einde Sept.
Aug.-Sept.
einde Aug.-Sept.
begin Sept.
begin Sept.
begin Sept.
einde Aug.



Klaarappel van Croncels.

Goudgele gespikkelde Koningspruim.

Enkele Bakpruim.



ROZELAARS

ONZE VERZAMELING bestaat uit de beste variëteiten, die tot heden de schoonste uitslagen gegeven hebben.

Onze rozelaars zijn gezond en weelderig van groei. In den Herfst worden zij uitgedaan, ingemodderd en onder een afdek in groeven ingelegd om er den Winter door te brengen.

Behoudens tegenbericht, vervangen wij uitverkochte variëteiten door andere, van dezelfde waarde.

De rozelaars mogen slechts voor het verzenden uitgegraven worden, als zij bijna al hun bladeren verloren hebben, hetgeen gewoonlijk in de eerste dagen van November plaats heeft. Dus beginnen wij de verzendingen van rozelaars rond den 10^e November.

AANKOMST. — Rozelaars, welke bij vorstweeder ter bestemming komen, zal men in een kelder plaatsen om ze stilaan tot hun normalen staat te laten terugkeeren; is de schors gerimpeld door een langdurige reis, dan worden de rozelaars in de schaduw bijna gansch ingegraven; houd den grond goed vochtig en dek de planten met een natten zak. Het is altijd prijsbaar vóór de planting, de planten in een mengsel van klei, koedrek en water in te modderen.

MESTSTOFFEN. — Magnesia heeft een gunstigen invloed op den wasdom der rozelaars. Te veel potasch veroorzaakt geelziekte. Men zal dus zeer vroeg in de Lente, een mengsel van 50 gr. sodanitraat, 60 gr. superphosphaat, 20 gr. potaschsulfaat en 30 gr. magnesiassulfaat toedienen.

DE PLANTING. — Plant rozelaars in een openluchtige zonnige ligging in het kleiachtigste gedeelte van den tuin, waar de grond voedzaam is en frisch blijft; laat een afstand van 30 a 35 cm. tusschen de zwak groeiende soorten, zooals Polyantha, van 40 a 45 cm. voor die van middelmatige groei en van 50 a 60 cm. voor de sterk groeiende. Den wortelhals der struikrozelaars eenige centimeters onder den grond ingraven en de aarde vast aandrukken om ze goed in aanraking met de wortels te brengen.

HET OVERWINTEREN. — Struikrozelaars worden aangeaard met aangebrachten lichten grond of kolenasch, die men dan in Maart verwijdert. Bij stamrozen wordt de kruin of kroon met stroo of schavelingen omringd; deze bindt men er goed aan vast, zorg dragende nochtans niet te vast toe te snoeren.

SNOEI EN ONDERHOUD. — Rozelaars bloeien maar goed op jong hout, en moeten ieder jaar gesnoeid worden, te beginnen van het jaar der planting zelf. Het oud hout, dat bloemen voortgebracht heeft, wordt weggenomen; men behoudt maar 4 of 6 jonge, kloeke scheuten, die zich zeer laag vlak bij de griffel bevinden en goed geschikt zijn om een schoonen struik te vormen. Snoei die scheuten, op 3 a 6 oogen volgens hun groei en meer dan 4 of 5 scheuten behouden, is den rozelaar uitputten en de waarde der rozen verminderen.

De scheuten van den wilden rozelaar, die bij het groeien onder de griffel verschijnen, trekt of snijdt men af juist op de plaats, waar ze op den stengel uitschieten.

In Mei wordt koemest aan den voet der planten geplaatst om den grond vochtig te houden. De witte ziekte bestrijdt men door de aangetaste planten met genicotiniseerde zwavelbloom te bestrooien. Verdelg de bladluizen door besproeiingen met Réol of wel met een oplossing van 2 kg. bruine zeep in 100 liter water, waarbij men zeer langzaam, al roerende, 1 liter petroleum voegt.



Pernetiana roos.

Hybridische Theeroos.

HOOGSTAMMIGE ROZELAARS.

gegriffeld op wilde rozelaars, in schoone geharde variëteiten naar onze keus.

ROZELAARS, HALFSTAMMEN	0m60 a 0m80, met kroon. . .	het stuk fr. 10 00
ROZELAARS, STAMMEN	0m80 a 1m20, id.	id. fr. 15 00

Wij bezitten er een prachtige verzameling, waarvan de plaat, bij onzen catalogus gevoegd, eenige speciemens voorstelt. De lijst der variëteiten wordt aan alle liefhebbers op aanvraag gezonden.

Wij kunnen niet genoeg aanraden gebruik te maken van deze sierlijke boompjes voor het versieren van kleine hoven, daar zij er geen plaats innemen, hetgeen zeker een groot voordeel uitmaakt. Men plant ze langs groentebedden en langs hun dunnen stengel kan men zelfs eenige mooie reukerwtten laten opklimmen.

HOOGSTAMMIGE TREURROZELAARS . . .	1m50 a 1m70, met kroon. . .	het stuk fr. 20 00
HOOGSTAMMIGE TREURROZELAARS . . .	1m70 a 2m00, id.	id. fr. 25 00

LAAGSTAMMIGE KLIMROZEN.

De veelbloemige en de hybridische Wichuraiana-rozelaars zijn bijzonder geschikt voor bogen, balustraden, booggangen (pergola's) en alle standplaatsen in open lucht. De klimmende thee- en noisette-rozelaars passen beter voor muren, op voorwaarde dat deze kunnen benuttigd worden aan den zuid-, den zuid-west- of den zuid-oostkant. Voor den oost- en den westkant zult U U beperken tot de veelbloemige rozelaars: Crimson en remontante Crimson en tot de Wichuraiana-rozelaars: Alberic Barbier, American Pillar en Veilchenblau. Eindelijk vlak aan den noordkant zult U slechts: Crimson, remontante Crimson en American Pillar planten.

Sterke planten, met steunstokken. Het honderd: fr. 270 00; tien stuks: fr. 30 00; het stuk: fr. 3 50

VEELBLOEMIGE ROZELAARS.

Zeer kloek: mooie tuitjes van kleine bloemen. Alhoewel zeer gehard vergen zij echter een lichte beschutting tegen de hevige koude: aanaarden van den voet en den grond bedekken met stroomest. Zuiveringssnoeiing.

Crimson Rambler, karmozijnrood, schitter.
Crimson Rambler, herbloeiende, mildbloeiend.

Thoresbyana, wit, mildbloeiend.
Veilchenblau, rozig lila, dan staalblauw.

HYBRIDISCHE ROZELAARS WICHURAIANA.

Uiterst kloek; glanzend gebladerte; buitengewoon rijkbloeiend. Zeer gehard; verdraagt 15° onder nul. Moet bijna niet gesnoeid worden.

Albéric Barbier, roomkleurig.
American Pillar, levendig rose, wit oog.
Aviateur Blériot, safraangeel.
Carmine Pillar, levendig rooskleurig karmijn.
Dorothy Perkins, lichtrose.
Hiawatha, glanzend karmozijnrood.
Jean Guichard, karmijnkleurig, dan koperkl.

Lady Gay, kersrood.
Paul's Scarlet Climber, levendig scharlaken.
René André, morgengeel, oranjekleurig.
Royal Scarlet Hybrid, donkerscharlaken.
Tausendschön, karmijnrose.
White Dorothy, zuiver wit.

RANKENDE THEEROSZELAARS.

Kloek; prachtige bloei gansch den Zomer. Den voet beschutten in den Winter en vochtigheid vermijden. Worden bijna niet gesnoeid.

Beauté de l'Europe, geel met schakeeringen.
Gloire de Dijon, zalmkleurig, geurig.
Koningin Maria-Hendrika, karmijnrood.

Maarschalk Niel, goudgeel, geurig. Broeikas.
Madame Jules Gravereaux, vleeschkl. geel.

HYBRIDISCHE RANKENDE THEEROSZELAAR.

Souvenir de Claudius Denoyel, karmozijn.

NOISSETTE ROZELAARS.

Groote tuilen met teere kleurschakeering, heerlijken geur. Eischen in den Winter een goede beschutting aan den voet. Worden weinig of niet gesnoeid. Zeer kloek.

Aimée Vibert, sneeuw wit.
Bouquet d'or, zalmkleurig geel.

William Allen Richardson, okergeel.

CLIMBING ROZELAARS (KLIMMENDE).

Vastgezette toevallig rankende verbastering van perkrozelaars. Grootbloemige, mildbloeiende, geharde en bijzonder goed klimmende rozelaars, te verkiezen boven andere rankende variëteiten voor standplaatsen, waar men geen te groote ontwikkeling wenscht. Worden bijna niet gesnoeid. Men bindt de ranken op in horizontale richting en leidt ze daarna boogvormig naar den grond.

Climbing Caroline Testout, vleeschkl. rose.
Climbing Laurent Carle, karmozijn karmijn.
Climbing Mme Abel Chatenay, karmijnrose.

Climbing Mme Edouard Herriot, koraalrood.
Climbing Mme Jules Grolez, levendig rose.
Climbing Sunburst, oranjekleurig geel.

LAAGSTAMMIGE ROZESTRUIKEN.

DWERG POLYANTHA ROZELAARS (MINIATUURROZEN).

Zeer laag en volkomen herbloeiend, brengen deze overvloedige bloemtrossen met kleine bloempjes voort tot als het begint te vriezen. Mooie bloemperken en boordbedden. Vergen een goede beschutting aan den voet in den Winter. Kort snoeien.

Het honderd: fr. 220 00; tien stuks: fr. 25 00; het stuk: fr. 3 00.

Edith Cavell, karmozijn scharlaken.

Joseph Guy, levendig scharlaken; mildbl.

Juliana, teeder zalmkleurig.

Katharina Zeimet, roomkleurig wit.

Kirsten Poulsen, licht scharlaken.

Marie Pavie, rozig wit, mooi.

Mrs. Wm. H. Cutbusch, verzilverd rose.

Orange Perfection (1927), glanzend roodachtig oranjekleur; schoone vorm.

Orléans rose, geraniumrood.

Rödhätte, licht kersrood.

LAATSTE DWERG POLYANTHA ROZELAARS.

Gloria Mundi (1929), schitterend scharlaken oranjekleur; nieuwe tint, prachtig. Het st.: fr. 6 00

HERBLOEIENDE HYBRIDISCHE ROZELAARS (REMONTANT-ROZEN).

Goed volle geurige bloemen. Zeer gehard; de minste beschutting laat ze toe te weerstaan aan gure Winters. Daar hun groei-kracht buitengewoon is, is het verkieslijk ze af te zonderen. Om een overvloedigen bloei te bekomen snoeit men ze zeer lang en buigt men al de takken naar den grond, waaraan men ze met een haakje vasthecht. Deze takken bloeien op gansch hun lengte en vormen een prachtige struik.

Het honderd: fr. 220 00; tien stuks: fr. 25 00; het stuk: fr. 3 00.

Captain Christy, teer vleeschkleurig rose.

Frau Karl Druschki, koningin der sneeuw.

Général Jacqueminot, fluweelachtig rood.

Herinnering aan William Wood, granaatkl.

Mrs. John Laing, lilakleurig lichtrose.

Paul Néron, zuiver rose, reuzige bloem.

Pierre Notting, amarantpurper.

Prinses de Bearn, zwartpurper.

Ulrich Brünner, geraniumrood.

Van Houtte, rood, granaatkleurig getint.

HYBRIDISCHE THEEROLELAARS.

Groote, zeer talrijke bloemen, van de Lente af tot als het vriest. Ontstaan door kruising der theerolelaars en der hybridische, herbloeiende, zijn ze meer gehard dan de eerste, maar eischen nochtans, eenige vooral, een goed schutsel voor den Winter. Snoeien op 4, 5, 6 oogen en meer voor de zeer kloekke variëteiten.

Het honderd: fr. 220 00; tien stuks: fr. 25 00; het stuk: fr. 3 00.

Betty, koperkleurig rood met goud getint.

Betty Uprichard, glanzend zuiver rose.

British Queen, zuiver wit.

Caroline Testout, bolvormig, vleeschkl. rose.

Charles P. Kilham (1926), koraalrood.

Dame Edith Helen (1926), zuiver rose.

Eldorado (1923), goudgeel met rood getint.

Etoile de France, fluweelachtig donkerrood.

Frankrijk, zilverwit en lilakleurig rose.

General Mac Arthur, glanzend rood.

General superior Arnold Janssen, karmijn.

George Dickson, zwartrood. Zeer kloek: te kweeken als een hybridische herbloeiende.

Gloire de Hollande, levendig geraniumrood.

Golden Ophelia, bleek goudgeel.

Gorgeous, koperkleurig geel.

Hadley, glanzend donkerrood.

Herinnering aan H. A. Verschueren, oranje.

Jonkheer J.-L. Mock, zilverkleurig rose.

La Tosca, geschakeerd teeder rose.

Laurent Carle, karmozijn karmijn.

Madame Abel Chatenay, karmijnrose.

Madame Butterfly, karmijnrose.

Mme Jules Bouché, roomkleurig en rose.

Mme Jules Grolez, lev. rose; mildbloeiend.

Mme Léon Pain, verzilverd vleeschkleurig rose met oranje schakeering.

Mme M. de Luze, karmijnrose.

Mme Ravary, dikke oranjekleurige bloem.

Mme Segond-Weber, zalmkleurig rose.

Margaret Dickson Hamill, groote stroogeel bloem met karmijnrooden rand.

Mrs. Ch. Read, wit met rose schakeering.

Mrs. George Shawyer, zuiver rose.

Mrs. Henry Winnett, glanzend rood.

Mrs. T. Hillas, zuiver chroomgeel.

Mrs. Wallace Rowe, rozig lichtpaars.

Ophelia, rooskleurig zalmgeel.

Pharisaer, verzilverd rose; mooie knop

Prince de Bulgarie, zilverkleurig rose met zalmkleurige schakeering.

Red Star, vuurrood.

Sunstar, donker oranjegeel.

White Ophelia, wit met oranje midden.

LAATSTE HYBRIDISCHE THEEROEZELAARS.

Tien stuks: fr. 45 00; het stuk: fr. 5 00.

Europa (1928), zuiver donkerrose, wordt niet blauwachtig; zeer vol, houdt zich goed.**Helen Fox** (1928), groote goudgele bekervormige bloem; langwerpige knop.**Portadown** (1928), rijke donkerkarmozijnroode tint met fluwelachtigen weerschijs.**PERNETIANA ROZELAARS.**

Schitterende groep, alhoewel nog niet sedert lang bestaande. Zonderlinge kleuren: oranje- of koperkleurig, chroomgeel, koperkleurig rood, enz. Wij kweeken slechts geharde en mildbloeiende variëteiten. Beschut en snoel gelijk hybridische theerozelaars.

Het honderd: fr. 220 00; tien stuks: fr. 25 00; het stuk: fr. 3 00.

Angèle Pernet (1924), roodachtig oranje.**Beauté de Lyon**, koraalrood met gele schakeering. Zeer kloek: gekweekt als een herbloeiende hybridische.**Golden Emblem**, groote goudgele bloem.**Herinnering aan Claudius Pernet**, zongeel.**Herinnering aan George Beckwith**, garnaalrood met gele schakeering.**Herinnering aan Georges Pernet**, prachtig morgenroodkleurig met gele schaduwen.**Jozef Looymans zaliger**, abrikoosgeel.**Juliet**, donkerrose met goudgele buitenzijde.

Extra-kloek: gekweekt als herbl. hybrid.

Los Angeles, vuurrood, koraalkleurig getint.**Louise-Catherine Breslau**, koperkl. garnaalr^d.**Lyon-roos**, zalmkleurig garnaalrood.**Mme Alexandre Dreux**, goudgeel.**Mme Edouard Herriot**, koraalrood met gele schakeering.**Mme Henri Gravereaux**, koper- en bronskleurig geel.**Marguerite Amidieu du Clos**, donker boterbloemgeel.**Marie-Adélaïde**, prachtige donkeroranje.**Mevrouw G.-A. Van Rossem** (1926), goudgeel oranje en bronskleurig gevlamd.**Pax Labor**, groote bleekgoudgele bloem.**Shot Silk**, oranjekleurig kersrood.**Stad Parijs** (1925), oranjekleurig zonnegeel.**The Queen Alexandra Rose**, vermiljoen.**Wilhelm Kordes**, kapucijnrood en goudgeel.**Willowmere**, garnaalrood met gele schakeer.**LAATSTE PERNETIANA ROZELAARS.**

Tien stuks: fr. 45 00; het stuk: fr. 5 00.

Fancy (1928), perzikbloemrose met kersrood op gelen grond geschakeerd.**Jules Gaujard** (1928), groote schitterend saffloerroode, bekervormige bloem; nieuwe tint.**Lady Forteviot** (1928), goudgeel levendig abrikooskleurig getint; heerlijke geur.**Les Amis de Lille** (1928), roodachtig geel, punt en buitenzijde zalmkleurig rood.**M^{me} Henri Queuille** (1928), zeer levendig garnaalrood koperkleurig en vuurrood getint.

Polyantha rozen.



Heesters gedijen over 't algemeen in alle gronden en op alle standplaatsen. Zonnige plaatsen zal men bij voorkeur voorbehouden voor bloemdragende heesters.

HET SNOEIEN DER HEESTERGEWASSEN is zeer eenvoudig en laat zich samenvatten als volgt:

1. Slechts snoeien om het dood hout weg te nemen en om het evenwicht te behouden in den Winter: althaea, berberis, geitenblad, goudenregen, kernia, perelaar (Japansche), ribes, sumac, tamarisk;
2. Korter of langer snoeien volgens de plaats, die de struik moet innemen (in den Winter): eleagnus, eschdoorn negundo, hazelaar (purpere), kornoeljeboom, prunus pissardi, vlier;
3. Elken Winter zeer kort snoeien op eenige oogen van de basis: budleia, hydrangea, hypericum, spiraea's bumalda en callosa;
4. In den Zomer na den bloeitijd snoeien om het uitgebloeid hout te verwijderen en goed gestel te bekomen; daarna in den Winter de bossen dunnen: deutzia, forsythia, hortensia, sering (weinig), philadelphus (zeer weinig), spiraea Van Houttei, weigelia.

SIERHEESTERS MET AFVALLENDE BLADEREN.

	Hoogte van den volgroeiden heester	Tien	Stuk
Ahorn (eschdoorn) negundo, witgevekte. Schoone lichtkl. geblad.	1m50 à 3 m.	49 00	5 40
— (eschdoorn) negundo, geelgevekte. Mooie effecten in boschj.	1m50 à 3 m.	49 00	5 40
Althaea, 15 var. Mooie z. dikke bloemen op het einde v. d. Zomer	1m50 à 3 m.	49 00	5 40
Berberis vulgaris (Zuurdoorn) met purper blad. Gele bloemen.	1m50 à 3 m.	41 00	4 60
Budleia globosa. Blauwe aren in den Zomer; beschutte standplaats	2 m.	41 00	4 60
Deutzia crenata. Talrijke rose bloemen in Mei-Juni	1 à 2 m.	41 00	4 60
— Lemoinei, hybridische. Groote witte bloemen in Mei-Juni. . .	1 m. à 1m50	41 00	4 60
Eleagnus angustifolia, olijfwilg, zilverkleurig. Schoone vruchten .	3 à 4 m.	41 00	4 60
Forsythia fortunei. Mooie gele vroege bloemen, vóór de bladeren .	2 à 3 m.	41 00	4 60
Goudenregen, cytisus laburnum. Gele mooie trossen in Mei . . .	3 à 4 m.	41 00	4 60
Hazelaar, purpere: zie Vruchtboomen	2 à 3 m.	—	—
Hortensia Mme Mouillère. Wit; rozig oog. Belomm. standplaats .	0m75 à 1 m.	25 00	3 00
— Avalanche. Extra-zuiver wit, prachtig	0m75 à 1 m.	25 00	3 00
— La Marne. Karmijnachtig rose, zeer schoon	0m75 à 1 m.	25 00	3 00
— Otaksa compacta. Dikke roode schermbloemen	0m75 à 1 m.	25 00	3 00
Hydrangea paniculata (ristvorm. Hortensia). Dikke witte risten .	1 m.	45 00	5 00
Kerria japonica met dubbele bloem. Gele bloem in den Zomer . .	1 m. à 1m50	41 00	4 60
Kornoeljeboom, cornus mas, vruchtdragende. Roode vrucht. Hagen	3 à 4 m.	41 00	4 60
— van Siberië, witgevekte. Prachtig effect	1m50 à 2 m.	41 00	4 60
— goudgele van Spath. Rood hout, geelgevekte bladeren. . . .	1m50 à 3 m.	41 00	4 60
Perelaar, Japansche. Donkerroode schoone bloemen in April-Mei .	1 m. à 1m50	41 00	4 60
Philadelphus (Jasmijn of Sering), 10 var. Witte geur. bl. in Juni	2 à 3 m.	41 00	4 60
Prunus pissardi. Donkerpurper gebladerte, wonderschoon effect .	2 à 3 m.	64 00	7 00
— sinensis. Witte, dubbele vroege bloemen. Zeer mooi.	1 m. à 1m50	64 00	7 00
Ribes sanguineum. Trossen roode bloemen in 't begin van d. Zomer	1 à 2 m.	41 00	4 60
Sneeuwbal, Viburnum opulus. Witte bolvormige bl., begin Zomer .	2 à 3 m.	41 00	4 60
Spiraea Bumalda, Anthony Waterer. Talrijke rose bloem. Boord.	0m50	41 00	4 60
— callosa, witte. Boorden met talloze witte bloemen	0m50	41 00	4 60
— Van Houttei. Schoone variëteit. Witte bloemen	1 à 2 m.	41 00	4 60
Sumac fustet, Rhus Cotinus, pruikenboom. Z. mooi in Aug.-Sept.	3 à 4 m.	41 00	4 60
Syringa, met groote enkele en dubb. bloem. in de volg. variëteiten:	2 à 3 m.	—	12 00
Alphonse Lavallée, lilakl. dub.	Marie Legraye, wit, enkel.	»	—
La Tour d'Auvergne, rose.	M. de Vilmorin, azuurblauw.	»	—
Léon Simon, blauwacht., dub.	Michel Büchner, lilakl., dubb.	»	—
Mme Cas. Périer, roomkl., d.	President Grevy, blauw, dub.	»	—
Mme Lemoine, zuiv. wit, dub.	Sr de Louis Spath, purp., enk.	»	—
Syringa van Perzië, purpere. Lichtere, z. geurige tuilen(ontbreekt)	1m50 à 2 m.	—	—
Tamarisk met purpere bloemen. Donkerroode bloemen in Mei . .	2 à 3 m.	41 00	4 60
Vlier met goudgele bladeren. Zeer mooi. Uiterst kloek en gehard.	2 à 4 m.	41 00	4 60
Weigelia, 10 variëteiten. Talrijke mooie bloemen in Mei.	1 m. à 1m50	41 00	4 60

SIERHEESTERS MET BLIJVENDE BLADEREN.Hoogte van den
volgroeiden heester

Tien

Stuk

Heesters met blijvende bladeren vergen over 't algemeen een belommerde standplaats; slechts snoeien om er een regelmatig uitzicht of een kleineren vorm aan te geven.

Aucuba , Japansche. Groen blinkend wit gestippeld gebladerte.	0m50 a 1m50	74 00	8 00
Evonymus , Japansche (Kardinaalsmuts). Om af te zonderen.	0m60 a 1m50	79 00	8 50
— Japansche. Geelgevekt. Trage groei. Zeer mooi	0m60 a 1m50	79 00	8 50
Kerslaurier . Glanzend donkergroen gebladerte	1 a 2 m.	69 00	7 50
Liguster ovaalbladige. Glanzend groen gebladerte.	3 à 4 m.	35 00	4 00
— ovaalbladige. Geelgevekte. Goudgele, sierlijke heester.	1m50 a 3 m.	60 00	6 50
— ovaalbladige. Planten voor hagen. Het honderd: fr. 100 00	3 a 4 m.	12 60	—
Mahonia met huistbladeren. Z. sch. bladeren; gele bloemen in Mei	1 m. a 1m50	55 00	6 00
Palm voor boorden, vormt regelm. randen. Het honderd: fr. 24 00	laag	3 20	—
— goudgele, voor boorden. Glanz. geel, z. mooi. Het hond.: 40 00	id.	5 00	—
— goudgele, piramidevormige. Prachtig. Om af te zonderen.	1m50	—	15 00

HEESTERS VOOR HEIGROND.

Azalea mollis , met knoppen. Pracht. in de Lente. Zonnige standpl.	0m50 a 0m60.	89 00	9 50
Magnolia , met knoppen. Witte, groote bloemen in de 1 ^{ste} lentedagen (ontbreekt).		—	—
Rhododendrum , hybridische, met knoppen. Beschutte standplaats.	1m25 a 1m50.	—	25 00

RANKENDE EN KLIMMENDE HEESTERS.

Aristolochia siphon , v. priëlen, loofhutten, enz. Snelle groei zelfs in de schaduw.		—	13 00
Clematis , gewone blauwe (Viticella), kloek.		69 00	7 50
— gewone witte (Flammula), zeer mooi		69 00	7 50
— grootbloemige in de volgende variëteiten:		—	14 00

Daniel Derunda , violetachtig blauw.	Mme Le Coultre , zuiver wit, z. schoon.	—	—
Duchess of Edinburg , wit dubbel.	Nelly Moser , wit met lichtpaarse schak.	—	—
Fairy Queen , bleekrose, z. groote bloem.	Patens hybridische Sieboldii , blauw.	—	—
Jackmanni , donkerviolet. Mildbloeiend.	President , donkerblauwe heerl. bloem.	—	—
Lawsoniana , blauw, prachtig.	Proteus , purperrose.	—	—
Lilacina floribunda , purper lilakleurig.	Stad Lyon , prachtig karmijnrood.	—	—

Snoei alvorens te planten, onmiddellijk boven de wortels. Graaf vervolgens de plant in op een diepte van 4 a 5 cm. De Clematis vergt een lichten, doordringbaren grond.

Geiteblad van België .	Geiteblad van China , purper	64 00	7 00
— aureo-reticulata, geel, prachtig.	— Punicea, levendig rood	64 00	7 00
— semperflorens, altijdbloeiende.	— flava, goudgeel	64 00	7 00
Glycine van China , met blauwe bloem. Blauwe trossen in April-Mei; zeer kloek		—	16 00
— van China, met witte bloem. De glycines vergen een goede standplaats		—	16 00
Jasminum nudiflorum , met goudg. blad. Voor kleine muren. Bloeit einde Winter		60 00	6 50
Klimop van Ierland . Breedbladig. Snelle groei; hecht zich natuurlijk vast		55 00	6 00
— gevlekt. Zeer schoon gebladerte. Voor muren, boomstammen, rotsen		89 00	9 50
Polygonum baldschuanicum . Schoon gebladerte; groeit rap. Witte tuilen.		—	14 00
Wilde wijngaard (Ampelopsis), gewone. Voor priëlen, loofhutten, muren, enz.		41 00	4 60
— (Ampelopsis) Veitchii. Purper in den Herfst; hecht zich natuurlijk vast		41 00	4 60

SIERBOOMEN (HOOGSTAMMEN).

De wederaangroeiing dezer boomen is zeer onregelmatig. Zij moeten wel verzorgd worden.

	Stuk		Stuk
Acacia met rose bloemen	25 00	Lijsterbesseboom	20 00
Acacia inermis	25 00	Linde van Holland	30 00
Ahorn (eschdoorn), gevlekte	25 00	Populier van Italië	13 00
Hagedoorn met dubbele roode bloem	20 00	Treurwilg met geel hout	15 00



MOESKRUIDEN EN BLOEMPLANTEN

TWEEJARIGE MOESKRUIDEN.

Leverbaar van October tot in April.

U kunt deze planten heel wel zelf aankweken op zeer voordeelige wijze. Zaai dun rond 15 Augustus op een openluchtige, zonnige plaats: witte- en roodekool, savooiekool, bloemkool en winterlatuw. Verspeen een partij planten einde September in 15 cm. diepe voren op een onderlingen afstand van 50 cm. voor de koolplanten, op 30 cm. voor de latuwen. De andere verspeent men dicht naast elkander langs een haag of langs een muur, die niet in de zon staat. Aldus zult U van de eerste lentedagen af, kloeke, geharde en snel wederaangroeiende planten te uwer beschikking hebben.

	Hond.	Tien	Stuk
Bloemkool, Lenormand	10 00	—	—
Roodekool, dikke donkerroode	5 00	—	—
Savooiekool, vroege	5 00	—	—
Winterkroplatuw, Burgondische	5 00	—	—
Wittekool, Hollandsche	5 00	—	—

DOORLEVENDE MOESKRUIDEN.

Leverbaar van October tot in April.

In iederen tuin zou men, niet ver van de keuken, deze toekruidplanten moeten aantreffen, één of twee van elke soort, daar zij aan onze spijzen een zoo aangenaam prikkelenden smaak geven.

Fijn gehakte dragon en bieslook kruiden zoo heerlijk elke slasoort. Bij in azijn ingemaakte ajuinen en augurken mag venkel niet ontbreken. Marjolein is onmisbaar voor spekslagerswaren. Zonder pepermunt zou aal met groenselsaus voorbereid ons smakeloos toeschijnen. Bij labboonen en boonen past boonenkruid. Bij duiven is salie het geschikte toekruid. En aan groentesoep ontbreekt er iets, zoo men er geen laurierbladeren noch tijm bijgevoegd heeft.

Engelwortel om in te maken, maagdenzuring voor groentesoepen, rabarber voor moes of banketbakkerij komen wel te pas in elk huishouden.

	Hond.	Tien	Stuk
Bieslook. Om salade te kruiden	—	8 00	1 20
Boonenkruid. Toekruid voor labboonen en boonen	—	8 00	1 20
Citroenmelisse. Thee voor de maag. Hartsterkend en krampstillend	—	8 00	1 20
Dragon. Toekruid voor sla, saus, gehakt, ajuinen en augurken	—	16 00	2 00
Engelwortel. De bladribben eet men in suiker ingelegd	—	16 00	2 00
Hysop. Het aftreksel van de bloemen dient als maagversterkende drank	—	8 00	1 20
Laurier (saus-), in potjes. Gedroogde blad. onmisbaar voor groentesoep	—	—	4 00
Lavendel. Maakt het linnengoed geurig en verwijdt er de insecten van	—	12 00	1 60
Marjolein, doorlevende. Toekruid voor spekslagerswaren	—	8 00	1 20
Marrube, witte. Toekruid. Drank tegen den hoest	—	8 00	1 20
Pepermunt. Prikkelend en maagversterkend aftreksel	—	8 00	1 20
Rabarber, Victoria. Extra vroege	—	12 00	1 60
Salie. Toekruid voor duiven	—	8 00	1 20
Tijm. Toekruid voor vleesch, vleeschsoep, enz.	—	8 00	1 20
Venkel, doorlevende. Om ajuinen, augurken en sausen te kruiden	—	8 00	1 20
Zuring (maagden-). Schiet niet in 't zaad	—	8 00	1 20

PLANTEN VAN TWEEJARIGE BLOEMEN.

Leverbaar van October tot in April.

U kunt zelf deze bloemen zaaien in Juli. U zult de planten dicht bij elkaar op kweekbed planten om er in den Herfst uw perken mee te vullen. Wilt U ze gemakkelijker beschutten tegen gure koude, laat ze dan op kweekbed overwinteren en plant ze slechts in Februari-Maart. In dit geval bloeien ze niet zoo vroeg.

	Afstand	Hond.	Tien	Stuk
Myosotis alpestris, blauwe (Vergeet-mij-niet). Zeer lange bloei	20	22 00	3 00	—
Trosanjelier. Dianthus barbatus (Duizendschoon), in mengsel	40	22 00	3 00	—
Viola cornuta, blauwe	20	22 00	3 00	—
— lutea, gele	20	22 00	3 00	—
— van Munby, vroolijk licht blauw. Mildbloeiend (ontbreekt).	20	—	—	—
— grootbloemige Trimardeau met groote vlekken	25 a 30	36 00	4 60	—
— grootbloemige Bugnot met groote vlekken, extra	»	36 00	4 60	—
— grootbloemige in mengsel, groote bloemen, pracht. kleuren	»	36 00	4 60	—
Violier, gele. Cheiranthus Cheiri (Muurbloem). Dubbele. Geurig	25	27 00	3 50	—
— Cheiranthus, hybridische Allionii, oranjebl. Bl. in April-Mei	30	22 00	3 00	—
Zie ook al de doorlevende in de Lente bloeiende planten.	—	—	—	—

OVERBLIJVENDE BLOEMPLANTEN.

Leverbaar van October tot in April.

Wij hebben den bloeitijd en de hoogte van iedere plant aangewezen. De liefhebbers zullen hun bloemperken dusdanig kunnen samenstellen, wat hoogte en bloemenopbrengst betreft, dat het geheel het gansch jaar een schoonen aanblik biede. De hoogte der plant duidt over het algemeen den afstand aan op welken de planten moeten geplaatst worden.

ONTVANGST. — Als de planten toekomen, zal men ze, vóór of na de ontpakking, nooit aan een luchttocht, noch aan de zonnestralen blootstellen.

Men zal ze best niet te haastig in open lucht uitplanten, maar op volgende wijze behandelen:

Den grond van de wortels schudden; al de rotte deelen van wortels of takken afsnijden, voorloopig in lichte mestaarde uitplanten, onder raam, of wel op zulke wijze dat de planten gedurende eenige dagen tegen vorst, koude noordenwinden of zonnestralen beschut zijn; stilletjes aan zal men meer lucht geven tot op het oogenblik der planting.

Plant men vóór of gedurende den Winter, dan zal men op iedere plant een hoopje asch leggen, dat men bij de eerste schoone dagen wegneemt.

De planting vóór den Winter is feitelijk maar nuttig voor planten, die zoo in de volgende Lente reeds schoone bloemen kunnen voortbrengen. De andere overblijvende planten mogen vóór of na den Winter geplant worden.

Teedere planten nochtans, zooals Anemonen, Aster amellus, Gynierium of Pampasgras, Lychnis, Delphinium, Pyrethrum, enz., die veel door de verplanting lijden en meer zorgen vergen, zullen maar einde Maart ter plaats gezet worden.

	Hoogte	Bloeitijd	Hond.	Tien	Stuk
Achillea Eupatorium Parker. Schoon goudgele bloemen	60-70	Juli-Sept.	—	19 00	2 30
Aconitum Napellus, Venuswagen. Boordb., rotsen, lomm.	60-80	Juni-Juli	—	30 00	3 50
Althaea rosea Chater's, in prachtig mengsel.	2 m.-3 m.	Juli-Sept.	—	12 00	1 60
Aquilegia vulgaris, hybrid. Heerl. kleuren. Snijbloemen.	60-80	Mei-Juni	140 00	16 00	2 00
— Chrysantha, dubbele. Geel. Bevallig. Mildbloeiend	1 m.	Mei-Juli	140 00	16 00	2 00
Anemone japonica Honorine Jobert. Zuiver wit. . . .	40-60	Aug.-Sep.	—	30 00	3 50
— japonica Koningin Charlotte, halfdubb., lev. rose	»	»	—	30 00	3 50
Schoone plant voor Aug.-Sept. Bloeien in schaduw en zon.					
Anjelier, Pluimanjelier Her Majesty, dubb. rose. Boord	20-25	Mei-Juni	80 00	9 00	1 30
— Pluimanjelier Mrs. Sinkins, dubb. witte. Overheerl.	20-25	»	80 00	9 00	1 30
— Tuinanjelier, dubb. gemengd. Mildbloeiend. Gehard	50-60	Juni-Aug.	70 00	8 00	1 20



Overblijvende Gaillardia.
(Zie ook zaden n° 951, blz. 33.)

Grootbloemige Campanula Platycodon.

	Hoogte	Bloeitijd	Hond.	Tien	Stuk
Arabis Alpina, dubb. witte. Bloemen tot in den Zomer.	20-30	April	40 00	5 00	0 90
— Alpina, lichtpaarse. Zeer frisch.	»	»	40 00	5 00	0 90
— Alpina, met witgevekt gebladerte.	30	»	40 00	5 00	0 90
Mooie kruipende lenteplant, die tot in den Zomer bloeit.					
Asperula odorata, witte honiggevende bloemen. Gehard	20	Mei	40 00	5 00	0 90
Aster, pracht. verzameling, 15 variëteiten beschikbaar.	50-1 ^m 50	Juli-Oct.	90 00	11 00	1 50
— Amellus, lager en vroeger.	50-60	Aug.-Sep.	170 00	19 00	2 30
Asters gedijen wel in half lommer; zij brengen duizenden zeer schoone bloemen voort, die lang in water frisch blijven. Wij zenden de lijst der variëteiten op aanvraag.					
Astilbe Perle rose. Teeder rooskleurig	30-50	Mei-Aug.	—	25 00	3 00
— Diamant. Bijna zuiver wit	»	»	—	25 00	3 00
— Gunther. Prachtig rose	25-30	Apr.-Juli	—	25 00	3 00
— Rubin. Karmijnrood.	25-40	»	—	25 00	3 00
Gekweekt op boordbedden, in groepen op grasperken, bieden heerlijke effecten met hun lichte risten. Zij houden van half lom- mer. Zoo men in den Herfst eenige planten inpot en men ze binnenshuis teelt met geleidelijke verhooging van den warmte- graad, dan kan men ze gemakkelijk 's Winters doen bloeien.					
Bellis perennis monstrosa, dubbele witte, extra	10	M ^{rt} -Mei	27 00	3 50	0 70
— perennis monstrosa, dubbele roode, extra. Z. groot	»	»	27 00	3 50	0 70
Campanula capitata speciosa. Violette tuilen.	40-50	Mei-Juli	—	16 00	2 00
— Carpatia Isabel. Bossen blauwe bekertjes	30	Juli-Sep.	—	16 00	2 00
— Carpatia White Star met witte bloem.	»	»	—	16 00	2 00
— persicifolia, witte. Aren met kleine witte rozen	60-70	Juni-Aug.	—	16 00	2 00
— persicifolia, blauwe. Dezelfde aren in 't blauw.	»	»	—	16 00	2 00
— Platycodon, grootbloemige, blauwe en witte	60	Juli-Aug.	170 00	19 00	2 30
Campanula's zijn uitstekend geschikt voor bloemperken, snij- bloemen, enz., en gedijen goed in de schaduw.					
Coreopsis verticillata. Zeer fijn gebladerte. Gele bloem.	50-60	Juli-Aug.	—	16 00	2 00
Dahlia: zie verder.			—	—	—
Delphinium, doorlevende, hybridische, in mengsel.	80-1 ^m 50	Mei-Oct.	—	25 00	3 00
Lange prachtige witte, blauwe, violette aren, die op orchidee- twijgen gelijken. Bloemperken, boordbedden, snijbloemen.					
Dianthus: zie Anjelier.			—	—	—
Dielytra spectabilis. Mariatranen. Rozige trossen	50-70	Mei-Juni	—	35 00	4 00
Men zal de planten vroeger doen bloeien, zoo men ze in den Herfst inpot onder raam en ze rond het einde van den Winter binnenshuis plaatst.					
Digitalis, purperkleurige. Aren met gloxinia's bloemen.	1 ^m 40	Mei-Aug.	—	13 00	1 70
Men mengt ze met dahlia's in perken, waar ze in Juni-Juli zullen bloeien. Daarna zullen de dahlia's in bloei staan.					
Doronicum caucasicum. Gr. gele bloemen in de Lente.	1 m.	Mei	—	13 00	1 70
Erigeron mesa grande speciosus, met gr. blauwe bloem.	30-40	Juni-Oct.	—	13 00	1 70
Gelijkend op asters, maar minder hoog en grootere bloemen.					
Eryngium giganteum (edeldistel). Blauw. Droge tuilen	50-80	Juli-Aug.	—	45 00	5 00
Fuchsia coccinea, geharde. Bloemperken in de schaduw	50	Juni-Sep.	—	16 00	2 00
Ze 's Winters lichtjes beschutten onder een laag bladeren.					
Funkia bontgevekte. Z. mooie randen voor bloemperken	20-30	Juni-Aug.	110 00	13 00	1 70
Gaillardia met zeer gr. bloem. Bloeit gansch den Zomer.	40-60	Mei-Juli	110 00	13 00	1 70
Gladiolus: zie blz. 44.			—	—	—
Gynurium argenteum (reuzig pampasgras)	2 m.	Sep.-Nov.	—	—	6 00
— argenteum roseum	2 m.	»	—	—	6 00
De schoonste alleenstaande planten op grasperken en perspec- tieven. Prachtige zijdeachtige pluimbossen, die men droog bewaart. Voor den Winter bindt men de bladeren bundelvormig op; men bedekt deze met een strookap en beschut de basis met assche.					
Gypsophila paniculata, zeer fijne. Lichte tuilen	50-60	Juni-Aug.	80 00	9 00	1 30
— paniculata, dubbele	»	»	—	45 00	5 00
Prachtige risten witte bloemen. Wonderschoone droge tuilen.					
Helenium, schoon goudgeel.	60	Juli-Aug.	—	13 00	1 70
Helianthus rigidus, grootbloemige. Doorl. zonnebloem	1 m.	Aug.-Oct.	—	13 00	1 70
Hemerocallis aurantiaca. Dikke donkeroranje kl. bloem.	60	Mei-Sep ^t .	—	16 00	2 00
— flava. Dikke, zeer welriekende gele bloemen.	»	»	—	16 00	2 00
Hesperis matronalis, dubbele witte. Rozig witte tuilen	»	Mei-Juli	—	20 00	2 50

	Hoogte	Bloeitijd	Hond.	Tien	Stuk
Heuchera , in mengsel. Lichte roode trossen. Randen.	50	Juni-Juli	—	13 00	1 70
Hoteia (astilbe) japonica , rozig wit	40-50	Apr.-Juli	—	35 00	4 00
— (astilbe) hybridische, Peach Blossom, bleek rose	»	»	—	35 00	4 00
Gelijken heel wel op astilbes. Mooie planten, gemakkelijk in potten te kweken. Aan liefhebbers van schoone planten bevelen wij aan: Astilbes, Hoteia's, Spiraea's. Frissche, belommerde standplaats.					
Iris : zie verder.	—	—	—	—	—
Lavendel : zie doorlevende moeskruidplanten, blz. 56.	—	—	—	—	—
Lelie : zie blz. 44.	—	—	—	—	—
Leucanthemum , met zeer breede bloem Ster van Antwerpen	50-60	Juni-Juli	—	13 00	1 70
— met zeer breede bloem Prinses Henri	»	»	—	13 00	1 70
— met zeer breede bloem Shasta Daisy Westralia	»	»	—	13 00	1 70
Deze groote witte margarieten, zoo kostbaar voor ruikers, bereiken een diameter van 10 cm. Prachtige bossen. Men zal ze ieder jaar in April stekken om zeer breede bloemen te bekomen.					
Lupinus polyphyllus , doorl. Heerl. aren. Boordbedden	70-1m50	Juni-Aug.	—	13 00	1 70
Lychnis viscaria , rose dubb. Boordb., tulen. Prachtig (ontbreekt)	—	Mei-Juli	—	—	—
Lysimachia verticillata . Kleine twijgen met gele bloem.	50	Mei-Juli	—	16 00	2 00
Madeliefje : zie Bellis.	—	—	—	—	—
Montbretia : zie blz. 44.	—	—	—	—	—
Paeonia sinensis (pioenroos). Pracht. mengs. met nam ⁿ	1 m.	Juni-Juli	—	35 00	4 00
Papaver orientale hybr. grootbloem. Klaproos. Stutten.	60-80	Mei-Juli	—	25 00	3 00
Prachtige plant voor boordbedden. Schoon sierraad voor groote vazen. Houdt van voedzamen grond en zonnige standplaats.					
Phlox , hybridische der tuinen. Variëteiten met namen	40-80	Juni-Sep.	270 00	30 00	3 50
Talrijke, groote, zeer gevarieerde en rijk gekleurde tulen. Prachtige plant voor boordbedden, perken. Zeer schoon als randen voor heestergroepen. Allerprachtigste snijbloem. Wij zenden de lijst der variëteiten op aanvraag.					
Physalis franchetti . Kleine roode ballons om te bewaren	30-40	Aug.-Nov.	100 00	12 00	1 60
Potentilla grootbl. dubbele gemengd. Koperkleur. tinten	20-30	Juni-Juli	180 00	20 00	2 50
Primula auricula , gemengd. Schoone randen en potten.	10-15	Apr.-Mei	—	12 00	1 60
— veris, gemengd. Bloemtuiltjes in de Lente.	10-20	Mrt.-Mei	50 00	6 00	1 00
Houdt van frissche standplaats en half lommer. Mildbloeiend.					
Pyrethrum hybridische, met enkele bloem, gemengd.	50-70	Mei-Oct.	—	41 00	4 60
— hybridische met dubbele bloem, gemengd.	»	»	—	41 00	4 60
Zeer schoone duurzame snijbloem. De stengels na het uitbloeien afsnijden en regelmatig begieten om een tweeden bloei te bekomen.					
Rudbeckia purpurea . Groote roode margariet	80	Juli-Oct.	140 00	16 00	2 00
— speciosa Newmanni. Geel met zwart midden	60-70	»	—	16 00	2 00
Saxifraga hypnoides , Turksch gazon. Witte bloemen.	5-10	Mei-Juni	50 00	6 00	1 00
— umbrosa, Schildersverdriet. Randen.	20-30	Mei-Juli	40 00	5 00	0 90
— crassifolia met roze bloemen. Perken, rotsen	15-25	Mrt.-April	140 00	16 00	2 00



Dahlia Andrie's Middagzon.

Dahlia Royal Pink.

Twee schoone Dahlia's, nieuwigheden.

	Hoogte	Bloeitijd.	Hond.	Tien	Stuk
<i>Sedum maximum atropurpureum</i> . Vleezige purp. blad.	30	Aug.-Sep.	140 00	16 00	2 00
— <i>roseum</i> . Vleezige, blauwgroene blad.; gele bloem.	»	»	140 00	16 00	2 00
— <i>spectabile atropurpureum</i> . Blauwgr. blad. Rose bl.	»	»	140 00	16 00	2 00
— <i>spectabile</i> , glanzende. Donkerder bloemen . . .	»	»	140 00	16 00	2 00
<i>Solidago Virga-aurea</i> . Groote goudgele garven. Gehard	50-60	Juni-Sep.	—	12 00	1 60
<i>Spergula pilifera</i> , <i>Sagina</i> . Fijn gazon met witte bloemen	4 5	Mei-Aug.	60 00	7 00	1 10
<i>Spiraea aruncus</i> . Geitebaard. Groote witte pluimbossen	1 m.	Mei-Juli	—	45 00	5 00
Alleenstaand, of in groepen op grasperken, of verspreid in heestergroepen scheppen deze pluimbossen prachtige effecten.					
<i>Spiraea venusta rosea</i> . Purperrose, merkwaardig . . .	60-90	Juni-Juli	—	16 00	2 00
<i>Stachys lanata</i> . Zilverkleurige rand voor rozenperken .	20-30	Juni-Aug.	50 00	6 00	1 00
<i>Statice armeria purpurea</i> , Spaansch gazon. Randen . .	20-25	Mei-Juli	50 00	6 00	1 00
— <i>latifolia</i> . Groote prachtige staalblauwe risten . .	50-60	Juli-Sept.	—	16 00	2 00
— <i>tartarica</i> . Roodachtig rose	25-30	»	—	16 00	2 00
— <i>incana</i> , hybridische. Rozig en lilakleurig wit . . .	30-35	»	—	16 00	2 00
Reuzlge, zeer fijne, zeer moede risten gezocht voor tuilen. Gedroogd kunnen zij den heelen Winter bewaard worden.					
Stokviolier: zie <i>Hesperis</i> .		—	—	—	—
<i>Tritoma uvaria grandiflora</i> . Hooge oranjekleurige aren	80-1 ^m 20	Juli-Oct.	—	12 00	1 60
<i>Trollius europaeus</i> Fire Globe. Dikke dubb. gele bloem.	30-40	Mei-Juni	—	45 00	5 00
<i>Valeriana</i> der tuinen, in mengsel. Mildbloeiend. . . .	50-60	Juni-Oct.	—	16 00	2 00
<i>Varen asplenium filix mas cristata</i> (mannetjes-varen) .	75	—	—	74 00	8 00
— <i>osmunda regalis cristata</i> (koninklijke varen) . . .	»	—	—	74 00	8 00
— <i>struthiopteris germanica</i> . Rotsw., boschbod., enz.	»	—	—	74 00	8 00
<i>Veronica Hendersonii</i> . Groote donkerblauwe aren. . .	60	Juni-Juli	—	12 00	1 60
<i>Vinca</i> , groote. Blauw. Bed. den grond zelfs in de schad.	30-40	Mei-Juni	—	20 00	2 50
— met bontgeklekte bladeren. Rotswerk, hellingen (ontbreekt)		»	—	—	—
<i>Viola</i> witte doorlevende. Overheerlijk (ontbreekt). . .	10-15	Mei-Oct.	—	—	—
— donkerblauwe doorlev. Bloeit gansch het jaar . . .	»	»	90 00	11 00	1 50
— lichtblauwe doorlevende. Prachtige tint	»	»	90 00	11 00	1 50
— gele doorlevende. Bloeit gansch het jaar	»	»	90 00	11 00	1 50
— <i>odorata</i> (viooltje). <i>Princesse de Galles</i> . Lichtblauw	15 ^m	Mrt-Oct.	50 00	6 00	1 00
— <i>odorata</i> Rawson White. Mildbloeiend, zuiver wit.	»	»	50 00	6 00	1 00
— <i>odorata</i> van Parma. Dubbel, blauw, sterke geur .	»	»	100 00	12 00	1 60
Randen in half lommer, te vernieuwen om de twee jaar door middel van aangewortelde uitloopers. Ze zullen vroeger bloeien, als men ze met een raam bedekt in Januari.					
<i>Yucca filamentosa</i> . Hooge stengels met witte klokjes. .	1 m.	Juni-Oct.	—	25 00	3 00

DAHLIA'S.

Wij zenden de lijst der variëteiten op aanvraag.

<i>Dahlia</i> , dubb. met cactusbloem. Variëteiten met namen	1 ^m 25	Aug.-Oct.	—	30 00	3 50
— sierlijke dubbele met cactusbloem, met namen. .	»	»	—	30 00	3 50

DAHLIA'S (NIEUWIGHEDEN)

<i>Andrie's Middagzon</i> (cactus). Volmaakte lichtgele bloem.					
Lakroodrandige kroonbladeren. Stijve stengel . . .	1 ^m 25	Aug.-Oct.	—	55 00	6 00
<i>Royal Pink</i> (cactus, sierlijke). Prachtige zeer teer lila-kleurig rose bloem op langen stijven stengel	»	»	—	55 00	6 00

IRIS.

<i>Iris pumila</i> (lage). Vroege bloei. Schoone randen . . .	20-25	Mrt-Mei	100 00	12 00	1 60
— <i>Germanica</i> of der tuinen, 20 var. met namen . .	60-1 m.	Mei-Juni	100 00	12 00	1 60

Heerlijke bloemen in alle schakeeringen: tweekleurig of gevlekt. Wij zenden de lijst der variëteiten op aanvraag.

<i>Iris Kaempferi</i> , in mengsel	80-1 m.	Juni-Juli	—	25 00	3 00
--	---------	-----------	---	-------	------

Groote dikwijls éénkleurige bloemen, goudgeel gestreept aan de basis. Frissche grond of goede laag stroomest en dikwijls begieten.



PLANTEN LEVERBAAR IN MAART

AARDBEZIËN

ONTVANGST. — Zijn de aardbezieplanten bij droog weder verzonden, pak ze dan onmiddellijk uit en laat de wortels eenige uren in water liggen; plant ze daarna in een vast aangedrukten grond. Zijn de planten volkomen verwekt, plant ze dan op kweekbed, belommer ze, begiet ze dikwijls en plant ze slechts ter plaatse, als ze nieuwe wortels gevormd hebben.

MESTSTOFFEN. — Meer dan andere planten nog vergt de aardbezie een vruchtbaren grond. Ook eischt zij zeer veel meststoffen. Elk jaar zal men vroegtijdig per m² een mengsel van 40 gr. sodanitraat, 50 gr. superfosfaat, 20 gr. potaschsulfaat in den grond inwerken. Om dikke vruchten te bekomen zal men van tijd tot tijd met vloeimeststoffen begieten. Al te dikwijls gebruikt men daartoe beer of aalt; om gezondheidsredenen is het verkieslijk deze te vervangen door onze geconcentreerde meststof.

Kalk, in kleine hoeveelheid aan de aardbeziën toegediend, maakt dat de vruchten dik en sappig worden.

OM DIKE VRUCHTEN TE BEKOMEN plant men de aardbeziën op een openluchtige plaats op een afstand van 60 cm. tusschen de lijnen, van 30 a 35 cm. in de lijnen, in een goed omgewerkten, wel bemesten, verbeterden grond. Spreid na den bloei een laag stroomest tusschen de planten uit. Neem alle uitloopers weg en behoud op elken stengel slechts 5 of 6 bloemen. Begiet dikwijls met onze geconcentreerde meststof (zie blz. 41).

Het aardbeziebed moet om de drie jaren vernieuwd worden. De maand September is het geschiktste tijdstip om aardbeziën te planten.

Leverbaar in September-October en in Maart-April.

1. VOOR EERSTE SEIZOEN.

Noble (Laxton). Dik, geurig, uitstekend. Zeer vroeg, veel opbrengend . . .	30 00	4 00	—
Professor Burvenich. Zeer dik. Droge gronden. Zeer vroeg, kloek, vruchtb. . .	30 00	4 00	—
Louis Vilmorin. Klein, sappig, geurig. Vroeg, nogal kloek, vruchtbaar . . .	30 00	4 00	—

2. VOOR TWEEDE SEIZOEN.

Madame Moutot (tomaat aardbezie). Zeer groot. Lekker. Voor de markt . . .	30 00	4 00	—
Jucunda. Dikke sappige uitstekende vrucht. Extra kloek. Voor handel . . .	30 00	4 00	—
Docter Nicaise. Monsterachtige vrucht. Lekker, bleekrood vleesch	30 00	4 00	—
Saint-Lambert. Luiksche var. Schoon, dik, zwartrood, lekker (ontbreekt) . .	—	—	—
Stad Caen. Zeer dikke, vuurroode vrucht. Vast, zeer zoet vleesch	30 00	4 00	—

3. HERBLOEIENDE OF TWEEMAALDRAGENDE.

Om een maximum opbrengst na den tweeden bloei te bekomen, moet men afzien van den eersten oogst en de knoppen wegnemen, die in Mei-Juni verschijnen.

Merveille de France (Wonder van Frankrijk). Z.groot. Z.vast vleesch (ontbr.) . . .	—	—	—
Asperge, vroege dikke van Argenteuil. Kloeke pl. Leverb. vanaf 15 Maart . .	36 00	4 60	0 80
Ben uitvoerige teeltaanwijzing wordt bij elke zending van planten gevoegd.			
Zeekool (Crambe maritima). Leverbaar vanaf 25 Maart (ontbreekt)	—	—	—



Aardbezie Madame Moutot.



PLANTEN LEVERBAAR IN MEI

Onze klanten zullen op de volgende bladzijde de weinige soorten vinden, die tamelijk goed bestand zijn tegen vervoer en waarvan wij hun gezonde, gedrongen planten kunnen leveren, voorzien van een goed ontwikkeld haarwortelgestel. Deze planten worden verzonden, zoodra ze goed zijn om te verpoten en volgens orde van ontvangst der bestellingen.

De tijdstippen voor het leveren der planten kunnen wij slechts bij benadering aangeven; eenige weken slecht weder kunnen den groei der planten aanmerkelijk vertragen. Dikwijls zijn wij zelfs verplicht verscheidene achtereenvolgende verzendingen te doen, als sommige planten reeds goed zijn om te verpoten, terwijl andere nog veel zorg vereischen. Wij bejveren ons natuurlijk om die bijkomende onkosten tot een minimum te herleiden.

Soms worden de in Mei verzonden planten door hitte verrast; in dit geval kunnen wij niet waarborgen, dat zij in goeden staat zullen ontvangen worden.

ZAAI ZELF AL DE PLANTEN DIE U NOODIG HEBT.

Het ware verkieslijk, dat ieder liefhebber zelf de planten zaaid, die hij zal moeten verpoten. Zonder daartoe bijzonder ingericht te zijn, zonder veel werk en zonder over veel plaats te beschikken, kan iedereen hierin slagen en alzoo een niet te onderschatten besparing doen, terwijl hij tevens zeker is heel frissche planten te hebben, die zeer gemakkelijk zullen aangroeien.

MOESKRUIDPLANTEN.

Zaai heel in het begin van Maart op kweekbed en tevens zombod (strook grond langs een haag of een muur die in 't Zuiden liggen): lentekropkool, savoiekkool, witte- en roodekool. Zaai ook op broeibed of in kistjes: bloemkool, porei, selderij, tomaten. Plaats de kistjes in de keuken tot na de ontkieming; breng ze dan buiten, als het niet vriest, om de planten geleidelijk aan de buitenlucht te gewennen. Verspeu ze, als ze eenige blaadjes hebben, een eerste maal in kistjes. Aldus zult U rond 15 Mei over een keur van schoone planten beschikken.

Verplant uw tomaten langs een wel gelegen muur of op een beschut boordbed. U zult ze kweken als dubbel rechtgaand snoer met twee bloemtrossen op elken tak of wel als enkel rechtgaand snoer met drie bloemtrossen. Nijp in op een of twee bladeren boven den laatsten tros. Neem de nuttelooze zijvertakkingen weg boven elken tros, alsook de okselstandige scheuten.

Zaai einde Maart-April op kweekbed in vollen grond: groene bladerkool en Brusselsche spruitkool, die U rond 15 Juni tusschen vroege aardappelen zult verplanten. Doe ook een tweede zaaiing late porei (om te laten overwinteren) en verpoot ze einde Mei-Juni.

Zaai ook einde Mei-Juni op kweekbed in vollen grond: gekrulde en ongekrulde andijvie en zomerkropsalade. Deze groenten zullen gereed zijn om te verplanten, wanneer uw bedden sjalotten, labboonen, lenteerwt en vroege aardappelen zullen beschikbaar worden.

BLOEMPLANTEN.

ZAAIING TER PLAATSE. — Alvorens U te spreken over de pootplanten, moeten wij eerst een woordje zeggen over de schoone éénjarige planten, die men ter plaatse kan zaaien en die, onbekend aan vele liefhebbers, nochtans een kostbaar hulpmiddel uitmaken voor het versieren onzer tuinen.

Deze zaaiingen doet men uit volle hand, in perken, waarvan men den grond van teelaarde voorzien en goed losgemaakt heeft. Dek de zaden heel lichtjes, vooral de zeer fijne. Begiet in geval van droogte.

Zaai in volle zon: Chrysanthemum met rand: Phacelia; Convolvulus tricolor met rand: Portulaca; Delphinium (éénjarige) met rand: witte Thlaspi; Lupinus annuus met rand: Tropaeolum majus nanum Empress of India; Malope met rand: Alyssum maritimum; Salpiglossis met rand: Phacelia.

In de zon of in half lommer zonder onderscheid: Calendula met rand: Nemophila; Clarkia met rand: Nigella; Coréopsis met rand: lage Godetia Whitney; Cosmos met rand: Hesperis Mahon.

Eindelijk, vooral in half lommer, zult U Mirabilis Jalapa zaaien met rand: Asperula azurea. Al deze bloemen zult U vinden in de alphabetische naamlijst der bloemzaden, blz. 31 a 40.

POOTPLANTEN. — De bloemen, die men kan zaaien om in Mei-Juni te verplanten, zijn talrijk. U zult op warme broeilaag zaaien of in kistjes, zooals hierboven aangeduid.

In Januari-Februari zult U aldus zaaien: Margariet Anjelier (Dianthus) en Altijddurende reuzige Anjelier Chabaud.

Einde Februari-Maart zult U eenige der volgende soorten zaaien: Antirrhinums, Celosia cristata, Celosia plumosa, Cineraria maritima, Cobaea, Dahlia (enkele lage), Helichrysum, Lobelia erinus, Nicotiana's, Pentstemon, Perilla, Petunia's, Phlox Drummondii, Verbena's (hybridische en venosa), Zomerviolier.

Einde Maart nog in kistjes: Chineesche Anjelieren, Chineesche Asters, Balsamieren, Dimorphoteca, Helichrysum, Kochia, Tagetes en Zinnia's. In April in vollen grond: Pyrethrums.

Ziehier een keur voor bloemperken in zonnige ligging:

Bloemperk met:	Anjelier (Dianthus) Chineesche	en rand: Pyrethrum of Cineraria maritima.
»	Anjelier (Margariet en altijddurende)	» Tagetes patula.
»	Antirrhinum nanum	» Lobelia erinus.
»	Balsamieren of Celosia Plumosa	» Cineraria maritima.
»	Celosia cristata	» Pyrethrum.
»	Chineesche Asters of Zomerviolier	» Tagetes Patula.
»	Dahlia (enkele, lage)	» dubbele van Tagetes signata.
»	Helichrysum of Antirrhinum majus	» Tagetes signata.
»	Pentstemon of Nicotiana	» Perilla.
»	Petunia of Phlox Drummondii	» dubbele: Lobelia en Pyrethrum.
»	Verbena (hybridische)	» dubbele: Lobelia en Pyrethrum.
»	Verbena venosa of Zinnia	» Tagetes patula.

In half-lommer zult U planten: Antirrhinum majus met rand: Antirrhinum majus nanum; Zomerviolier met rand: Tagetes patula; Verbena (hybridische of venosa) met rand: Tagetes patula.

In uw bakken en potten zult U in Mei-Juni, in de zon verplanten: Anjelieren, Chineesche Asters, Zomerviolier, Kochia, Lobelia erinus, Petunia's, Verbena's en Zinnia's. In half lommer: Zomerviolier, Kochia en Verbena's. Benuttig eindelijk als klimplant de Cobaea, in alle standplaatsen, in bakken of in vollen grond.

STEKKEN. — Eenige planten bloeien slechts goed, als men ze door stekken vermenigvuldigt. De liefhebber kan ze moeilijk aankweken, doch wij kunnen ze hem leveren.

In volle zon zal men teilen: Herbloeivende Anjelier met rand: Tagetes patula; Begonia semperflorens met rand: Ageratum; Geranium voor perken en rankende Geranium met rand: Cineraria maritima; Heliotropium met rand: Tagetes patula; Salvia met dubbelen rand: Lobelia en Pyrethrum. In half lommer: Begonia semperflorens en vooral Fuchsia. In de schaduw: Fuchsia.

Al deze planten kan men tevens in potten, bakken, vazen kweken op dezelfde standplaats. Voor hangende vazen zijn rankende Geraniums zonder weerga. Eindelijk mogen Fuchsia's, Geraniums in potten en Heliotropiums onder de schoonste kamerplanten gerekend worden.

MOESKRUIDPLANTEN.

	Hond.	Tien	Stuk
Bloemkool, leverbaar van einde Mei tot Augustus	8 00	—	—
Koolen, leverbaar in Mei-Juni, in de volgende variëteiten:	5 00	—	—
Brusselsche halfhooge spruitkool. Winterkool, groene met scheuten.	—	—	—
Rodekool. Winterkrulkool met korten stam.	—	—	—
Savooiekool, vroege. Wittekool.	—	—	—
Savooiekool van Aubervilliers. Wittekool suikerbrood.	—	—	—
Poreiplanten, leverbaar van begin Juni tot einde Juli	5 00	—	—
Raapselderij, Erfürter, met bolvormige wortel. Leverbaar einde Mei-Juni.	7 00	—	—
Selderij, volstelige korte vroege witte. Leverbaar einde Mei-Juni	7 00	—	—
— volstelige goudgele Chemin. Leverbaar einde Mei-Juni.	7 00	—	—
Struikselderij, fijne voor groentesoep. Leverbaar einde Mei-Juni	7 00	—	—
Tomaten, sterke planten met kluit. Leverbaar einde April-Mei	45 00	5 00	—

BLOEMPLANTEN. Leverbaar van 15 Mei af.

	Afstand	Hond.	Tien	Stuk
Ageratum, lage blauwe Mexikaansche. Stekken. Voor randen	15	27 00	3 50	—
Anjelier, Chineesche Heddewigii, dubbele, met groote bloem	25 a 30	24 00	3 20	—
— tuinanjelier, altijddur. reuzige dubb. (Chabaud), gemengd	25 a 30	60 00	7 00	1 10
Antirrhinum majus, gemengd. Gedijs op elke standplaats	35 a 40	20 00	2 80	—
Aster, Chineesche Mammouth, uitm. var. Bloemperken in de zon	25 a 30	24 00	3 20	—
— Chineesche, Kommet, halfhooge, gemengd	25 a 30	24 00	3 20	—
— Chineesche, Struisveder, zuiver witte, z. bevallige bloemen	»	24 00	3 20	—
— Chineesche, Unicum (electric), schoon effect	»	24 00	3 20	—
Begonia semperflorens gracilis rose, met kluit. Randen, figuren	20	50 00	6 00	1 00
— semperflorens luminosa roode, met kluit. Voor elke standpl.	»	50 00	6 00	1 00
Canna, bloemdragende, ras Crozy, in den groei. Verz. met nam.	50 a 60	—	30 00	3 50
— bloemdragende met purpere blad. Verzamel. met namen	»	—	30 00	3 50
Cobaea scandens, gestut met kluit. Klimt tot een hoogte van 6 m.	—	100 00	12 00	1 60
Cosmos hybridische, grootbl., gevar. Rose en witte margarieten	40 a 50	24 00	3 20	—
Dahlia, dubbele met cactusbloem. Stekken, met namen	1 ^m 50	—	20 00	2 50
— dubbele met cactusbloem, sierlijke. Stekken met namen	1 ^m 50	—	20 00	2 50
Dianthus: zie Anjelier.				
Fuchsia globosa, hybrid., voor perken in halflofm., potten, enz.	35 a 40	100 00	12 00	1 60
Geranium voor perken, roode. Voor perken en potten in de zon	35 a 40	160 00	18 00	2 20
— voor perken, rose. Mooie tegenstellingen met de roode	»	160 00	18 00	2 20
— voor perken, witte. Past goed bij de vorige.	»	160 00	18 00	2 20
— voor perken, zalmkleurige. Zeer mooie tint.	»	160 00	18 00	2 20
— peltatum (rankende), rose. Prachtige hang. vazen in de zon	»	160 00	18 00	2 20
— peltatum (rankende) in sch. mengsel. Overhangend, z. mooi	»	160 00	18 00	2 20
— voor potten. Schoone kamerplanten, overheerlijke kleuren	»	—	20 00	2 50
Heliotropium (stekken). Schoone perken, potten. Zoete geur	35 a 40	100 00	12 00	1 60
Lobelia erinus Crystal Palace, lage, blauwe. Randen, tapijten	15	24 00	3 20	—
Nemesia strumosa, lage, gedrongen, gevar. Schitterende bossen	20 a 25	30 00	4 00	—
Perilla van Nanking, met zwartpurper geblad. Randen, perken	20	20 00	2 80	—
Petunia, hybr. in sch. mengsel. Perken, potten, hangende vazen.	20	24 00	3 20	—
— hybridische grootbloemige. Zeer groote golvende bloemen.	»	40 00	5 00	—
Phlox Drummondii, grootbloemige, gemengd. Mooie tuilen.	20	24 00	3 20	—
Pyrethrum parthenium, goudgele. De schoonste boordbedden.	15	20 00	2 80	—
Salvia splendens, Salie (stekken). Lange vuurroode aren.	30 a 35	120 00	14 00	1 80
Tagetes patula, Eerekruis, Boordbedden, randen	25 a 30	20 00	2 80	—
Verbena, hybridische of der tuinen, goede planten. Mooie perken	40 a 45	24 00	3 20	—
Zinnia sierlijke dubbele, gemengd. Droge gronden. Volle zon	35	24 00	3 20	—
Bloembollen die in den Zomer bloeien, zie blz. 44	—	—	—	—
Doorlevende planten die in den Zomer bloeien, zie blz. 57 a 60.	—	—	—	—

CHRYSANTHEMUMS. Leverbaar van 1 Mei af.

Chrysanthemum Japonicum met dikke buisvorm., gewrongen, los verwarde bloemen, in zeer schoone variëteiten naar onze keus, sterke stekken	150 00	17 00	2 10
Chrysanthemum met kleine bloemen. Voor Allerheiligen. Sterke stekken	110 00	13 00	1 70
— Indicum, dubb. doorlevend. Mooie pompons. Bloeit gansch den Zomer.	110 00	13 00	1 70

VERKOOPVOORWAARDEN.

BESTELLINGEN. — De personen, die ons met hun vertrouwen zullen vereeren, worden verzocht hun bestellingen zoohaast mogelijk te zenden en niet te wachten tot zij de zaden of planten gebruiken moeten.

Onze klanten zullen zorg dragen op hun bestellijst hun namen en volledig adres nauwkeurig in te schrijven met aanduiding van station, spoorweg of buurtspoorweg, die hun woonplaats bedienen. Deze opgave is onontbeerlijk. Wat de zaden betreft, is het voldoende naast de volgnummers der bestellijst de te leveren hoeveelheden in te schrijven zonder af te wijken van de in de kolommen van den catalogus opgegeven gewichten of van de veelvouden dier gewichten, daar deze ondeelbaar zijn.

Behoudens tegenaanwijzing vervangen wij de niet meer voorhanden variëteiten door andere dergelijke. Wij vereenigen altijd in één enkele zending de bestellingen die men ons onder denzelfden omslag toestuurt, tenzij de klant uitdrukkelijk de verzending aan elken bestemming vraagt.

PRIJZEN. — Onze prijzen worden aangegeven, met voorbehoud van verandering en zonder verbintenis, voor waren te Statte op spoorwagen geladen. Kosten en risico vallen dus den bestemming ten laste.

De prijs voor 100 kilo is toepasselijk op de bestellingen van ten minste 5 kilo van dezelfde variëteit; de prijs per kilo, behoudens tegenaanwijzing, is toepasselijk op bestellingen van ten minste 250 gr.; eindelijk, de prijs per 100 gr. op die van minder dan 250 gr.

De 100-prijs wordt berekend voor de bestellingen van minstens 25 stuks; de 10-prijs, behoudens tegenopgave, voor de bestellingen van minstens 5 stuks.

De overdrachtaks en de kosten van factuur- en kwijtschriftzegels zijn ten laste onzer klanten en worden op hun rekening gebracht.

VERPAKKINGEN. — Het pakmaterieel wordt tegen kostenden prijs in rekening gebracht, en wordt niet teruggenomen.

BETALINGEN. — De personen, met welke wij geen voortdurende handelsbetrekkingen hebben, worden verzocht ons het nabijkomend bedrag hunner bestelling tegelijk met deze te sturen: indien de gestorte som het bedrag der levering overtreft, zal hun het saldo bij het regelen onzer rekeningen, in den Zomer, teruggezonden worden. Zij mogen ons ook order geven te verzenden tegen terugbetaling.

Onze gewone klanten zullen, na de ontvangst onzer rekening, zoo goed zijn het bedrag er van op een postkantoor te storten op krediet van onze postcheckrekening n° 137.

BORGSTELLING. — De uitmuntende kiemkracht onzer zaden, de soortzuiverheid en de nauwkeurige benaming er van wijden wij onze beste zorgen. De klachten, al worden ze in principe niet aangenomen, worden nochtans zorgvuldig onderzocht, zonder dat ooit een vergoeding het rekeningsbedrag van het in aanmerking komend artikel moge overtreffen.

Evenzoo dragen wij er de grootste zorg voor boomen, struiken, enz. te leveren van allereerste hoedanigheid, en derwijze ingepakt, dat zij zonder schade kunnen vervoerd worden. Het is ons, natuurlijk, onmogelijk er de wederaangroeiing van te waarborgen. Vooreerst is er natuurlijk bij iedere verplanting een risico: de plant moet een aanmerkelijke krachtsinspanning doen om haar groei te hernemen en slaagt er niet altijd in. Zelfs als de wederaangroeiing begonnen is met benutting van het voorradige sap, is de plant soms niet in staat nieuwe krachten uit den grond te putten: dan ziet men ze plotseling verdorven. In alle geval blijft zij verscheidene maanden lang zwak en is zij minder dan alle andere bestand tegen guur weder en insecten, die ze nog kunnen doen wegsterven. Ook kunnen wij onze klanten er niet genoeg toe aanzetten de bijzondere raadgevingen, in elk hoofdstuk samengevat, stipt te volgen. Aldus zullen zij het percent verlies, dat iedere verplanting onvermijdelijk vergezelt, tot een minimum herleiden.

Alle geschillen zullen door de rechtbanken van Hoi beslecht worden.

VERZENDINGEN.

In het belang onzer klanten en behoudens tegenaanwijzing van hunnentwege, zullen de verzendingen geschieden als volgt:

Zendingen tot 1 kg. — Verzending onder vorm van één of twee stalen. Om onze klanten het verlies van de stalen te besparen, laten wij ze over 't algemeen aanteekenen. Taks: fr. 0.75 tot 350 gr., met verhooging van fr. 0.10 per 50 gr. meer. Maximum gewicht: 500 gr. Aanteekengeld: fr. 1.75

Zendingen van 1 tot 5 kg. — Zoo een zending meer dan 1 kg. weegt, of indien zij bloembollen bevat of een pakje, dat alleen reeds 500 gr. weegt, dan is het noodzakelijk ze als klein colli per spoorweg toe te sturen (3 kg.: 4 fr.; 5 kg.: 5 fr.) voor plaatsen waar een vervoerdienst bestaat en als postcolli (3 kg.: 5 fr.; 5 kg.: 6 fr.) voor andere plaatsen.

Zendingen van meer dan 5 kg. — Toegestuurd als ijlgoed tot 20 kg.; als vrachtgoed voor meer dan 20 kg. Expressebestelling geschiedt slechts op uitdrukkelijk verzoek van de klanten.

Meiplanten. — Worden verzonden als postcolli tot 5 kg.; als expressegoed voor meer dan 5 kg.

Ziehier de tarieven in voege op 1 December voor colli's van meer dan 5 kg.:

België	IJlgoed.						Vrachtgoed.					
	50 km.		100 km.		150 km.		50 km.		100 km.		150 km.	
	station	aan huis	station	aan huis	station	aan huis	station	aan huis	station	aan huis	station	aan huis
tot												
10 kgs	5 00	6 10	5 00	6 10	5 00	6 10	—	—	—	—	—	—
20 »	5 50	7 40	5 50	7 40	5 50	7 40	—	—	—	—	—	—
30 »	6 00	7 90	7 10	9 00	9 30	11 20	5 50	7 40	5 50	7 40	5 90	7 80
40 »	6 30	8 20	9 50	11 40	12 30	14 20	5 50	7 40	6 00	7 90	7 80	9 70
50 »	7 90	9 80	11 80	13 70	15 40	17 30	5 50	7 40	7 00	9 40	9 70	11 60
60 »	9 20	12 70	14 00	17 50	18 50	22 00	6 00	9 50	9 00	12 50	11 70	15 20

De firma heeft een kantoor ingericht voor Frankrijk te Saint-Quentin (Aisne). Zij bezit geen ander bijkantoor, noch depot. Kantoren, magazijnen en plantenkweekerij zijn op Zon- en feestdagen gesloten.